

ХОТАМ ТҮРРАЕВ


МАТЕМАТИК МАНТИК ВА
ДИСКРЕТ МАТЕМАТИКА

«O'QITUVCHI»

619
Т-68

ХОТАМ ТҮРАЕВ

МАТЕМАТИК МАНТИК ВА ДИСКРЕТ МАТЕМАТИКА




ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

198

Ҳотам Тўраев

МАТЕМАТИК МАНТИҚ ВА ДИСКРЕТ МАТЕМАТИКА

Ўзбекистон Республикаси Олий ва
ўрта маҳсус таълим вазирлиги олий ўқув юртларининг
талабалари учун ўқув қўлланма сифатида
тавсия этган



ТОШКЕНТ «ЎҚИТУВЧИ» 2003

Китобда тўпламлар ҳақида ясасин тушунчалар, муносабатлар, мулоҳазалар алгебраси, мулоҳазалар ҳисоби, предикатлар мантиқи, математик назариялар, алгоритмлар, математик мантиқнинг техникага татбиқи, математик мантиқ функцияларини минималлаштириш муаммоси, графлар назариясининг элементлари, тўрлар ва тўрдаги оқимлар баён қилинади.

Мазкур ўкув қўлланмаси олий ўкув юртларининг **5460100**—математика, **5480100**—амалий математика ва информатика, **5140100**—математика ва информатика, **5521900**—информатика ва информацион технологиялар бакалаврлик йўналишилари ҳамда **5A460104**, **5A480101** ва **5A480107** магистратура мутахассислари бўйича таълим олаётган талабаларга мўлжалланган.

Китобдан магистрантлар, аспирантлар ҳамда радиотехника, электротехника ва амалий математика соҳаларида ишлайдиган мухандис-математиклар ва мутахассислар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Масъул мухаррир: доцент **А.М.Мусаев**

Тақризчилар: ЎзМУ кафедраси мудири, ЎзРФА
академиги, профессор **Н.Ю.Сатимов**,
ЎзМУ профессори **А.Пўлатов**,
ЎзМУ доценти **Р.Фуломов**,
СамДУ кафедраси мудири,
профессор **А.С.Солеев**,
СамДУ доценти **Ғ.Э.Эргашев**

T **1602020000-133** Қаттий буюрт. – 2003
353(04)-2003

ISBN 5-645-04107-0

© «Ўқитувчи» нашриёти, Т., 2003.

*Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги-
нинг 13 йиллигига башиланади.*

СЎЗ БОШИ

Дискрет математика — математиканинг бир қисми бўлиб, милоддан аввалги IV асрда яратила бошланган. Дискрет математика математиканинг такомиллашган сонлар назарияси, алгебра, математик мантиқ қисмларидан ташқари, XX аср ўрталаридағи фан-техника тараққиёти туфайли жадал ривожланаётган функционал системалар назарияси, граф ва тўрлар назарияси, кодлаштириш назарияси, комбинатор анализы каби бўлимларни ҳам ўз ичига олади.

Дастлаб, фақат математик мантиқ, алгебра, математик анализы, математика асослари, эҳтимоллар назарияси, геометрия, топология, сонлар назарияси, моделлар назарияси каби математик фанларда татбиқ этиб келинган дискрет математика XX асрнинг 40-йилларидан бошлаб ҳисоблаш математикаси, кибернетика, ахборот назарияси, иқтисодиёт, психология, математик лингвистика, тиббиёт фанлари ва дискрет техникада ҳам кенг қўлланилмоқда. Дискрет математика электр схемаларни лойиҳалашда ва текширишда, автоматик ҳисоблаш машиналарини лойиҳалашда ва программалашда, дискрет автоматларни мантиқий лойиҳалашда, ёҲМ элементлари ва қисмларини лойиҳалашда, ҳар хил техник системалар, қурилмалар ва автоматик машиналарни анализ ва синтез қилишда кенг миқёсда татбиқ этилади. Математик мантиқ фани электрон ҳисоблаш машиналарининг вужудга келишига ва уни мукаммаллаштиришга катта ҳисса қўшди.

Дискрет математика математик кибернетиканинг пойдевори бўлиши билан бирга, ҳозирги замон математик таъшимининг муҳим бўғини ҳам ҳисобланади.

Китобнинг асоси сифатида муаллиф томонидан 1973 йилдан бери Самарқанд давлат унинверситети амалий математика ва информатика факультети талабаларирига узлуксиз ўқилаётган маърузалар олинган. Унинг структураси ва мазмунига факультет базасида «Дискрет математика ва унинг татбиқлари» мавзусида ўтказилган Ҳалқаро илмий анжуманлар, Москва давлат университетининг «Дискрет математика» кафедраси билан ўқув-услубий соҳалардаги ҳамкорлик ҳамда факультет талабаларирига дискрет математика фанининг етук олимлари А. Дородницин, Ю. Журавлёв, М. Комилов, В. Кудрявцев, А. Зиков ва В. Қобулов томонидан ўқилган маърузаларнинг ҳам ижобий таъсири бор.

Китоб дискрет математиканинг ривожланиш тарихи (кириш) ва 9 бобдан иборат.

Кўлланманинг биринчи бобида **тўпламлар назариясининг элементлари**, муносабатлар, бинар муносабати, функциялар суперпозицияси, тартиблаш муносабати ва панжара ҳақида тушунчалар берилади.

Иккинчи боб **мулоҳазалар алгебрасига** бағишиланган бўлиб, унда мулоҳазалар ва улар устида мантиқий амаллар, формуалалар, тент кучли, айнан чин, айнан ёлғон ва бажари-лувчи формуалалар, тенг кучли формуалаларга доир теоремалар, формуаларнинг нормал шакллари, мулоҳазалар алгебраси функциялари, Буль алгебраси, мантиқ алгебрасидаги икки тарафлама қонун ва арифметик амаллар, Жегалкин кўпҳади, монотон функциялар, функционал ёпиқ синфлар ва Пост теоремаси каби масалалар кўриб чиқилади.

Китобнинг учинчи боби **мулоҳазалар ҳисобига** бағишиланган бўлиб, унда мулоҳазалар ҳисоби формуласи тушунчаси, исботланувчи формула таърифи, мулоҳазалар ҳисобига нинг аксиомалар системаси (тизими), келтириб чиқариш қоидалари, келтириб чиқариш қоидасининг ҳосилалари бўлган бир вақтда ўрнига қўйиш, мураккаб холоса, силлогизм, контрапозиция, икки карра инкорни тушириш қоидалари, формуалалар мажмуасидан формулани келтириб чиқа-

рии қоидаси, келтириб чиқарылган формула (исботлаш) түшүнчеси, дедукция ва умумлаштан дедукция теоремалари, айрым мантиқ (асосларни ўрин алмаشتариш, асосларни құшиш, асосларни ажратыш) қонунларининг исботи, мулоҳазалар алгебраси ва мулоҳазалар ҳисоби ўртасидаги муносабатлар, мулоҳазалар ҳисобида ечилиш, зидсизлик, тұлиқлилік ва әркинлик муаммолари каби масалалар қўриб чиқылади.

Тұрттынчи бобда **предикатлар мантиқи** баён этилган. Бу ерда предикат түшүнчеси, предикатлар устида мантиқий амаллар, умумийлик ва мавжудлық кванторлари, предикатлар мантиқининг формуласи ва унинг қыймати, предикатлар мантиқининг тенг күчли формулалари, предикатлар мантиқи формуласининг нормал шакли, бажарилувчи ва умумқыйматли формулалар, ечилиш муаммоси, хусусий ҳолларда формуланинг умумқыйматилигини топиш алгоритмлари, предикатлар мантиқининг математикага татбиқи, аксиоматик предикатлар ҳисоби ҳақида маълумотлар көлтирилади.

Китобнинг бешинчи боби **математик назарияларга** бағытланган бўлиб, аксиоматик назария түшүнчеси, биринчи гартибли тил, терм ва формулалар, мантиқий ва хос (махсус) аксиомалар, келтириб чиқариш қоидаси, алгебра, геометрия ва анализда мавжуд бўлган математик назариялар, назарияда исботлаш түшүнчеси, тавтология хусусий ҳолларининг исботланувчанлиги, дедукция теоремаси, назария тилининг интерпретацияси (талқини), берилган интерпретацияда формулаарнинг чинлик қыйматлари, назариянинг модели, интерпретациянинг изоморфизмылиги, назариянинг қатъийлиги, назариянинг зидсизлик, тұлиқлилік ва ечилиш муаммолари, предикатлар ҳисобининг зидсизлигиги, натурал сонлар назарияси, Гёделнинг тұлиқсизлик ҳақидағы теоремаси сингари масалалар ёритилган.

Китобнинг олтинчи бобида **алгоритмлар назариясининг элементлари** атрофлича баён этилган. Бу ерда алгоритм түшүнчеси ва унинг характерли хусусиятлари, ечилувчи ва

саналувчи түпнамалар, Пост теоремаси, алгоритм тушунчалигини аниклашы, ҳисоблануучы функциялар, қисмий рекурсив ва умумрекурсив функциялар, А. Чёрч ва С. Клини тезислари, Тьюринг машиналари, Тьюринг машинасида алгоритмни жорий қилиш, интуициялык сонларни күшиш алгоритми, Евклид алгоритми, алгоритмлар назариясинин асосий гипотезаси, Марковининг нормал алгоритмлари, Марков бүйича қисман ҳисоблануучы ва ҳисобланувчи функциялар, қисмий рекурсив (умумрекурсив) функция билан Марков бүйича қисмий ҳисоблануучы (ҳисобланувчи) функция ўртасидаги муносабат, нормаллаштириш принципи, алгоритмик счилмөвчи муаммолар, математик мантиқда келтириб чиқарувланликни таниш мұаммоси, ўз-ўзига татбиқ этувчапликни таниш мұаммоси каби масалалар күрилган.

Китобнинг еттинчи бобида **математик мантиқнинг техникаға татбиқлари** келтирилган. Бу ерда реле-контактлы схемалар, контактлы схемалар ва уларнинг синтези, функционал элементлар ва улардан схемалар ясаш, күп тактлы схемалар, функционал элементлар системасининг түлиқлиги, схемаларни минималлаштириш мұаммоси, тескари бөгләниши бўлмаган автоматлар, чекли автомат ҳақида умумий тушунчалар, Мили ва Мур автоматлари каби масалалар кўриб чиқилган. Мантиқ алгебраси функцияларини схемалар (автоматлар) орқали реализация этиш масаласига алоҳида аҳамият берилган.

Саккизинчи бобда **математик мантиқ функцияларини минималлаштириш мұаммоси** баён этилган. Бу ерда дизъюнктив нормал шакл (ДНШ)ни соддалаштириш, энг қисқа ДНШ, қисқартирилган ДНШ, тупикли ДНШ, Квайн ДНШ ва минимал ДНШларни ясаш алгоритмлари келтирилган. Аналитик ва геометрик тарздаги алгоритмларнинг эквивалентлиги кўрсатилган.

Тўққизинчи бобда **графлар назариясининг элементлари** ёритилган. Бу ерда оддий графлар, графларнинг изоморфлиги, маршрутлар, занжирлар, цикллар, боғлиқлилик,

ларахтлар, хроматик сон ва хроматик синф, түрлар ва түрдаги оқынушылар, Форд–Фалкерсон теоремаси каби масалалар қараб чиқылған.

Назарий масалаларни баён этишда мисоллардан көңг фойдаланылған, деярли ҳар бир параграфнинг охирида мұстакіл ишлаш учун машқтар, савол ва толшириқтар берилған.

Китобда ёритилған масалалар «**Математик мантиқ ва дискрет математика**» ва «**Математик мантиқ ва алгоритмлар назариясі**» фанларидан ташқари давлат таълим стандартларында күрсатылған «Машиналар арифметикаси ва автоматлар назариясі», «Информатика асослари ва ҳисоблаш техникасы», «ЭХМ ва дастурлаш», «Операцияларни текшириш» каби фанларни үқитишида ҳам мұхим ақамият касб этади.

Китобни тайёрлашда америкалик С. Клини ва А. Чёрч, австриялық К. Гёдел, английлық А. Тьюринг ва Э. Менделсон үшінда россиялық А.А. Марков, А.И. Мальцев, П.С. Новиков, С.В. Яблонский, О.Б. Лупанов, В.Б. Кудрявцев, В.А. Горбатов, С.Г. Гиндикин, А.А. Зиков, Л. Лихтарников ва Т. Сукачёва, Ӯзбекистонлық Р. Искандаров, Т. Ёкубов каби математиклар томонидан яратылған монография, дарслык, үқув күлланма ва илмий мақолалар ва самарқандлық М. Исроиловнинг мулоҳазалар алгебрасига бағишлиланған қўлёзмасидан фойдаланылди.

Олий үқув юртлари математика факультетлари талабалари үшун ӯзбек тилида ёзилған дастлабки китоблар марҳум устозимиз Р.И. Искандаровнинг «Математик логика элементлари» (1970) номли дарслиги ва Т.Ёкубовнинг «Математик логика элементлари» (1983) үқув күлланмасидир. Бу китоблар математик мантиқ фанини үқитишида, табиийки, ижобий рол ўйнади.

Үқувчиларга тавсия этилаёттан ушбу китоб «**Математик мантиқ ва дискрет математика**» ҳамда «**Математик мантиқ ва алгоритмлар назариясі**» фанлари бўйича Республикализ давлат таълим стандартларида күрсатылған үқув дастурларига тўлиқ жавоб беради.

саналувчи түпламлар, Пост теоремаси, алгоритм тушунчасини аниқлаш, ҳисобланувчи функциялар, қисмий рекурсив ва умумрекурсив функциялар, А. Чёрч ва С. Клини тезислари, Тьюринг машиналари, Тьюринг машинасида алгоритмни жорий қилиш, натурал сонларни қўшиш алгоритми, Евклид алгоритми, алгоритмлар назариясининг асосий гипотезаси, Марковнинг нормал алгоритмлари, Марков бўйича қисман ҳисобланувчи ва ҳисобланувчи функциялар, қисмий рекурсив (умумрекурсив) функция билан Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи (ҳисобланувчи) функция ўргасидаги муносабат, нормаллаштириш принципи, алгоритмик ечилмовчи муаммолар, математик мантиқда келтириб чиқарувчанликни таниш муаммоси, ўз-ўзига татбиқ этувчанликни таниш муаммоси каби масалалар қўрилган.

Китобнинг еттинчи бобида **математик мантиқнинг техникага татбиқлари** келтирилган. Бу ерда реле-контактли схемалар, контактли схемалар ва уларнинг синтези, функционал элементлар ва улардан схемалар ясаш, кўп тактли схемалар, функционал элементлар системасининг тўлиқлиги, схемаларни минималлаштириш муаммоси, тескари боғланиши бўлмаган автоматлар, чекли автомат ҳақида умумий тушунчалар, Мили ва Мур автоматлари каби масалалар қўриб чиқилган. Мантиқ алгебраси функцияларини схемалар (автоматлар) орқали реализация этиш масаласига алоҳида аҳамият берилган.

Саккизинчи бобда **математик мантиқ функцияларини минималлаштириш муаммоси** баён этилган. Бу ерда дизъюнктив нормал шакл (ДНШ)ни соддалаштириш, энг қисқа ДНШ, қисқартирилган ДНШ, тупикили ДНШ, Квайн ДНШ ва минимал ДНШларни ясаш алгоритмлари келтирилган. Аналитик ва геометрик тарздаги алгоритмларнинг эквивалентлиги кўрсатилган.

Тўққизинчи бобда **графлар назариясининг элементлари** ёритилган. Бу ерда оддий графлар, графларнинг изоморфлиги, маршрутлар, занжирлар, цикллар, боғлиқлилик,

шархтлар, хроматик сон ва хроматик синф, түрлар ва түрдаги оқылмлар, Форд–Фалкерсон теоремаси каби масалалар қараб чиқылган.

Назарий масалаларни баён этишда мисоллардан көнт фойдаланилган, деярли ҳар бир параграфнинг охирида мустақил ишлаш учун машқлар, савол ва топшириқлар берилганды.

Китобда ёритилған масалалар «**Математик мантиқ ва дискрет математика**» ва «**Математик мантиқ ва алгоритмлар назарияси**» фанларидан ташқари давлат таълим стандартларыда күрсатылған «Машиналар арифметикаси ва автоматлар назарияси», «Информатика асослари ва ҳисоблаш техникаси», «ЭХМ ва дастурлаш», «Операцияларни текшириш» каби фанларни үқитишда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Китобни тайёрлашда америкалик С. Клини ва А. Чёрч, австриялык К. Гёдел, англиялык А. Тьюрингт ва Э. Мендельсон ҳамда россиялык А.А. Марков, А.И. Мальцев, П.С. Новиков, С.В. Яблонский, О.Б. Лупанов, В.Б. Кудрявцев, В.А. Горбатов, С.Г. Гиндикин, А.А. Зиков, Л. Лихтарников ва Т. Сукачёва, үзбекистонлик Р. Исқандаров, Т. Ёқубов каби математиклар томонидан яратылған монография, дарслык, үкув қўлланма ва илмий мақолалар ва самарқандлик М.Исройловнинг мулоҳазалар алгебрасига бағишлиланган кўлёзмасидан фойдаланилди.

Олий үкув юртлари математика факультетлари талабалари үчун үзбек тилида ёзилған дастлабки китоблар марҳум үстозимиз Р.И. Исқандаровнинг «Математик логика элементлари» (1970) номли дарслиги ва Т.Ёқубовнинг «Математик логика элементлари» (1983) үкув қўлланмасидир. Бу китоблар математик мантиқ фанини үқитишда, табиийки, ижобий рол ўйнади.

Ўқувчиларга тавсия этилаётган ушбу китоб «**Математик мантиқ ва дискрет математика**» ҳамда «**Математик мантиқ ва алгоритмлар назарияси**» фанлари бўйича Республикаизм давлат таълим стандартларида кўрсатылған үкув дастурларига тўлиқ жавоб беради.

Китоб университет ва педагогика институтларида **5460100 – математика**, **5480100 – амалий математика ва информатика**, **5140100 – математика ва информатика**, **5521900 – информатика ва информацион технологиялар бакалаврлик йўналишлари** ҳамда **5A460104**, **5A480101** ва **5A480107** магистратура мутахассисларлари бўйича таълим олаётган талабаларга мўлжалланган. Китоб камчиликлардан холи бўлмаганлиги туфайли, муаллиф китоб ҳақидаги танқидий фикр ва мулоҳазаларни миннатдорчилик билан қабул қиласи ва олдиндан ўз ташаккурини изҳор этади.

Китобнинг кўлёзмаси билан муфассал танишиб, унинг сифатини яхшилаш йўлида фойдали кўрсатма ва маслаҳатлар берган тақризчилар ЎзРФА академиги Н. Сатимов, профессорлар А. Солеев, А. Пўлатов, доцентлар Р. Фуломов ва Ф. Эргашевга, мұҳаррирлик ишини бажарган доцент А. Мусаевга, матнини компьютерга киритган ва макетини тузиб нашр этишга тайёрлаган Х. Якубова, Э. Ўрунбоев ва Ф. Муродовга ўз миннатдорчилигимни билдираман.

Муаллиф.

КИРИШ

Мантиқ — муҳокама юритишининг қонун-қоидалари, усуллари ва формалари (шакллари) ҳақидаги фан бўлиб, унинг асосчиси қадимги юонон мутафаккири **Аристотель** (милод. авв. 384—322) ҳисобланади. У биринчи бўлиб дедукция назариясини, яъни мантиқий хулоса чиқариш назариясини яратиб, мантиқий хулоса чиқаришининг формал характерга эга эканлигини кўрсатди. Аристотелнинг мантиқий таълимоти формал мантиқнинг (логиканинг) асосини ташкил қиласди. Формал мантиқ фикрлашнинг формалари ва қонунларини текширади. Шундай қилиб, Аристотель мантиқий фикрлашнинг асосий қонунларини очди.

Аристотель асос солган мантиқ кўп асрлар давомида турли мутафаккирлар, файласуфлар ва бутун фалсафий мактаблар томонидан тўлдирилди, ўзгафтирилди ва такомиллаштирилди. Шу жумладан, **Абу Наср Форобий**, **Абу Али ибн Сино**, **Абу Райхон Беруний**, **Муҳаммад ал-Хоразмий**, **Умар Хайём**, **Алишер Навоий**, **Мирзо Бедил** каби Шарқнинг буюк мутафаккирлари ҳам ўзларининг катта ҳиссаларини кўшдилар.

Мантиқнинг янгиланишида француз олимни **Р. Декарт**нинг (1596—1650) ишлари муҳим роль ўйнади. Р.Декарт аналитик усулда фикрлашнинг асосий принципларини яратди.

Немис философи ва математиги **Г. Лейбниц** (1646—1716) биринчи бўлиб мантиқий фикрлашга ҳисоб характеристини бериш зарур, деган ғоя билан чиқди. Бунинг учун, унинг фикрича, ҳамма илмий тушунчалар ва мулоҳазаларни асосий мантиқий элементларга қелтириб, уларни маълум символлар билан белгилаш керак.

Г. Лейбниц ғоялари фақат XIX асрдагина ўз ривожини топди. Инглиз олимлари **Ж. Буль** (1815—1864), **Ч. Пирс** (1839—1914), **Б. Рассел** (1872—1970), **А. Уайтхед** (1861—1947), **У. Жевонс** (1835—1882), немис олимлари **Г. Фрёге**

(1848–1925), **Д. Гильберт** (1862–1943), **Э. Шрёдер** (1853–1910), шотланд математиги **О. де Морган** (1806–1871), рус олимлари **П.С. Порецкий** (1846–1907), **В.И. Гливенко** (1897–1940), **И.И. Жегалкин** (1869–1947) ва бошқалар мантиқ соҳасидаги ишлари билан символик ёки математик мантиқни (логикани) яратдилар.

Математик мантиқ асосчиларидан бири бўлган **Ж. Буль** (машхур «Сўна» романининг муаллифи Лилиан Войничнинг отасидир) мустақил равишда грек, лотин, немис, француз ва итальян тилларини ҳамда математикани ўрганади. 1847 йилда ёзилган «Мантиқнинг математик таҳлили», «Мантиқий ҳисоб» ва 1854 йилда ёзган «Фикрлаш қонунларини тадқик этиш» китобларида мантиқни алгебраик формага келтирди ва математик мантиқнинг аксиомалар системасини яратди. Булнинг мантиқий ҳисоби **Буль алгебраси** деб юритилади.

Ж. Буль мантиқ ва математика операциялари ўтасидаги ўхшашибликка асосланиб, мантиқий хуносаларга алгебраик символикани қўллади. У мантиқ операцияларини формаллаштириш (расмийлаштириш) учун қуйидаги символларни (белгиларни) киритди:

- предметларни белгилаш учун (x, y, z, \dots) кичик лотин ҳарфларини;
- предметлар сифатини белгилаш учун (X, Y, Z, \dots) бош лотин ҳарфларини;
- бирор мулоҳазага акслантирилган ҳамма предметлар синфи 1 ни;
- кўрилиши лозим бўлган предметлар йўқлигининг белгиси 0 ни;
- мулоҳазаларни мантиқий қўшишнинг «+» белгисини;
- мулоҳазаларни мантиқий айришнинг «-» белгисини;
- мулоҳазалар тенглигининг «=» белгисини.

Символик буль алгебрасида мантиқий қўпайтириш амали, худди алгебраик қийматларни қўпайтиришдагидек,

$$xy = yx$$

коммутативлик хоссасига

Назад

$$x(yz) = (xy)z$$

ассоциативлик хоссасига эга. Мантиқий қүшиш амали ҳам коммутативлик ва ассоциативлик хоссаларига эга:

$$\begin{aligned} x + y &= y + x, \\ (x + y) + z &= x + (y + z). \end{aligned}$$

Буль алгебрасида йиғинди күпайтмага нисбатан дистрибутивлик қонунига бўйсунади:

$$x(y + z) = xy + xz.$$

Ж. Буль алгебраик символикалар ёрдами билан ҳамма мантиқий операцияларни икки қийматли (1 ва 0) алгебра қонунларига бўйсунадиган формал (расмий) операцияларга келтиришни ўйлади. Буль функциялари ва унинг аргументлари фақат икки қиймат — «чин» ва «ёлғон» қийматлар қабул қиласди.

Мантиқ алгебраси қоидалари орқали оддий мулоҳазалардан мураккаб мулоҳазаларни ҳосил қилиш мумкин.

Масалан:

xy — бир вақтда x ва y хоссаларга эга бўлган предметлар класси;

$x(1 - y)$ — бу x хоссага эга ва y хоссага эга бўлмаган предметлар класси;

$(1 - x)y$ — бу y хоссага эга ва x хоссага эга бўлмаган предметлар класси;

$(1 - x)(1 - y)$ — бу x ва y хоссаларга эга бўлмаган предметлар класси.

Ҳозирги математик мантиқ фанини яратишда фундаментал роль ўйнаган Буль символик логикаси мукаммалаштиришга муҳтож эди. Масалан, Жевонс фикрича, мантиқий айриш операцияси айрим нокулайликларга олиб келади.

О. де Морган Буль ғояларини ривожлантириб, мантиқ ҳисобини эҳтимоллар назарияси теоремаларини асослашта татбиқ этди ва символик ҳисобни яратиш устида ишлади.

Ч. Пирс математикани анализ қилишда мантиқий муносабатларни курол сифатида ишлатишни асослаб берди, у Г. Фрёге ишларидан хабарсиз ҳолда, мантиққа квантор тушунчасини киритди.

Г. Фрёге математика принципларини мантиқ принципларидан келтириб чиқариш устида ишлаб, мантиқ ҳисобини яратди.

Буль ва О. де Морган асарларида математик мантиқ ўзига хос алгебра – мантиқ алгебраси кўринишида шаклланди.

Кейинчалик, Буль методлари У. Жевонс, Э. Шрёдер ва П.С. Порецкий асарларида ўз ривожини топди.

Буль алгебрасини У. Жевонс ва Э. Шрёдер мукаммаллаштируди. У. Жевонс «Соф мантиқ» (1864), «Ўхшашларни алмаштириш» (1869) ва «Фан асоси» (1874) китобларида мантиқ соҳасида алмаштириш принципига асосланган ўзининг назариясини тавсия этди. 1877 йили Э.Шрёдер «Der operationskreis des Logikkalkuls» китобида алгебраик мантиқ асосларини ёритди.

Математик мантиқ фанининг ривожланишида Порецкий-нинг ҳам катта хизмати бор. У Буль, Жевонс ва Шрёдер ютуқларини умумлаштириб, «Мантиқий тенгламаларни ечиш усуслари ва математик мантиқнинг тескари усули ҳақида» (1884) китобида мантиқ алгебраси аппарати ривожини анча илгари сурди. Америкалик олим А. Блейк П.С.Порецкий методини Э.Шрёдер методидан устун қўяди.

П.С. Порецкий системасида куйидаги белгилар қабул қилинган:

1) бир-бирига боғлиқ бўлмаган ва бир-бири билан ҳеч қандай муносабатда бўлмаган предметлар классини кичик лотин ҳарфлари – a, b, c, \dots билан белгилаш;

2) синфларни инкор этиш учун кичик лотин ҳарфларидан кейин «эмас» сўзини кўшиш, яъни a эмас, b эмас ва ҳоказо каби белгилаш;

3) a, b, c, \dots предметлар синфи хусусиятига эга бўлмаган предметлар синфини a_1, b_1, c_1, \dots билан белгилаймиз;

4) икки ёки күпроқ синфлар биргаликда бир неча бир-бирига боғлиқ бўлмаган хоссаларга эга бўлишини ab , bc ва ҳоказо кўпайтмалар билан белгилаш. Бу операция коммутативлик ва ассоциативлик хоссаларига эга:

$$ab = ba, \quad (ab)c = a(bc);$$

5) мантиқий кўшиш амалини «+» белгиси билан белгилаш. Бу операция ҳам коммутативлик ва ассоциативлик хоссаларига эга:

$$x + y = y + x, \quad x + (y + z) = (x + y)z;$$

6) ҳеч қандай мазмунга эга бўлмаган сифат формасини 0 (мантиқий 0) билан белгилаш;

7) мумкин бўлган синфларни ўз ичига олган сифат формасини 1 (мантиқий 1) билан белгилаш; 0 ва 1 ушбу хоссаларга эга:

$$a + 0 = a; \quad a \cdot 1 = a;$$

8) a синфнинг инкорини a_1 синф билан белгилаш;

9) кўшиш, кўпайтириш ва инкор амалларидан ташқари эквивалентлик амалини киритади ва уни «=» символ билан белгилайди. Бу амал учта қоидага бўйсунади: 1) агар $a = b$ тенглигига бир хил синфларни кўшсак, у ҳолда тенглик бузилмайди, яъни $a + c = b + c$ бўлади; 2) агар $a = b$ бўлса, у ҳолда $ad = bd$ бўлади; 3) агар $a = b$ бўлса, у ҳолда $a_1 = b_1$ бўлади, бу ерда $a_1 = a$ эмас, $b_1 = b$ эмас.

XIX асрнинг охирида математик назариялар шундай ривожландики, энди мантиқ масалалари математиканинг ўзида ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб; мавжуд мантиқий қуроллар математика талабларига жавоб беролмай қолди. Айрим математик мұаммоларни ечишдаги қийинчилеклар уларниң мантиқий табиатига боғлиқлиги аниқланди. Шунинг учун ҳам математик мантиқ тор алгебраик доирадан чиқиб, жадал ривожлана бошлади. Бу йўналишда биринчи бўлиб Г. Фрёте ва итальян математиги Ж. Пеано (1858–1932) тадқиқотлар олиб бордилар, улар математик мантиқни арифметика ва тўпламлар назариясини асослаш учун кўлладилар.

1903 иили Б. Расселнинг Лондонда нашр этилган «Математика принциплари» китобида мулоҳазалар ва синфлар ҳисоб назарияси ишлаб чиқилди. Б. Расселнинг А. Уайтхед билан ҳамкорликда ёзган З томлик «Математика принциплари» китоблари математик мантиқ фанининг ривожланишида катта роль ўйнади. Бу китобларда мулоҳаза, синф ва предикатлар ҳисоби деярли тўлиқ аксиомалаштирилди ва формаллаштирилди. Улар ҳозирги вақтда ўрганилаётган математик мантиқ кўринишини яратдилар.

Д. Гильберт ва немис олимни В. Аккерманнинг 1928 йилда чоп этилган «Назарий мантиқнинг асосий хусусиятлари» китоблари математик мантиқнинг янада ривожланишида муҳим аҳамият касб этди. Бу китобнинг муаллифлари мантиқий амалларда формаллаштириш методини татбиқ этиб, катта ютуққа эришдилар.

Буль, Шрёдер ва Порецкийнинг мантиқ алгебраларига таяниб, И.И. Жегалкин логик кўшиш ва логик кўпайтириш амалларини қўйидагича аниқлади:

- 1) $0 + 0 = 0; \quad 0 + 1 = 1; \quad 1 + 0 = 1; \quad 1 + 1 = 0;$
- 2) $0 \cdot 0 = 0; \quad 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0; \quad 1 \cdot 1 = 1.$

Логик кўшиш ва кўпайтириш амалларидан $a + a = 0$ ва $a \cdot a = a$ келиб чиқади.

Мантиқий опрерацияларнинг символик кўринишлари Жегалкин системасида қўйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} \bar{p} : p + \bar{1}; \quad p = \bar{\bar{p}}; \quad p \vee q = p + q + pq; \\ p \cdot \bar{q} = \bar{1} + p + pq; \quad p = q = \bar{1} + p + q. \end{aligned}$$

У символик маддада умумийлик ва мавжудлик квантори таҳсан тушунади киритди ва предикатлар алгебрасини таҳсанди.

XX асрнинг 50- йилларида кўп қийматли мантиқ соҳасида илмий изланишлар олиб борилди. Кўп қийматли мантиқда мулоҳазалар чекли (З ва ундан кўп) ва чексиз чинлик қийматлари олади. Математик мантиқ бу бўлимнинг асосчила-

ридан бири поляк олим **Я. Лукасевич** (1878–1954) ҳисобланади. У дастлаб уч қийматли (1920), 1954- йилда түрт қийматли ва ниҳоят чексиз қийматли мантиқни яратди.

Күп қийматли мантиқ проблемалари (муаммолари) билан **Е. Пост, С. Яськовский, Д. Вебб, А. Гейтинг, А.Н. Колмогоров, Д.А. Бочвар, В.И. Шестаков, Г. Рейхенбах, С.К. Клини, Н. Детуш-Феврие** ва бошқа олимлар шуғулланғанлар.

Конструктив математиканинг ривожланиши конструктив мантиқ масалаларини ечиш усулларини ишлаб чиқыш вазифасини қўйди. Бу соҳада **А.А. Марков, Н.А. Шанин** ва шогирдларининг хизматлари каттадир.

Дискрет математиканинг катта бўлимларидан бири алгоритмлар назарияси ҳисобланади. Алгоритм сўзи IX асрда яшаган замонасининг буюк математиги ватандошимиз **Муҳаммад ал-Хоразмий** исмининг лотинча *Algorithmi* формасидан келиб чиқкан.

Алгоритмлар назарияси алгоритмларнинг умумий хусусиятларини ўргатувчи дискрет математиканинг бир бўлими мидир.

XX асрнинг 20- йилларида биринчи бўлиб интуиционистлар вакиллари **Л. Брауэр** ва немис олим **Г. Вейлер** (1934) алгоритм тушунчасини ўрганишга киришганлар. Алгоритмлар назариясининг асосчиларидан бири бўлган американлик олим **А. Чёрч** 1936 йилда ҳисобланувчи функция тушунчасига 1- аниқликни киритди ва куйидаги тезисни илгари сурди: натуранларнинг барча қийматларида ҳамма жойда аниқланган ҳисобланувчи функциялар билан умумий рекурсив функциялар эквивалентdir (бир хилдир). У ҳисобланувчи функция бўлмаган функцияни кўрсатди.

Алгоритмлар назариясининг кейинги ривожланишида американлик олимлар **К. Гёдел, С.К. Клини** (1957), Э.Л. Пост (1943–1947), **Х. Роджерс** (1972), инглиз олим **А. Тьюринг** (1936–1937), рус олимлари **А.А. Марков** (1947–1954, 1958, 1967), **А.Н. Колмогоров** (1953, 1958, 1965), **Ю.Л. Ершов** (1969–1973), **А.И. Мальцев** (1965,) **Д.А. Трахтенброт** (1967,

1970–1974), **П.С. Новиков** (1952), **Ю.В. Матиясевич** (1970–1972) нинт хизматлари беніхоят кеттадыр.

Масалан, С. Клини алгоритм ёрдамида ҳисобланувчи қисмий функциялар қисмий рекурсив функциялардир, деган ғояни илгари сурди.

А. Тьюринг ва Э. Пост (1936) идеаллаштирилган ҳисоблаш машиналари атамасида биринчи бўлиб, бир-биридан бехабар ҳолда, алгоритм тушунчасига аниқлик киритдилар. Пост ва Тьюринг алгоритмик жараёнлар маълум бир тузилишга эга бўлган «машина» бажарадиган жараёнлар эканлигини кўрсатдилар. Улар ўша пайтдаги математикада маълум бўлган барча алгоритмик жараёнларни бажара оладиган «машина» лар синфини ҳосил қилиб, уларга аниқ математик атамалар ёрдамида таъриф бердилар. Пост ва Тьюринг ушбу машиналар ёрдамида ҳисобланувчи барча функциялар синфи барча қисмий рекурсив функциялар синфи билан бир хил эканлитини кўрсатдилар. Натижада, Чёрч тезисининг яна битта фундаментал тасдиғи ҳосил бўлди.

С. Клини ва Э. Пост биргаликда рекурсивлик назариясини яратдилар ва рекурсив функциялар назариясини тараққий эттирдилар. Улар қисман рекурсив функциялар тушунчасини киритдилар.

Дастлаб фақат математик мантиқ, алгебра, математик анализ, математика асослари, эҳтимоллар назарияси, геометрия, топология, сонлар назарияси, моделлар назарияси каби математика фанларида татбиқ этиб келинган алгоритмлар назарияси XX асрнинг 40- йилларидан бошлаб ҳисоблаш математикаси, кибернетика, ахборот назарияси, иқтисодиёт, психология, математик лингвистика, тиббиёт фанлари ва дискрет техникада кенг қўлланилмоқда.

Сўнгги даврларда математик мантиқни техникага жуда самарали татбиқ этиш имкониятлари борлиги маълум бўлди.

Математик мантиқни дискрет техникага татбиқи натижасида унинг техник мантиқ бўлими вужудга келди. Бу соҳада **Е. Пост**, **В.И.Шестаков**, **К.Шеннон** (1916 й.т.), **А. Нақашима**,

М. Ханзава, С. Клини, О.Б. Лупанов (1932 й.т.), **С.В. Яблонский** (1924 й.т.), **В.Б. Кудрявцев, Ю.И. Журавлёв, В.И. Левенштейн, В.В. Глаголев, Ф.Я. Ветухновский, Ю.Л. Васильев** ва бошқа олимлар ўз илмий изланишлари билан унинг тараққий этишига улкан ҳисса кўшганлар.

Математик мантиқни техникага қўллашни биринчи бўлиб рус физиги **П. Эренфест** (1910) ва гидротехника курилишлари бўйича етук мутахассис **Н.М. Герсеванов** амалга оширганлар.

К. Шеннон ҳисоблаш машиналарини яратишнинг асосий методи сифатида мантиқ алгебрасини билган, у инфомрация ва инфомрацияни узатишнинг математик назарияларини яратди, электрон тармоқлардаги «1» ва «0» бинар муносабатлар билан математик мантиқдаги иккилиқ (1 ва 0) қийматларининг мос келишини ва қандай қилиб «мантиқ машинасини» яратишни кўрсатди ва ҳоказо.

Контактли ва реле-контактли схемаларга мантиқ алгебрасини татбиқ этишининг исботини биринчи бўлиб **В.И. Шестаков** ва **К. Шеннон** берди. А. Накашима ва **М. Ханзава** математик мантиқни дискрет техника масалаларини ечишда қўллаш методларини яратдилар. С. Клини дискрет курилма моделини (чекли автомат модели) яратгани туфайли, математик мантиқни хотириали дискрет курилмаларни лойиҳалашда ишлатиш имкони юзага келди.

Москва давлат универсиети дискрет математика мактабининг асосчиларидан бири **О.Б. Лупановнинг** асосий ишлари математик кибернетика ва математик мантиқقا бағишлиланган. У мураккаб бошқарувчи системаларнинг асимптотик қонуниятларини, контакт схемалар ва функционал элементлардан ясалган схемаларни (умуман, асосий бошқарувчи системаларни), энг яхши асимптотик синтез методларини ва локал кодлаш принципини ишлаб чиқди.

С.В. Яблонский оптималь схемаларни синтез қилиш ва ҳисоблаш қурилмаларини ясаш методини яратди.

Мантиқ алгебраси электр схемаларни лойиҳалашда ва текширишда, автоматик ҳисоблаш машиналарини лойиҳалаш ва программалашда, дискрет автоматларни мантиқий лойиҳалашда, ЭҲМ элементлари ва қисмларини лойиҳалашда, ҳар хил техник системалар, қурилмалар ва автоматик машиналарни анализ ва синтез қилишда кенг миқёсда татбиқ этилади. Математик мантиқ фани электрон ҳисоблаш машиналарининг вужудга келишига ва уни мукаммаллаштиришга катта ҳисса қўшди.

Демак, математик мантиқ, бир томондан, формал мантиқ муаммоларига математик методларни қўллаш натижасида ривожланган бўлса, иккинчи томондан, математикани асослашга хизмат қилиувчи фан сифатида ривожланди. Ҳозирги замон математик мантиқи автоматика, машина математикаси, бир тилдан иккинчи тилга автоматик тарзда таржима қилиш, математик лингвистика, ахборот назарияси ва умумайни кибернетика билан боғлиқдир.

Шундай қилиб, математик мантиқ ва дискрет математика 150 йилдан бери ривожланиб келмоқда. У математика асослари, алгебра, геометрия, математик анализ, функционал анализ, топология, эҳтимоллар назарияси каби фанларда татбиқ этилишидан ташқари кибернетика, иқтисодиёт, математик лингвистика, психология, ЭҲМ ва дастурлаш, операцияларни текшириш, схемотехника, радиотехника, автоматика, ўйинлар назарияси, ахборотлар назарияси сингари фанларда ҳам кенг қўлланилади.

1- §. Түпламлар назариясининг асосий тушунчалари

- Түплам. Түплам элементлари. Тенг кучли түпламлар. Қисм түплам. Хос ва хосмас қисм түпламлар. Бүш түплам.*

Түпламлар назариясига математик фан сифатида немис математиги **Г. Кантор** (1845–1918) томонидан асос солинган.

Математикада доимо турли түпламлар билан иш кўришга тўғри келади. Масалан, тўғри бурчакли учбурчаклар түплами, натурал сонлар түплами, тўғри чизикда ётувчи нуқталар түплами ва ҳоказо. Умуман, түплам тушунчаси айрим-айрим нарсалар, буюлар, объектларни биргаликда, яъни бир бутун деб қараш натижасида вужудга келади.

1-таъриф. *Түпламни ташкил этувчи нарсалар, буюлар, объектлар бу түпламнинг элементлари деб аталади. Түпламлар, одатда, лотин ёки грек алфавитининг бош ҳарфлари билан белгиланади.*

A түплам a, b, c, d, \dots элементлардан тузилганлиги

$$A = \{a, b, c, d, \dots\}$$

кўринишда ёзилади. Түпламни ташкил этувчи элементлар сони чекли ёки чексиз бўлиши мумкин. Биринчи ҳолда чекли түпламга, иккинчи ҳолда эса чексиз түпламга эга бўламиз. Масалан: $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{a, b, c\}$; $A_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ – чекли түпламлар; $B = \{2, 4, 6, \dots, 2n, \dots\}$, $C = \{1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots\}$, $D = \{2, 3, 5, 7, \dots, p, \dots\}$ – чексиз түпламлар.

a нарса A түпламнинг элементи эканлиги $a \in A$ ёки $A \ni a$ кўринишда белгиланади. Бирор b нарса A түпламнинг элементи эмаслиги $b \notin A$ ёки $A \ni b$ кўринишда ёзилади. Масалан: $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ да $2, 4, 6, 8, 10 \in A$, бироқ $12, 14 \notin A$.

A ва *B* түпламлар берилган бўлсин. Агар *A* түпламнинг *a* элементи *B* түпламнинг *b* элементига тенг, яъни $a = b$, деб олсак, бундан битта элемент иккала түпламда ҳам мавжудлиги келиб чиқади. Масалан, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ва $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ түпламлардаги 2, 4, 6, 8 элементлар уларнинг иккаласида ҳам мавжудdir.

2-таъриф. *A* түпламнинг ҳар бир элементи *B* түпламда мавжуд ва, аксинча, *B* түпламнинг ҳар бир элементи *A* түпламда ҳам мавжуд бўлса, *A* ва *B* түпламларни **тенг** (**тeng** кучли) деб аталади ва $A = B$ ёки $B = A$ белги билан ифодаланади.

Демак, тенг *A* ва *B* түплам аслида бир түпламdir.

3-таъриф. Агар *B* түпламнинг ҳар бир элементи *A* түпламда ҳам мавжуд бўлса, у ҳолда *B* түплам *A* түпламнинг қисм түплами деб аталади ва қуйидагича белгиланади:

$$B \subseteq A \text{ ёки } A \supseteq B. \quad (1)$$

Масалан: 1) бутун сонлар түплами ҳақиқий сонлар түпламнинг қисм түпламини ташкил этади;

2) вилоятлар республика вилоятлари түпламишининг қисм түпламини ташкил этади;

3) тоқ сонлар түплами бутун сонлар түпламишининг қисм түпламиdir ва ҳоқазо.

4-таъриф. *B* түпламнинг ҳамма элементлари *A* түпламда мавжуд бўлиб, шу билан бирга *A* түпламда *B* түпламга кирмаган элементлар ҳам бор бўлса, у ҳолда *B* түплам *A* түпламнинг хос қисм түплами деб аталади ва қуйидагича белгиланади:

$$B \subset A \text{ ёки } A \supset B. \quad (2)$$

Демак, $A \subset B$ ва $B \subset A$ бўлса, у ҳолда

$$A = B. \quad (3)$$

(3) тенглик *A* нинг ўзи ўзининг қисм түплами бўлишини кўрсатади ва бу ҳолатни ифодалаш учун «ўзининг хосмас қисми» деган иборадан фойдаланамиз.

Масалан, $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ түплам учун $B = \{a\}$, $C = \{a, b\}$, $D = \{d, e, f\}$ түпламларнинт ҳар қайсиси хос қисмдир.

Одатда, түпламлар назариясида битта ҳам элементти бўлмаган түпламлар билан иш кўришга тўғри келади. Масалан, $x^2 + 4 = 0$ тенгламанинг ҳақиқий илдизлари бўш түпламни ташкил қиласди, чунки $x_{1,2} = \pm 2i$, яъни тенгламанинг ҳақиқий илдизлари мавжуд эмас.


5-т аъриф. Битта ҳам элементга эга бўлмаган түплам бўш түплам деб аталади ва \emptyset символи билан белгиланади. \emptyset бўш түплам ҳар қандай A түпламнинг қисм түплами бўлади ва у ҳам A түпламнинг хосмас қисми дейилади.

2- §. Түпламлар устида амаллар

Түпламларнинг бирлашмаси. Түпламларнинг кесишмаси. Түпламларнинг айримаси. Тўлдирувчи. Универсал түплам.

A ва B түпламлар берилган бўлсин.

1-т аъриф. Берилган A ва B түпламларнинг йигиндиси ёки бирлашмаси деб, шу түпламларнинг тақоролнамасдан олинадиган ҳамма элементларидан тузилган ва $C = A \cup B$ каби белгиланадиган түпламга айтилади (I.1- шакл).




I.1- шакл.

Агар $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ түпламлар берилган бўлса, у ҳолда уларнинг $A \cup B$ йигиндиси қуйидагича ёзилади:


$$\bigcup_{\alpha=1}^n A_\alpha = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n. \quad (1)$$

Масалан, $A = \{a, b\}$, $B = \{a, c, b\}$, $C = \{e, f, k\}$ бўлса, у ҳолда $A \cup B \cup C = \{a, b, c, e, f, k\}$.

2-т аъриф. Берилган A ва B түпламларнинг ҳамма умумий элементларидан тузилган C түплам A ва B түпламларнинг кўпайтмаси (кесишмаси ёки умумий қисми) дейилади ва $C = A \cap B$ кўрининишида белгиланади (I.2- шакл).



I.2- шакл.



I.3- шакл.

Агар $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ түпламлар берилған бўлса, у ҳолда уларнинг $C = A \cap B$ кўпайтмаси қуидагича ёзилади:

$$\bigcap_{a=1}^n A_a = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n. \quad (2)$$

Масалан, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ бўлса, у ҳолда $C = \{2, 4\}$.

Битта ҳам умумий элементга эта бўлмаган түпламларнинг кесиши маси \emptyset бўш түпламга тенг бўлади. Масалан, тоқ сонлар түплами билан жуфт сонлар түплами нинг кесиши маси бўш түпламдир.

3- таъриф. *А ва B түпламларнинг айримаси деб, A нинг B да мавжуд бўлмаган ҳамма элементларидан тузиладиган ва $C = A - B$ ёки $C = A \setminus B$ кўринишида ёзиладиган С түпламга айтилади (I.3- шакл).*

Масалан, $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ва $B = \{3, 4, 5, 6\}$ бўлса, у ҳолда $C = \{1, 2\}$.

4- таъриф. *А түпламдаги унинг B қисм түпламига кирмай қолган ҳамма элементларидан тузилган қисм түплам B нинг A түпламгача тўлдирувчиси деб айтилади ва \bar{B} (ёки B') кўринишида белгиланади.*

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$ натурал сонлар түплами ва $B = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ жуфт сонлар түплами бўлса, у ҳолда $\bar{B} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ бўлади, яъни $B \cup \bar{B} = A$.

\bar{B} түплам B ни A гача тўлдиради. Ушбу тенгликларни келтириб чиқариш мумкин:

$$\bar{B} \cup B = \emptyset, \quad B \cap \bar{B} = A, \quad B - \bar{B} = B, \quad \bar{B} - B = \bar{B}.$$

5-таъриф. Бирор тўпламнинг хос қисми деб қаралмаган ҳар бир тўпламни универсал тўплам деб атаб, уни U ҳарфи билан белгилаймиз.

Таърифга биноан, U нинг ҳамма қисмлари орасида иккита хосмас қисми бор: биттаси U нинг ўзи, иккинчиси \emptyset бўш тўплам, қолганлари хос қисмлардан иборат.

3- §. Асосий тенгликлар (төнг күчлиликлар)

Асосий тенг күчлиликлар. Коммутативлик, ассоциативлик, дистрибутивлик қонунлари.

U универсал тўпламнинг қисмлари орасидаги муносабатларни ифодаловчи асосий тенгликлар қўйидагилардан иборат.

$$1. \bar{\bar{A}} = A.$$

Тўпламлар назариясида тенгликларни исботлашнинг умумий методи тенгликтинг бир томонидаги тўпламга тегишли ҳар бир элемент иккинчи томонидаги тўпламда ҳам мавжуд ва, аксинча, эканлигини кўрсатишдан иборатdir.

Исбот. $\bar{\bar{A}}$ тўплам \bar{A} нинг тўлдирувчиси. Шунинг учун $\bar{\bar{A}}$ нинг ҳар бир элементи $x \in \bar{A}$, демак, $x \in A$. Аксинча, A нинг ҳар бир элементи $x \in \bar{A}$ бўлгани учун $x \in \bar{\bar{A}}$. Демак, $\bar{\bar{A}} = A$.

2. $A \cap B = B \cap A$ – кўпайтмага нисбатан коммутативлик қонуни.

Исбот. $A \cap B$ нинг ҳар бир элементи A ва B да мавжуд, чунки $A \cap B$ тўплам A ва B нинг умумий элементларидан тузилган. Демак, $A \cap B$ нинг элементлари $B \cap A$ да ҳам мавжуд. Худди шу каби, $B \cap A$ нинг ҳар бир элементи B ва A да мавжуд, чунки $B \cap A$ тўплам B ва A нинг умумий элементларидан тузилган. Шунинг учун $B \cap A$ тўпламнинг ҳар бир элементи $A \cap B$ тўпламнинг ҳам элементи бўлади. Демак, $A \cap B = B \cap A$.

3. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ – күпайтмага нисбатан ассоциативлик қонуни.

Исбот. $x \in (A \cap B) \cap C$ бўлсин. Демак, $x \in (A \cap B)$ ва $x \in C$. Бу ердан $x \in A$, $x \in B$ ва $x \in C$ эканлиги келиб чиқади. Шунинг учун $x \in A$ ва $x \in B \cap C$ дир. Бу ердан ўз навбатида $x \in A \cap (B \cap C)$ эканлиги келиб чиқади. Исботнинг иккинчи қисмини ўкувчига ҳавола этамиз.

4. $A \cup B = B \cup A$ – йифиндига нисбатан коммутативлик қонуни.

5. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ – йифиндига нисбатан ассоциативлик қонуни.

4 ва 5- тенгликларнинг исботлари худди 2 ва 3- тенгликларни исботлашга ўхшаш амалга оширилади.

6. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ – күпайтмага нисбатан дистрибутивлик қонуни.

7. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ – йифиндига нисбатан дистрибутивлик қонуни.

6- тенгликтин исботи: $x \in A \cap (B \cup C)$ бўлсин, у ҳолда $x \in A$ ва $x \in B \cup C$ бўлади. Бу ердан $x \in A$ ва $x \in B$ ёки $x \in A$ ва $x \in C$ келиб чиқади. Демак, $x \in A \cap B$ ёки $x \in (A \cap C)$. Шунинг учун $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Энди $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ бўлсин, у ҳолда $x \in (A \cap B)$ ёки $x \in (A \cap C)$ бўлади. Бу ердан $x \in A$ ва $x \in B$ ёки $x \in A$ ва $x \in C$ келиб чиқади. Демак, $x \in A \cap (B \cup C)$.

$$8. \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}. \quad 9. \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}. \quad 10. A \cap A = A.$$

$$11. A \cap U = A. \quad 12. \overline{A \cup A} = \bar{A}. \quad 13. A \cup \emptyset = A.$$

4- §. Тўпламлар алгебраси

Айниятлар. Теоремалар. Де Морган қонуни. Жуфт-жуфт эквивалент.

Тўпламлар алгебрасида \cup , \cap , $-$, \subseteq белгилари орасидаги ўзаро муносабатлар кўриб чиқилади. Тўпламлар алгебрасида,

умуман, оддий алгебрадагидек айниятлар – тенгликлар күрилади. Бу айниятлар универсал тұпламнинг ва унинг хос қисм тұпламларининг қандай бўлишидан қатъи назар ўз кучини сақлади.

1-теорема. *Универсал тұпламнинг исталган A, B, C қисм тұпламлари орасидаги муносабатларни ифодаловчи қуйидаги тенгликлар айниятдир:*

- | | |
|---|--|
| 1. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$. | 1'. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$. |
| 2. $A \cup B = B \cup A$. | 2'. $A \cap B = B \cap A$. |
| 3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$. | 3'. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. |
| 4. $A \cup \emptyset = A$. | 4'. $A \cap U = A$. |
| 5. $A \cup \bar{A} = U$. | 5'. $A \cap \bar{A} = \emptyset$. |

Агар $A \subseteq B$ ва $B \subseteq A$ бўлса, у ҳолда $A = B$. Ана шу хоссадан фойдаланиб юқорида келтирилган айниятлар исбот қилинади, яъни тенгликнинг чап томонидаги ҳар бир элемент унинг ўнг томонида ҳам мавжуд ва аксинча эканлигини кўрсатиш керак. Биз юқоридаги айниятларнинг айримларини исбот этган эдик.

1 ва 1'-айниятлар мос равищда *йигинди* ва *кўтайдма амаллари* учун *ассоциативлик* қонунлари дейилади. 2 ва 2'-айниятлар *коммутативлик* қонуни ва 3, 3'-айниятлари эса шу амаллар учун *дистрибутивлик* қонуни дейилади.

Ассоциативлик қонунига асосан A, B, C қисм тұпламлардан маълум тартибда йигинди амали билан ҳосил қилинган икки тұплам тентдир. Бу тұпламни $A \cup B \cup C$ шаклда белгилаймиз.

Ассоциативлик қонунига кўра қавс белгиси қаерда туриши ҳеч қандай роль ўйнамайди. Математик индукция методига асосан

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup A_{i_3} \cup \dots \cup A_{i_r},$$

бу ерда 1', 2', ..., n' белгилашлар 1, 2, ..., n сонларининг исталган тартибда олинганидан ҳосил қилинган сонларни билдиради.

Шу тариқа қуйидаги тенгликларни ҳам келтириб чиқарып мүмкін:

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n = A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3} \cap \dots \cap A_{i_k},$$

$$A \cup (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n) = (A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap \dots \cap (A \cup B_n),$$

$$A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n) = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n).$$

Күрсатылған 1—5 ва 1'—5' тенгликлардан қуйидаги х у л о с а ни ҳосил қиласыз: 1- теоремадаги айнияттар жуфтжуфт тарзда шундай жойлаштырылғанки, бири иккінчисідан \cup ва \cap ҳамда \emptyset ва U белгиларни бир вақтда ўзаро жойлағарни алмаштириш натижасыда келиб чиқади.

2-теорема. U универсал түпламнинг исталған A ва B қисм түпламлары учун қуйидагилар үринлидір:

6. Агар ҳамма A лар

учун $A \cup B = A$ бўлса,
у ҳолда $B = \emptyset$.

6'. Агар исталған A учун

$A \cap B = A$ бўлса, у ҳолда
 $B = U$.

7 ва 7'. Агар $A \cup B = U$ ва $A \cap B = \emptyset$ бўлса, у ҳолда $B = \bar{A}$.

8 ва 8'. $\bar{\bar{A}} = A$.

9. $\overline{\emptyset} = U$.

9'. $\overline{U} = \emptyset$.

10. $A \cup A = A$.

10'. $A \cap A = A$.

11. $A \cup U = U$.

11'. $A \cap \emptyset = \emptyset$.

12. $A \cup (A \cap B) = A$.

12'. $A \cap (A \cup B) = A$.

13. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

13'. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

2-теореманинг айрим тенгликлари адабиётда маҳсус номга эгадир. Масалан, 10 ва 10'-тенгликлар идемпотенттік қонуни, 12 ва 12'-тенгликлар ютиши қонуни, 13 ва 13'-тенгликлар де Морган қонуни деб аталади.

Түпламлар алгебрасыда бирор тенгликдан шу тенгликка кирған \cup ни \cap га, \cap ни \cup га, \emptyset ни U га, U ни \emptyset га бирданига алмаштириш натижасыда ҳосил қилингандык иккінчи тенглик биринчи тенгликка ва, аксинча, биринчи тенглик иккінчи тенгликка нисбатан иккі тарафлама тенглик деб айтилади.

3-теорема. Исталган A ва B түпнамлар учун қуйидаги муроҳазалар жуфт-жуфт эквивалентдир:

$$(I) A \subseteq B; \quad (II) A \cap B = A; \quad (III) A \cup B = B. \quad (1)$$

R_1, R_2, \dots, R_n муроҳазалар жуфт-жуфт эквивалентдир леган тасдиқ қуйидагини билдиради: исталган i ва j учун R_i муроҳаза R_j муроҳазага эквивалентдир. Бу муроҳаза ўз навбатида фақатгина R_i муроҳаза R_j муроҳазанинг, R_j муроҳаза R_i муроҳазанинг, ..., R_{n-1} муроҳаза R_n муроҳазанинг тўғрилигини келтириб чиқаргандагина тўғридир.

Исбот. (I) муроҳаза (II) муроҳазанинг тўғрилигини келтириб чиқаради. Ҳақиқатан, $A \subseteq B$ бўлсин. Исталган A ва B учун $A \cap B = A$ эканлигини кўрсатиш керак.

а) $\overline{x \in A \cap B}$ бўлса, у ҳолда $x \in A$ ва $x \in B$ дир. Демак, $A \cap B \subseteq A$.

б) $x \in A$ бўлсин. У ҳолда (II) га асосан $x \in B$ ҳамдир. Шунинг учун $A \subseteq A \cap B$, яъни (I) муроҳаза (II) муроҳазанинг тўғрилигини келтириб чиқаради.

Энди $A \cap B = A$ бўлсин, у ҳолда $A \cup B = B$ эканлигини исбот қиласиз:

$$A \cup B = (A \cap B) \cup B = (A \cup B) \cap (B \cup B) = (A \cup B) \cap B = B.$$

Демак, $A \cup B = B$.

(III) муроҳаза (I) муроҳазанинг тўғрилигини келтириб чиқаради. Ҳақиқатан ҳам, $A \cup B = B$ ва $A \subseteq A \cup B$ бўлишидан $A \subseteq B$. Бу билан исбот якунланади.



Муаммоли масала ва топшириклар

1. а) $\overline{A \cap \bar{B}} \cup B = \bar{A} \cup \bar{\bar{B}} \cup B = \bar{A} \cup B \cup B = \bar{A} \cup B;$

б) $(A \cap B \cap C \cap \bar{X}) \cup (\bar{A} \cap C) \cup (\bar{B} \cap C) \cup (C \cap X) = C$
еканлиги исбот этилсин.

2. Ушбу түпламларнинг ҳар иккитаси ва ҳар утасининг кесишмалари ва бирлашмаларини топинг:

$A = \{a, b, c\}$, $B = \{d, e, f, g\}$, $C = \{a, f, g, k, c\}$.

3. $A = \{1, 2, \dots, n\}$ түплам учун $B = \{3, 6, 9, 12, \dots, 3n, \dots\}$ қисм түпламдир. \bar{B} ни топинг.
4. $(A \cap B \cap X) \cup (A \cap B \cap C \cap X \cap Y) \cup (A \cap X \cap \bar{A}) = A \cap B$ тенгликни исботланг.
5. 7–13- асосий тенг кучлиликларни исботланг.



Мустақил ишилаш учун савол ва топшириқлар

1. Түпламлар назариясининг асосий түшүнчлери нимадан иборат?
2. Түпламлар устида қандай амаллар бажарылады?
3. Асосий тенг кучлиликларни ёзинг.
4. Қандай түпламлар түпламлар алгебраси деб айтылады?
5. Мулоҳазаларнинг жуфт-жуфт эквивалентлігінинг шартлари.

5- §. Муносабатлар. Бинар муносабат

- Муносабат. Тартибланган жуфтлик. Унар ва бинар муносабатлар. n-ар муносабат. Аниқланиш соңаси. Қийматлар соңаси.*

Дискрет математикада фундаментал түшүнчалардан бири бўлган **муносабат** түшүнчаси предметлар (нарсалар) ва түшүнчалар орасидаги алоқани ифодалайди. Қуйидаги тўлиқсиз гаплар муносабатларга мисол бўла олади:

... кичик ... дан; ... тенг ... га; ... бўлинади ... га ва ҳоказо.

Бундан кейин муносабат түшүнчаси түпламлар назарияси нуқтаи назаридан туриб ўрганилади.

Муносабат түшүнчасини аниқлаш учун **тартибланган жуфтлик** түшүнчасига аниқлик киритайлик. Маълум тартибда жойлашган икки предметдан тузилган элемент **тартибланган жуфтлик** дейилади. Математикада тартибланган жуфтлик қуйидаги хусусиятларга эга бўлади, деб фараз қилинади:

1) ҳар қандай (исталған) x ва y предметлар учун $\langle x, y \rangle$ каби белгиланадиган маълум обьект мавжуд бўлиб, у x ва y нинг тартибланган жуфтлиги деб ўқилади. Ҳар бир x ва y предметларга ягона тартибланган $\langle x, y \rangle$ жуфтлик мос келади;

2) иккита $\langle x, y \rangle$ ва $\langle u, v \rangle$ тартибланган жуфтлик берилган бўлсин. Агар $x = u$ ва $y = v$ бўлса, у ҳолда $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ бўлади.

Тартибланган жуфтлик $\langle x, y \rangle$ қўйидаги тўпламдир:

$$\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\},$$

яъни шундай икки элементли тўпламдирки, унинг битта элементи $\{x, y\}$ тартибсиз жуфтликдан иборат, иккинчиси эса $\{x\}$, шу тартибсиз жуфтликнинг қайси ҳади биринчи ҳисобланиши кераклигини кўрсатади.

Тартибланган жуфтлик $\langle x, y \rangle$ нинг x предмети унинг *биринчи координатаси*, y предмети эса *иккинчи координатаси* деб аталади.

Тартибланган жуфтликлар атамаси асосида тартибланган n -ликларни аниқлаш мумкин. x, y ва z предметларнинг тартибланган учлиги $\langle x, y, z \rangle$ қўйидаги тартибланган жуфтликлар шаклида аниқланади: $\langle\langle x, y \rangle, z \rangle$. Худди шу каби x_1, x_2, \dots ва x_n предметларнинг тартибланган n -лиги $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$, таърифга асоссан, $\langle\langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$ тарзда аниқланади.

Элементлари тартибланган жуфтликлардан иборат бўлган тўплам тартибланган жуфтликлар тўплами деб аталади.

Бинар муносабатни тартибланган жуфтликлар тўплами сифатида аниқлаймиз. Агар ρ бирор муносабатни ифодаласа, у ҳолда $\langle x, y \rangle \in \rho$ ва $x \rho y$ ифодаларни ўзаро алмашувчи ифодалар деб ҳисоблаймиз. $x \rho y$ ифодани «предмет x предмет y га нисбатан ρ муносабатда» деб ўқилади.

Қўйидаги $x = y$, $x < y$, $x \equiv y$ белгилар $x \rho y$ ифодадан келиб чиққан.

n -ар муносабати тартибланган n -ликлар түплами сифатыда аниқланади. 3-ар муносабатни күпинча адабиётта *тернар муносабат* деб ҳам юритилади.

Мисоллар. 1. $\{<2, 4>, <5, 6>, <7, 6>, <8, 8>\}$ тартибланган жуфтликлар түплами бинар муносабатта мисол бўла олади.

2. Агар ρ айният муносабатини билдирса, у ҳолда $\langle x, y \rangle \in \rho$ дегани $x = y$ ни билдиради.

3. Агар ρ оналиқ муносабатини билдирса, у ҳолда $\langle \text{Хуршида, Ирода} \rangle \in \rho$ символи Хуршида Ироданинг онаси эканлигини билдиради.

4. Тернар муносабатига бутун сонлар түпламидаги кўшиш амали мисол бўла олади. $5 = 2 + 3$ ёзувини $\langle 5, 2, 3 \rangle \in +$ шаклида ҳам ёзиш мумкин.

Бундан кейин бинар муносабат атамаси ўрнига қисқалик учун муносабат атамасини ишлатамиз.

$\{x/x \in A\}$ символини қўйидагича тушуниш керак: {Шундай x лар түпламики, $x \in A\}$.

$\{x/\text{айрим } y \text{ учун } \langle x, y \rangle \in \rho\}$ түплами ρ муносабатнинг аниқланыш соҳаси дейилади ва D_ρ символи билан белгиланади. $\{y/\text{айрим } x \text{ учун } \langle x, y \rangle \in \rho\}$ түплами ρ муносабатнинг қийматлар соҳаси дейилади ва R_ρ символи билан белгиланади. Бошқача қилиб айтганда, ρ муносабатнинг аниқланыш соҳаси деб, шу ρ муносабатнинг биринчи координаталаридан тузилган түпламга айтилади, иккинчи координаталаридан тузилган түплам эса қийматлар соҳаси дейилади.

Мисол. $\{<2, 4>, <3, 3>, <6, 7>\}$ ρ муносабат берилган бўлсин. У ҳолда $D_\rho = \{2, 3, 6\}$, $R_\rho = \{4, 3, 7\}$.

Бирор C түплам $\langle x, y \rangle$ тартибланган жуфтликлар түплами бўлсин. Агар x бирор X түпламнинг элементи ва у бошқа Y түпламнинг элементи бўлса, у ҳолда C түплам X ва Y түпламларнинг тўғри (декарт) кўпайтмасидан тузилган түплам дейилади ва қўйидагича белгиланади:

$$C = X \times Y = \{\langle x, y \rangle / x \in X \text{ ва } y \in Y\}.$$

Ҳар бир ρ муносабат айрим олинган $X \times Y$ түғри күпайтманинг қисм түплами бўлади ва $X \sqsupseteq D_\rho$, $Y \sqsupseteq R_\rho$. Агар $\rho \subseteq X \times Y$ бўлса, у ҳолда ρ шу X дан Y га бўлган муносабат деб аталади. Агар $\rho \subseteq X \times Y$ ва $Z \sqsupseteq X \cup Y$ бўлса, у ҳолда ρ дан Z га бўлган муносабат деб аталади. Z дан Z га бўлган муносабатни Z ичидаги муносабат деб аталади.

X бирор түплам бўлсин. У ҳолда X ичидаги $X \times X$ муносабат X ичидаги универсал муносабат деб аталади.

$\{<x, x> / x \in X\}$ муносабат X ичидаги айният муносабати деб аталади ва i_x ёки i символи билан белтиланади. Ҳар қандай X түпламнинг x ва у элементлари учун $x i_x y$ ифода $x = y$ билан тенг кучлидир.

A түплам ва ρ муносабат берилган бўлсин. У ҳолда $\rho[A] = \{y/A$ нинг айрим x лари учун $x\rho y\}$. Бу түплам A түплам элементларининг ρ - образлари түплами деб айтилади.

Мисол. $y = 2x + 1$ түғри чизиқни $\{<x, y> \in R \times R / y = 2x + 1\}$ ва $y < x$ муносабатини $\{<x, y> \in R \times R / y < x\}$ шаклларда ёзиш мумкин.

6- §. Эквивалентлик муносабати

- Рефлексив, симметрик ва транзитив муносабатлар. Эквивалентлик синфи.*

1-таъриф. Агар X түпламнинг исталган x элементи учун $x\rho x$ бўлса, у ҳолда ρ муносабати X түпламдаги рефлексив муносабат деб аталади; агар $x\rho y$ дан $y\rho x$ келиб чиқса, у ҳолда ρ симметрик муносабат деб аталади; агар $x\rho y$ ва $y\rho z$ дан $x\rho z$ келиб чиқса, у ҳолда ρ транзитив муносабат деб аталади.

Шу кўрсатилган учала хоссага эга бўлган муносабатлар математикада кўп учрагани учун уларга маҳсус ном кўйилган.

2-таъриф. Агар бирор түпламдаги муносабат рефлексив, симметрик ва транзитив хоссаларга эга бўлса, у ҳолда бундай муносабат шу түпламдаги эквивалентлик муносабати дейилади.

Агар ρ муносабати X түпламдаги эквивалентлик муносабати бўлса, у ҳолда $D_\rho = X$.

Мисоллар. Қўйидаги ҳар бир муносабат маълум түпламдаги эквивалентлик муносабатига мисол бўла олади:

1. Исталган түпламдаги тенглик муносабати.
2. Евклид текислигининг ҳамма учбурчаклар түпламидаги ўхшашлик муносабати.
3. Бутун сонлар түпламидаги n модуль бўйича таққослама муносабати.
4. Мамлакатда яшовчи одамлар түпламидаги «бир уйда яшовчилар» муносабати.

Эквивалентлик муносабати ушбу асосий хусусиятга эга: у түпламни кесишмайдиган қисм түпламларга бўлади. Кейинги мисол, масалан, «бир уйда яшовчилар» муносабати мамлакатни бир-бири билан кесишмайдиган «бир уйда яшовчилар» қисм түпламларига бўлади. Бу айтилганларни қўйидагича умумлаштириш мумкин.

Р бирор X түпламдаги эквивалентлик муносабати бўлсин. Агар X түпламнинг A қисм түпламининг шундай x элементи топилиб, $A = \{y/x\}$ бўлса, у ҳолда A қисм түплам эквивалентлик синфи ёки эквивалентлик ρ -синфи деб аталади.

Шундай қилиб, X түпламнинг шундай элементи мавжуд бўлсаки, $A = \rho[\{x\}]$ тенглик бажарилса, у вақтда A түплам эквивалентлик синфи бўлади.

Агарда ρ муносабат тўғрисида ҳеч қандай англашилмовчилик туғилмайдиган бўлса, у вақтда X түплам $[x]$ шаклида белгиланади, яъни $\rho[\{x\}] = [x]$ ва x юзага келтирган эквивалентлик синфи деб аталади.

Эквивалентлик синфи қўйидаги икки хоссага эга:

- 1) $x \in [x]$ – бир синфнинг ҳамма элементлари ўзаро эквивалентdir;
 - 2) агар $x \rho y$ бўлса, у ҳолда $[x] = [y]$.
- 1-хосса эквивалентлик муносабатининг рефлексивлик хусусиятидан келиб чиқади.

2- хоссанинг исботи. $x \rho u$ бўлсин, яъни x элемент u элементтің эквивалент бўлсин, у ҳолда $[u] \subseteq [x]$. Ҳақиқатан ҳам, $z \in [u]$ ($u \rho z$ ни билдиради) дан ва $x \rho z$ бўлганлиги учун u муносабатнинг транзитивлик хусусиятига асосан $x \rho z$ келиб чиқади, яъни $z \in [x]$. Эквивалентлик муносабатининг симметриклик хоссасидан фойдаланиб, $[x] \subseteq [u]$ ни исбот этиш мумкин. Демак, $[x] = [u]$.

7- §. Функция түшүнчеси. Функциялар суперпозицияси

Функция. Тартибланган жуфтлик. **Функциялар тенглиги.** **Бир қийматлы функция.** **Суперпозиция.** **Функцияларнинг функцияси.** **Тескари функция.**

Функция түшүнчесини олдинги параграфларда ўрганилган атамалар орқали аниқлаймиз. Функциянынг графиги тартибланган жуфтликлар тўпламидан иборат. Функция билан унинг графиги ўртасида ҳеч қандай фарқ йўқ. Функция шундай муносабатки, унинг икки хил элементининг биринчи координаталари ҳеч қачон тенг бўлмайди.

Шундай қилиб, f муносабат қўйидаги талабларни қаноатлантиргандагина функция бўла олади:

1) f нинг элементлари фақат тартибланган жуфтликлардан иборат;

2) агар $\langle x, y \rangle$ ва $\langle x, z \rangle$ элементлар f нинг элементлари бўлса, у ҳолда $y = z$.

Мисоллар. 1. $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ функциядир. $D_s = \{1, 2, 3\}$, $R_s = \{2, 4\}$.

2. $\{\langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 4, 6 \rangle\}$ муносабати функция бўла олмайди, чунки $\langle 3, 4 \rangle$ ва $\langle 3, 5 \rangle$ элементларининг биринчи координаталари тенг.

3. $\{\langle x, x^2 + x + 1 \rangle / x \in R\}$ функциядир, чунки агар $x = u$ бўлса, у ҳолда $x^2 + x + 1 = u^2 + u + 1$.

4. $\{\langle x^2, x \rangle / x \in R\}$ функция бўла олмайди, чунки унинг $\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, -1 \rangle$ элементлари мавжуд.

Агар f – функция ва $\langle x, y \rangle \in f$, яъни xy бўлса, у ҳолда x функциянинг аргументи, у эса f функциянинг x даги қиймати ёки x элементининг образи дейилади.

У ни белгилаш учун xf , $f(x)$, fx ёки x^f символлари ишлатилади. $f(x)$ символни $f(x) = f[\{x\}]$ деб, яъни x элементининг f -образлари тўплами деб қараш мумкин.

Икки f ва g функция бир хил элементлардан тузилган бўлса, бундай функциялар тенг бўлади ($f = g$), яъни бошқача қилиб айтганда, $D_f = D_g$ ва $f(x) = g(x)$ бўлсагина, $f = g$ бўлади. Шундай қилиб, функция берилган бўлиши учун унинг аниқланиш соҳаси ва шу соҳанинг ҳар бир элементи учун унинг қиймати берилиши керак.

$\langle \langle x, x^2 + x + 1 \rangle / x \in R \rangle$ дан $f(x) = x^2 + x + 1$ келиб чиқади.

Агар f функциянинг аниқланиш соҳаси $R \subseteq Y$ бўлса, у ҳолда функциянинг ўзгариш соҳаси Y тўплам ичидаги бўлади деб айтилади ва қўйидагича белгиланади:

$$f: X \rightarrow Y \text{ ёки } X \xrightarrow{f} Y.$$

Юқорида кўрсатилган ҳамма f тўплами ($X \times Y$) тўпламнинг қисм тўплами бўлади ва уни Y^X деб белгилаймиз.

Агар $X = \emptyset$ бўлса, у ҳолда Y^X фақатгина бир элементдан иборат бўлади ва у $X \times Y$ тўпламнинг бўш қисм тўпламидир.

Агар $Y = \emptyset$ ва $X \neq \emptyset$ бўлса, у ҳолда $Y^X = \emptyset$.

Агар $x_1 \neq x_2$ дан $f(x_1) \neq f(x_2)$ келиб чиқса, у ҳолда f бир қийматли функция дейилади.

Иккита f ва g функция берилган бўлсин. f ва g функцияларнинг суперпозицияси деб, $g \circ f = \{\langle x, z \rangle \mid x \in X, z \in Y, \exists y \in Y : \langle x, y \rangle \in f \text{ и } \langle y, z \rangle \in g\}$ шундай у мавжудки, xy ва yz тўпламга айтилади ва $g \circ f$ символи билан белгиланади. Бу тўплам ҳам функция бўлади.

Шундай қилиб, функцияларнинг суперпозицияси қўйидагича бўлади:

$$g \circ f = z = g(f(x)).$$

Функцияларнинг суперпозицияси функцияларнинг функцияси деб ҳам айтилади.

$y = \sin x$ ва $z = \ln y$ бўлсин, у ҳолда $z = \ln \sin x$ функция $\sin x$ ва $\ln y$ функцияларнинг суперпозициясидир.

Суперпозиция амали ассоциативлик қонунига бўйсунади, яъни

$$g \circ (f \circ h) = g \circ f \circ h.$$

Агар $f: x \rightarrow y$ ва $g: y \rightarrow z$ бўлса, у ҳолда $g \circ f: x \rightarrow z$ ва $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ бўлади.

Агар f бир қийматли функция бўлса, у ҳолда f дан координаталарининг ўрнини алмаштириш натижасида ҳосил бўладиган функция f функцияга тескари бўлган функция деб аталади ва f^{-1} символи билан белгиланади. Фақат бир қийматли функциялар учун бажариладиган бу амал қайтариш амали дейилади. f^{-1} нинг аниқланиш соҳаси $D_{f^{-1}} = R_f$, $R_{f^{-1}} = D_f$.

8- §. Тартиблаш муносабати

- Тартиблаш муносабати. Антисимметрик муносабат.**
Қисман тартиблаш муносабати. Иррефлексив муносабат.
Чизиқли тартиблаш муносабати. Қисман тартибланган тўплам.

1-таъриф. Агар бирор X тўпламдаги x ва у элементлар учун урх муносабат ўрнига x у муносабат ўринли бўлишини кўрсатувчи муносабат тартиблаш муносабати деб аталади.

Тартиблаш муносабати ёрдамида элементларни қайсан тартибда қўйиш масаласини ҳал этиш мумкин. Ҳақиқийсонлар тўплами учун $<$, \leq , $>$, \geq муносабатлари тартиблаш муносабатларига мисол бўла олади. Тўпламдар системаси учун худди шундай вазифани \subset , \subseteq муносабатлар ўйнайди.

2-таъриф. Агар X тўпламнинг исталган x ва у элементлари учун бир вақтда x урх муносабатининишидан $x = y$ келиб чиқса, бундай р муносабат антисимметрик муносабат деб аталади.

3- таъриф. *Х түплам ичида рефлексивлик, антисимметриклик ва транзитивлик муносабатынан көрсөлдөнүү болуп саналади. Қисман тартиблаш муносабаты деб аталади. Ҳар қандай рефлексив ва транзитив муносабат тартиблаш муносабаты деб аталади.*

Қисман тартиблаш муносабати \leq символи билан белгиланади. Агар \leq муносабати *X* түпламни қисман тартибласа, у ҳолда *X* түпламнинг исталган x ва у элементлари учун $x \leq y$ муносабати бажарилиши ҳам мумкин, бажарылмаслиги ҳам мумкин.

Худди шу каби, агар $x \leq y$ ва $x \neq y$ бўлса, у ҳолда $x < y$ деб ёзилади ва x элемент у дан кичик деб аталади.

4- таъриф. *Х түпламнинг ҳар қандай x элементи учун $x = x$ муносабат бажарылмаса, у ҳолда ρ шу *X* түпламдаги иррефлексив муносабат деб аталади.*

Агар \leq муносабати *X* түпламдаги қисман тартиблаш муносабати бўлса, у ҳолда $<$ муносабати *X* түпламдаги иррефлексив ва транзитив муносабат бўлади.

5- таъриф. ρ муносабат қисман тартиблаш муносабати бўлсин. ρ муносабатнинг аниқланиши соҳасига қарашили ҳар қандай икки хил x ва у элементлари учун ехру ёки еурх ўринли бўлса, бундай муносабат чизиқли (оддий) тартиблаш муносабати деб аталади.

Ҳақиқий сонларни қийматига қараб тартиблаш чизиқли тартиблаш муносабатига мисол бўла олади.

6- таъриф. *Агар бирор *X* түпламда қисман тартиблаш муносабати берилган бўлса, бундай түплам қисман тартибланган түплам деб аталади ва у $\langle x, \leq \rangle$ тартибланган жуфтликдан иборат бўлади.*

Агар *X* түпламда оддий тартиблаш муносабати берилган бўлса, у ҳолда *X* оддий тартибланган түплам деб аталади ва у ҳам $\langle x, \leq \rangle$ тартибланган жуфтликдан иборат бўлади, бу ерда \leq муносабат *X* түпламни оддий (чизиқли) тартиблайди.

Масалан, агар f тўпламлар системаси бўлса, у ҳолда $\langle f, \subseteq \rangle$ қисман тартибланган тўплам бўлади.

$f: x \rightarrow x'$ функция учун $x \leq y$ дан $f(x) \leq^1 f(y)$ келиб чиқса, у ҳолда бу функция X тўпламнинг \leq тартиблаш муносабатига ва X' тўпламнинг \leq^1 тартиблаш муносабатига нисбатан тартибини сақладиган функция бўлади. X ва X' тўпламлар ўртасидаги ўзаро бир қийматли боғланиш $\langle x, \leq \rangle$ ва $\langle x', \leq^1 \rangle$ га қисман тартибланган тўпламлар ўртасидаги изоморфизм деб айтилади. Агар шундай боғланиш мавжуд бўлса, у вактда кўрсатилган қисман тартибланган тўпламлар изоморфдир.

X тўпламнинг ҳамма x лари учун $y \leq x$ бўлса, у ҳолда X тўпламнинг y элементи X тўпламнинг қисман тартиблаш муносабати \leq га нисбатан энг кичик элементи деб айтилади. Агар шундай элемент мавжуд бўлса, у ягонадир.

X тўпламнинг ҳеч бир x элементи учун $x < y$ муносабати бажарилмаса, у ҳолда X тўпламнинг y элементи шу тўпламнинг қисман тартиблаш \leq муносабатига нисбатан минимал (энг кичик) элементи деб айтилади. Берилган тўпламда минимал элемент бир нечта бўлиши мумкин.

Агар ҳар қандай $x \in y$ учун $x \leq y$ бўлса, у ҳолда X тўпламнинг y элементи шу тўпламнинг \leq муносабатига нисбатан энг катта элементи деб айтилади. Агар шундай элемент мавжуд бўлса, у ҳам ягонадир.

X тўпламнинг ҳеч бир x элементи учун $x > y$ муносабати бажарилмаса, у ҳолда X тўпламнинг y элементи шу тўпламнинг \leq муносабатига нисбатан максимал элементи деб айтилади.

Агар X тўпламнинг ҳар бир бўш эмас қисм тўплами энг кичик элементга эга бўлса, у ҳолда $\langle x, \leq \rangle$ қисман тартибланган тўплам тўлиқ тартибланган тўплам деб аталади. Масалан, $\{0, 1, 2, \dots\}$.

$\langle x, \leq \rangle$ қисман тартибланган ва $A \subseteq X$ бўлсин. У ҳолда исталган $a \in A$ учун $a \leq x$ бажарилса, X тўпламнинг x элементи A тўпламнинг юқори чегараси деб аталади. Худди шу каби,

агар исталган нэв A үүн $x \leq a$ бажарилса, x элементи A түпламнинг қуйи чегарасы дэб аталади.

Агар M тартибланган түплам бўлса, у ҳолда унинг M^1 қисм түплами ҳам тартибланган бўлади. Агар бу тартибланган түплам чизикли бўлса, у ҳолда M^1 қисм түплам M түпламнинг занжирси дейилади.

$l = |M^1| - 1$ ифода занжирининг узунлиги деб аталади, бу ерда $|M^1|$ – чизикли тартибланган M^1 қисм түпламнинг қуввати. l узунликдаги ҳар бир занжир $1, 2, \dots, l+1$ бутун сонли занжирга изоморфдир.

M түпламнинг энг катта элементини m_1 билан ва энг кичик элементини m_0 билан белгилаймиз.

M тартибланган түплам m_i элементининг баландлиги $d(m_i)$ деб $m_0 < m_1 < m_2 < \dots < m_l$ (M түпламнинг) занжирлар узунлигининг максимумига (I_{\max}) айтилади. M тартибланган түплам узунлиги $d(M)$ деб M түпламдаги занжирлар узунлигининг максимумига айтилади, яъни тартибланган M түпламнинг узунлиги $d(M)$ унинг элементлари баландлиги $d(m_i)$ нинг максимумига тенг бўлади:

$$d(M) = \max d(m_i), m_i \in M.$$

9- §. Панжара ҳақида тушунчалар

Панжара. Сигнатура. Дистрибутивлик критерийси. Дедекинд (модуляр) панжара. Дедекиндлик критерийси. Изоморф. Изоморфизм.

Кисман тартибланган түплам тушунчасидан фойдаланиб, панжара тушунчасини аниқлаймиз.

Таъриф. Тартибланган түплам $\langle M, \leq \rangle$ нинг исталган иккита m_i, m_j элементи орасида $m_i \sqcup m_j$ (энг катта қуйи ёқ) ва $m_i \sqcup m_j$ (энг кичик юқори ёқ) муносабатлар мавжуд бўлса, бундай түплам панжара деб аталади.

Равшанки, M панжарага икки тарафлама бўлган \bar{M} тартибланган түплам ҳам панжара бўлади. \bar{M} панжарада кесишма

амалини бирлашмага ва бирлашма амалини кесишмә амалига ўзгартырыш керәк. Тартибланған түплемнинг ҳамма қисем түплемлари зерттегінде күйи ва эңг киңік жеке араға эта бўлса, у ҳолда бундай түплем төмнәк панжара деб аталади.

Панжарани сингнатуралари күйидеги хуусиятларга эта бўлган $A = \langle M, U, \cap \rangle$ алгебра сифатида ҳам аниклаш мумкин:

- 1) $m_i \cup m_j = m_j \cup m_i = m_i$ – идемпотентлик;
- 2) $m_i \cup m_j = m_i \cup m_k$, $m_i \cap m_j = m_i \cap m_k = m_i$ – коммутативлик;
- 3) $(m_i \cup m_j) \cap m_k = m_i \cap (m_j \cup m_k)$,
 $(m_i \cup m_j) \cup m_k = m_i \cup (m_j \cup m_k)$ – ассоциативлик;
- 4) $m_i \cup (m_j \cap m_k) = m_j$, $m_i \cap (m_j \cup m_k) = m_i$ – ютиш.

Панжарага берилган иккала таъриф ҳам эквивалентdir.

Бундан кейин 0 ва 1 ни панжаранинг мос равищда структуралы нөли ва бирни деб биламиш.

Агар A' түплем ҳар бир $m_i, m_j \in A$ жуфт элементлар билан биргаликда уларнинг йигиндиси $m_i \cup m_j$ ва күпайтмаси $m_i \cap m_j$ ни ҳам ўз ичига олса, у ҳолда A' түплем A панжаранинг қисм панжараси деб аталади. Энг катта m_α элемент ва энг киңик m_α элементдан иборат A' қисм панжара 1 интервал деб аталади:

$$I = [m_\alpha, m_\beta] = \{m_i \in A' / m_\alpha \leq m_i \leq m_\beta\}.$$

Агар

$$m_\alpha \cap m_\beta = 0, \quad m_\alpha \cup m_\beta = 1$$

бўлса, у ҳолда нол ва бир структуралы A панжарада иккита m_α ва m_β элемент қўшимча (тўлдирувчи) элементлар бўлади. m га қўшимча бўлган \bar{m} элемент A панжарадаги m элементининг тўлдирувчиси деб ҳам аталади.

A панжарада умумий тўлдирувчига эта бўлган икки элемент A да боғланган элементлар деб аталади.

Панжаралар синфининг энг муҳими дистрибутив панжаралардир. Күйидеги айниятларни (ҳамма $m_i, m_j, m_k \in A$ лар учун) қонаотлантирувчи A панжара дистрибутив панжара деб аталади:

$$(m_i \cup m_j) \cap m_k = m_i \cap m_k \cup m_j \cap m_k, \\ m_k \cap (m_i \cup m_j) = m_k \cap m_i \cup m_k \cap m_j.$$

Панжаранинг дистрибутивлик критерийси. A панжара ҳар бир I интервалида исталған иккита боғланган элементтің бүлганды ва фақат шундагина дистрибутив панжара бўлади.

Дедекинд (модуляр) панжара деган тушунча киритамиз. A панжарада ҳамма $m_i, m_j, m_k \in A$ ва $m_j \leq m_k$ лар учун

$$(m_i \cup m_j) \cap m_k = m_i \cap m_k \cup m_j$$


муносабат бажарилганда ва фақат шундагина A дедекинд панжара бўлади.

Панжаранинг дедекиндлик критерийси. A панжара дедекинд панжара бўлиши учун A_m панжарага изоморф бўлган қисм панжара мавжуд бўлмаслиги етарли ва зарур (I.4- а шакл).

A_m панжара битта ноль баландликдаги элемент, иккита бир баландликдаги элемент, битта икки баландликдаги ва битта уч баландликдаги элементни ўз ичига олади.

Панжаранинг модулярлик критерийсидан фойдаланиб, дистрибутивлик критерийсини қулай ҳисоблаш шаклини мисол учун келтирамиз:

A панжара A_m га изоморф бўлган қисм панжарани ўз ичига олмаса (яъни дедекинд бўлса) ва A_g қисм панжарага изоморф бўлган қисм панжарани ўз ичига олмаса ва фақат шундагина дистрибутив бўлади (I.4- б шакл).



I.4- шакл.

A_g панжара битта ноль баландликдаги элементдан, бир баландликдаги учта элементдан ва икки баландликдаги битта элементдан иборат икки узунликдаги учта занжирдан тузилтган.

0 ва 1 структуралы A панжаранинг ҳар бир \bar{m} элементининг түлдирувчиси мавжуд бўлсин. У ҳолда бу панжарада $f_1(m) = \bar{m}$ унар операция берилган деса бўлади. Агар юқорида акс эттирилган хусусиятларга эга бўлган A панжарада

$$\overline{\overline{m}} = m, \quad (a)$$

$$\overline{m_i \cup m_j} = \overline{m_i} \cap \overline{m_j}, \quad (b)$$

$$m \cap \overline{m} = 0 \quad (v)$$

муносабатлар бажарилса, у ҳолда A панжара түлдирувчили (түлдирувчиси бор) панжара деб аталади.

(а) ва (б) га асосан \cup операцияни \cap операция билан ва \cap операцияни \cup операция билан ифодаланиши мумкин. Демак, түлдирувчили панжарани сигнатураси \cup бўлган алгебра сифатида аниқлаш мумкин. (а) ва (б) муносабатлардан куйидагилар келиб чиқади ($1 = \bar{0}$ десак):

$$0 \cap m = 0, \quad 0 \cup m = m,$$

$$1 \cap m = m, \quad 1 \cup m = 1,$$

$$m \cup \overline{m} = 1.$$

Демак, 1- панжаранинг энт катта элементи, яъни структураси 1 бўлади.

Тўлдирувчили дистрибутив панжара Буль алгебраси бўлади.

Теорема. *Буль алгебраси Кантор алгебрасига изоморфдир. Буль ва Кантор алгебралари орасида қўйидаги изоморфизм мавжуд:*

$$a \cup b, M_a \cup M_b, a \cap b, M_a \cap M_b, \bar{a}, \overline{M_a},$$

бу ерда ифодаларнинг чап тарафида – назарий-панжараавий ва ўнг тарафида – назарий тўплам операциялари.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. $y = 2x + 1$ түғри чизиқни $\{<x, y> \in R \times R / y = 2x + 1\}$ ва $y < x$ муносабатини $\{<x, y> \in R \times R / y < x\}$ шаклларда ёзиш мумкинлигини тушунтириңг.
2. $\{<2, 4>, <5, 6>, <7, 6>, <8, 8>\}$ тартиблантан жуфтликлар түплами бинар муносабати бўла оладими?
3. $\{<1, 2>, <2, 2>, <3, 4>\}$ функцияning аниқланиш ва қийматлар соҳаларини топинг.
4. $\{<3, 4>, <3, 5>, <4, 6>\}$ муносабат функция бўла оладими?
5. $\{<x, x^2 + x + 1> / x \in R\}$ функция бўлишини исботланг.
6. $\{<x, x> / x \in R\}$ функция бўла олмаслигини исботланг.
7. Буль алгебрасининг Кантор алгебрасига изоморф эканлигини исботланг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Муносабатлар тушунчаси нимани ифодалайди? Бинар муносабат деб нимага айтамиз?
2. Эквивалентлик муносабати. Қандай муносабатлар рефлексив, симметрик ва транзитив муносабатлар деб аталади?
3. Функция тушунчаси. Функциялар суперпозицияси деб нимани тушунасиз?
4. Тартиблаш муносабатини тушунтириңг.
5. Панжара ҳақида тушунчалар. Панжаранинг дистрибутивлик ва дедекиндлик критерийлари нималардан иборат?

1- §. Мулоҳаза. Мулоҳазалар устида амаллар

Мулоҳаза. Абсолют чин (ёлғон) мулоҳаза. Қийматлар сатри. Инкор, конъюнкция, дизъюнкция, эквиваленция ва импликация мантиқий амаллари. Шеффер амали.

Математик мантиқнинг ушбу мулоҳазалар алгебраси деб аталган бўлимида асосий текшириш объектлари бўлиб гаплар хизмат қиласиди. Математик мантиқ ҳар бир гапнинг маъносига қараб, унинг чин, ҳаққоний, тўғри ёки ёлғон, нотўғри бўлиши билангина қизиқади.

Масалан: 1) «Тошкент – Ўзбекистоннинг пойтахти», «Ой ер атрофида айланади» деган гаплар чиндир.

2) «Ер ойдан кичик», «3 > 5» деган гапларнинг ҳар бири ёлғондир.

Шуни ҳам айтиш керакки, кўпгина гапларнинг чин ёки ёлғонлигини дарҳол аниқлаш қийин. Масалан, «Бугунги тун кечагидан қоронфироқ», деган гап қайси вақтда ва қайси жойда айтилишига қараб чин ҳам, ёлғон ҳам бўлиши мумкин.

1) Олдимга кел. 2) Уйда бўлдингми? 3) Янги йил билан. 4) Агар олдин билсам эдим. Бу гаплар чин ёки ёлғон қиймат қабул қиласиди.

Шундай қилиб, математик мантиқ: «Ҳар бир гап чин ёки ёлғон бўлиш хоссасига эга» деб қабул қиласиди.

1-таъриф. *Фақат чин ёки ёлғон қиймат қабул қила оладиган дарак гап мулоҳаза деб аталади.*

Демак, ҳар бир мулоҳаза маълум ҳолатда чин ёки ёлғон қийматга эга. Бундан кейин, чин қийматни қисқача «ч» ҳарфи ва ёлғон қийматни «ё» ҳарфи билан белгилаймиз.

Мулоҳазаларни белгилаш учун, асосан, лотин алфавитининг кичик ҳарфлари ишлатилади:

a, b, c, ..., u, v, ..., x, y, z.

Маълум мулоҳазалар борки, улар ҳамма мумкин бўлган ҳолатларда (вазиятларда) чин (ёлғон) қийматни қабул қиласди. Бундай мулоҳазалар *абсолют чин* (ёлғон) мулоҳазалар деб аталади.

Мулоҳазалар алгебрасида, одатда, конкрет мулоҳазалар билангина эмас, балки ҳар қандай исталган мулоҳазалар билан ҳам шугулланилади. Бу эса ўзгарувчи мулоҳаза тушун-часига олиб келади. Агар ўзгарувчи мулоҳазани x деб белги-ласак, у ҳолда x конкрет мулоҳазаларнинг исталганини ифодалайди. Шунинг учун x икки: «ч» ва «ё» қийматли ўзгарувчини ифодалайди.

n та x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчи мулоҳаза берилган бўлсин. Буларнинг ҳар қайсиси чин ва ёлғон қийматларни қабул қиласди. Шунинг учун куйидаги қийматлар сатрини тузиш мумкин:

ё, ё, ..., ё,
 ч, ё, ..., ё,
 ё, ч, ..., ё,

 ч, ч, ..., ч.

Демак, ўзгарувчилар сони n та бўлса, у ҳолда $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$ та қийматлар сатрига эга бўламиз.

$x_1, x_2 : 2^2 = 4$ та қийматлар сатри.

$x_1, x_2, x_3 : 2^3 = 8$ та қийматлар сатри.

Математик мантиқда «эмас», «ёки», «ва», «агар ... бўлса, у ҳолда», «шунда ва факат шундагина ..., қачон ...» сўзлари (боғловчилар) мулоҳазалар орасидаги *мантиқий амаллар* дейилади. Бу амаллар ёрдамида элементар мулоҳазалардан мураккаб мулоҳаза тузилади. Мулоҳазалар устидаги бу амаллар математик мантиқнинг элементар қисми бўлган мулоҳазалар мантиқи ёки мулоҳазалар алгебраси деб аталувчи қис-

мида ўрганилади. Ҳар иккала атама («мулоҳазалар мантиқи» ва «мулоҳазалар алгебраси») синоним сифатида ишлатилади, чунки улар мантиқнинг маълум қисмини икки нуқтаи назардан ифодалайди: бу ҳам мантиқ (ўз предметига кўра), ҳам алгебра (ўз методига кўра).

Мантиқий амаллар асосан 5 та бўлиб, уларнинг таърифлари қўйидагичадир.

1. Инкор амали. Исталган x ўзгарувчи мулоҳаза билан бирга \bar{x} кўринишида белгиланган иккинчи ўзгарувчи мулоҳаза ҳам берилган бўлсин.

2-таъриф. x мулоҳазанинг инкори деб аталган \bar{x} мулоҳаза шу билан ҳарактерланадики, x мулоҳаза «ч» қийматни қабул қилганда, \bar{x} мулоҳаза «ё» қийматни қабул қиласди ва аксинча.

Демак, мулоҳазалар мантиқнинг энг содда амали бу инкор амали бўлиб, оддий тилдаги сифатдош «эмас» га тўғри келади. Бу амал «-» символи билан белгиланади. Агар x бирор мулоҳаза, масалан, «буғун ҳаво совуқ» бўлса, у ҳолда \bar{x} янги мураккаб «буғун ҳаво совуқ эмас» мулоҳазасидан иборатдир. \bar{x} мулоҳаза « x эмас» деб ўқилади. Шунинг учун, агар x чин мулоҳаза бўлса, у ҳолда \bar{x} ёлғон мулоҳаза бўлади ва, аксинча, x ёлғон бўлса \bar{x} чиндир.

Инкор амалининг таъсирини қўйидаги чинлик жадвали кўринишида тасвирлаймиз:

x	\bar{x}
ч	ё
ё	ч

Худди шу жадвални инкор амалининг таърифи сифатида қабул қиласмиз ва бошқа мантиқий амаллар учун ҳам шунга ўхшашиб жадваллардан фойдаланамиз. Улар чинлик жадвали дейилади. Бу жадваллардан фойдаланиш қулай бўлиб, улар математик мантиқнинг кўп бўлимларида ишлатилади.

2. Конъюнкция (мантиқий кўпайтма) амали. x ва y ўзгарувчи мулоҳазалар устида бажариладиган конъюнкция (лотинча *conjunction* – боғлайман сўзидан) амалини \wedge кўринишда ва бу амал натижасида ҳосил бўлган янги мураккаб мулоҳазани $x \wedge y$ кўринишда белгилаймиз.

3-таъриф. « Va » боғловчисига мос келувчи мантиқий амал **конъюнкция** амали деб аталади. x ва y мулоҳазаларнинг конъюнкцияси x ва y мулоҳазалар чин бўлгандагина чин қийматни қабул қилиб, қолгарда эса ёлғон қийматни қабул қиласди.

$x \wedge y$ кўринишдаги мулоҳаза « x ва y » деб ўқилади. Кўриниб турибдики, бу таъриф «ва» боғловчининг маъносига тўлиқ тўғри келади. Ҳақиқатан ҳам, «5 сони тоқ ва туб» мулоҳазаси чин, чунки уни ташкил этувчи ҳар иккала мулоҳаза: «5 сони тоқ» ва «5 сони туб» ҳам чин. «10 сони 5 га бўлинади ва $7 > 9$ » мулоҳазаси ёлғон, чунки мураккаб мулоҳазани ташкил этувчиларидан бири, чунончи « $7 > 9$ » ёлғондир. Конъюнкция таърифини қўйидаги чинлик жадвали кўринишида ёзиш мумкин:

x	y	$x \wedge y$
ч	ч	ч
ч	ё	ё
ё	ч	ё
ё	ё	ё

3. Дизъюнкция (мантиқий йигинди) амали. Мулоҳазалар мантиқида ишлатиладиган учинчи амал «ёки» боғловчисига тўғри қелади. Шуни таъкидлаш керакки, «ёки» боғловчиси ўзбек тилида икки хил маънода ишлатилади. Биринчи ҳолда рад этувчи «ёки», иккинчи ҳолда рад этмайдиган «ёки» маъносида ишлатилади. Бунинг фарқи қўйидагилардан иборат. Агар x ва y мулоҳазаларнинг иккаласи ҳам ёлғон бўлса, у ҳолда « x ёки y » мулоҳазаси шубҳасиз ёлғон бўлади.

Агар x чин ва у ёлғон (ёки x ёлғон ва у чин) бўлса, у ҳолда « x ёки y » ни чин деб қараш керак, бу эса ўзбек тилидаги «ёки» сўзининг маъносига тўғри келади. Аммо ҳар иккала x ва у мулоҳазалар чин бўлганда « x ёки y » мулоҳаза чин бўлади. Бу вақтда « x ёки y » мулоҳазага қандай қараш керак?

Масалан, «Бугун якшанба ёки мен кинога бораман» мулоҳазани олайлик. Агар бугун якшанба ва мен кинога борсам, у ҳолда бу мулоҳаза чин ёки ёлғонми? Ўзбек тилида «ёки» боғловчиси бир маънода, баъзан эса бошқа маънода ишлатилади. Агар юқоридаги мулоҳазани чин деб қарасак, у ҳолда «ёки» ни рад этмайдиган маънода, иккинчи ҳолда «ёки» ни рад этувчи маънода ишлатиляпти деймиз.

4-таъриф. Рад этмайдиган маънода ишлатиладиган «ёки» мантиқий амали **дизъюнкция** (лотинча *disjunctio* – фарқ қиласман сўзидан) дейилади. Иккита x ва у мулоҳазанинг дизъюнкцияси « $x \vee y$ » каби ёзилади ва « x ёки y » деб ўқилади.

Икки x ва у мулоҳазанинг дизъюнкцияси $x \vee y$ мураккаб мулоҳаза бўлиб, у фақат x ва у ёлғон бўлгандагина ёлғон қиймат қабул қилиб, қолган ҳолларда чин қийматни қабул қиласди.

Дизъюнкция амалини қўйидаги чинлик жадвали орқали ҳам ифодалаш мумкин:

x	y	$x \vee y$
ч	ч	ч
ч	ё	ч
ё	ч	ч
ё	ё	ё

4. Импликация амали. Қўйидаги мураккаб мулоҳазаларни кўрайлик:

1) «Агар $2 \cdot 5 = 10$ бўлса, у ҳолда $6 \cdot 7 = 42$ бўлади»; 2) «Агар 30 сони 5 га бўлинса, у ҳолда 5 жуфтдир»; 3) «Агар $3 = 5$ бўлса, у ҳолда $15 = 17$ »; 4) «Агар $4 \cdot 3 = 13$ бўлса, у ҳолда

$9 + 3 = 12$. Бу мулоҳазаларнинг ҳаммаси ҳам 2 та элементар мулоҳазадан «агар ... бўлса, у ҳолда ...» боғловчиси ёрдамида тузилган. Бу боғловчи мулоҳазалар мантиқининг импликация (лотинча *implicatio* – зич боғлайман сўзидан) амалига тўғри келади. Импликация амалини → кўринишида белтигайлиймиз.

5-тадариф. Икки x ва у мулоҳазанинг импликацияси деб шундай мулоҳазага айтиладики, у фактат x чин ва у ёлғон бўлгандагина ёлғон бўлиб, қолган ҳамма ҳолларда чиндир.

« $x \rightarrow y$ » мулоҳазаси «агар x бўлса, у ҳолда y » деб ўқилади. Импликация таърифини куйидаги чинлик жадвали кўринишида ёзиш мумкин:

x	y	$x \rightarrow y$
ч	ч	ч
ч	ё	ё
ё	ч	ч
ё	ё	ч

Чинлик жадвалидан кўринадики, юқоридаги мулоҳазаларнинг иккинчиси ёлғон бўлиб, қолганлари чиндир. « $x \rightarrow y$ » импликацияда x мулоҳаза *асос* (*шарт*, *гипотеза*, *далил*), у мулоҳаза эса бу асоснинг *оқибати* деб аталади. Импликация чинлик жадвалининг охирги иккита сатри шуни кўрсатадики, ёлғон асосдан чин хулоса ҳам, ёлғон хулоса ҳам келиб чиқар экан, бошқача қилиб айтганда «ёлғондан ҳар бир нарсани кутиш мумкин».

Импликация мулоҳазалар мантиқининг муҳим амалларидан бири ҳисобланади. Сўзлашув тилида «агар x бўлса, у ҳолда y » нинг ҳар хил синонимлари бор: « x бўлса, у бўлади», «агар x бўлса, у вақтда у бўлади», « x дан у ҳосил бўлади», « x дан у келиб чиқади», « y , агар x бўлса», « x у учун етарли шарт» ва ҳоказо.

5. Эквивалентлик (тeng күчлилік) амали. Күпчилик мұраккаб мулоҳазалар элементар мулоҳазалардан «зарур ва кифоя», «фақат ва фақат», «шунда ва фақат шундагина, қа-чонки», «... бажарилиши етарли ва зарурдир» каби бөгловчилари ёрдамида тузылады. Мулоҳазалар мантиқининг бундай бөгловчиларға мос келадиган амали эквивалентлик дейилади ва « \leftrightarrow » каби белгиланади. $x \leftrightarrow y$ мұраккаб мулоҳаза « x эквивалент y » деб үқилади.

6-таъриф. *Мұраккаб мулоҳаза $x \leftrightarrow y$ чин бўлади, агар x ва y лар чин ёки x ва y лар ёлғон бўлса, бошқа ҳолларда у ёлғондир. Бошқача қилиб айтганда, x ва y мулоҳазалар фақат ва фақат бир хил қиймат қабул қилгандагина $x \leftrightarrow y$ чин бўлади.*

Бу таърифни куйидаги чинлик жадвали билан ифодалаш мумкин:

x	y	$x \leftrightarrow y$
ч	ч	ч
ч	ё	ё
ё	ч	ё
ё	ё	ч

$x \leftrightarrow y$ эквивалентликка « x бўлса (бажарилса), y бўлади (бажарилади) ва y бўлса, x бўлади» ёки « x дан y келиб чиқади ва y дан x келиб чиқади» деган мулоҳаза мос келади, яъни $x \leftrightarrow y$ эквивалентликка математикада зарурий ва етарли шарт ҳақида айтилган теоремалар мос келади. Демак,

$$x \leftrightarrow y = (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) \quad (1)$$

бўлади. (1) га биноан, $x \leftrightarrow y$ эквивалентликни икки томонли импликация деб аташ мумкин.

6. Шеффер амали (штрихи). Ниҳоят, яна бир мантиқий амални келтирамиз. У *Шеффер амали* ёки *Шеффер штрихи* дейилади ва у «|» каби белгиланади. « $x|y$ » мұраккаб мулоҳаза « x Шеффер штрихи y » деб үқилади. Бу амал қуйидагича таърифланади.

7-таъриф. *Фақат x ва у мулоҳазалар чин бўлгандағина, $x|y$ мулоҳаза ёғондир.*

Бу таърифни қуйидаги чинлик жадвали ёрдамида ифодаласа ҳам бўлади:

x	y	$x y$
ё	ё	ч
ё	ч	ч
ч	ё	ч
ч	ч	ё

Асосий чинлик жадваллари. Юқорида келтирилган чинлик жадваллари, мос равишда, инкор қилиш, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентлик ва Шеффер амаларининг асосий чинлик жадваллари деб айтилади:

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \rightarrow y$	$x \leftrightarrow y$	$x y$
ч	ч	ч	ч	ч	ч	ё
ч	ё	ё	ч	ё	ё	ч
ё	ч	ё	ч	ч	ё	ч
ё	ё	ё	ё	ч	ч	ч

x	\bar{x}
ч	ё
ё	ч



Машқлар

1. Қуйидаги тапларнинг қайси бирлари мулоҳаза бўлади:
 - Тошкент – Ўзбекистон Республикасининг пойтахти;
 - $\sqrt{5} + 4\sqrt{3 - 30}$;

- 3) Ой – Марс планетасининг йўлдоши;
 4) $a > 0$.
2. Кўйидаги мулоҳазаларнинг чин ёки ёлғон эканлигини аниқланг:
 1) $2 \in \{x | 2x^3 - 3x^2 + 1 = 0, x \in R\}$; 2) $\{1\} \in N$.
3. Кўйидаги импликацияларнинг қайси бири чин бўлади:
 1) агар $2 \cdot 2 = 4$ бўлса, у ҳолда $2 < 3$;
 2) агар $2 \cdot 2 = 4$ бўлса, у ҳолда $2 > 3$.

2- §. Формулалар. Тенг кучли формулалар

Формула. Чинлик жадвали. Тенг кучли формулалар. Эквивалентлик билан тенг кучлилик орасидаги фарқ. Айният.

Олдинги параграфда асосан мантиқий амалларни кўриб чиқдик. Энди бу амаллар орасида боғланишлар мавжудлигини кўрсатамиз. Бунинг учун тенг кучли мулоҳазалар тушунчасини киритамиз. н та

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \quad (2)$$

мулоҳаза берилган бўлсин.

1- таъриф. (2) мулоҳазаларни инкор, дизъюнкция, конъюнкция, импликация ва эквиваленция мантиқий амаллари воситаси билан маълум тартибда бирлаштириб ҳосил қилинган мураккаб мулоҳаза формула деб аталади.

Масалан: $[x_1 \vee (x_2 \wedge x_3)] \rightarrow x_4$; $[x_1 \wedge (x_2 \rightarrow x_3)] \vee (x_4 \leftrightarrow x_5)$; $(x \leftrightarrow y) \wedge (x \vee y)$; $(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) \rightarrow (z \rightarrow x)$ мураккаб мулоҳазалар формулалар бўлади. Қавслар мулоҳазалар устида мантиқий амалларнинг қай тартибда бажарилишини кўрсатади.

Энди формула тушунчасига математик таъриф берайлик. Бу тушунча кўйидагича аниқланади.

2- таъриф. 1) ҳар қандай x_1, x_2, \dots, x_n мулоҳазаларнинг исталган бири формуладир;
 2) агар A ва B нинг ҳар бири формула бўлса, у ҳолда $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ ва \bar{A} ҳам формулатадир;

3) 1 ва 2- бандларда күрсатилган ифодалардан ташқари бошқа ҳеч қандай ифода формула бўла олмайди.

x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчилар элементар формулалар деб аталади.

Кейинчалик формулани лозим бўлгандагина $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция шаклида белгилашдан фойдаланамиз.

Ҳар қандай формула учун чинлик жадвали тузиш мумкин. Бунинг учун асосий чинлик жадвалларидан кетма-кет фойдаланиш керак. Масалан, $(x \wedge y) \rightarrow (\bar{x} \vee y)$ формуланинг чинлик жадвали қўйидагича бўлади:

x	y	\bar{x}	$x \wedge y$	$\bar{x} \vee y$	$\bar{x} \vee y$	$(x \wedge y) \rightarrow$ $\rightarrow (\bar{x} \vee y)$
ч	ч	ё	ч	ч	ё	ё
ч	ё	ё	ё	ё	ч	ч
ё	ч	ч	ё	ч	ё	ч
ё	ё	ч	ё	ч	ё	ч

Шундай қилиб, ҳар қандай формулага {ч, ё} тўпламнинг бир элементи мос қилиб қўйилади.

3-таъриф. A ва B формулалар берилган бўлсин. (1) элементар мулоҳазаларнинг ҳар бир қийматлари сатри учун A ва B формулаларнинг мос қийматлари бир хил бўлса, A ва B формулалар **тeng кучли формулалар** деб аталади ва бу $A = B$ тарзда белгиланади. (1) қаторнинг камида битта қийматлар сатри учун A ва B формулаларнинг мос қийматлари бир хил бўлмаса, у ҳолда A ва B формулалар **тeng кучлимас формулалар** деб аталади ва $A \neq B$ кўринишда белгиланади.

A ва B формулаларнинг тенг кучли бўлиш-бўлмаслиги улар учун тузилган чинлик жадваллари ёрдамида аниқланади.

Мисоллар. 1. $\bar{x} \vee y = A$ ва $B = x \rightarrow y$ формулалар берилган бўлсин.

x	y	\bar{x}	$\bar{x} \vee y$	$x \rightarrow y$
ч	ч	ё	ч	ч
ч	ё	ё	ё	ё
ё	ч	ч	ч	ч
ё	ё	ч	ч	ч

Жадвалдан күриниб турибдики, тўртала қийматлар сатри учун A ва B формулаларнинг мос қийматлари бир хил. Демак, таърифга асосан $A = B$.

2. $x \vee x = x$ тенглик исбот этилсин. $A = x \vee x$, $B = x$.

x	$x \vee x$
ч	ч
ё	ё

Демак, жадвалга асосан $A = B$.

3. $A = (x \vee \bar{x}) \wedge y$, $B = y$.

x	y	\bar{x}	$x \vee \bar{x}$	$(x \vee \bar{x}) \wedge y$
ч	ч	ё	ч	ч
ч	ё	ё	ч	ё
ё	ч	ч	ч	ч
ё	ё	ч	ч	ё

Демак, $(x \vee \bar{x}) \wedge y = y$.

Худди шу каби қуйидаги тенг күчлиликларни исботлаш мумкин.

$$4. x \vee \bar{x} = y \vee \bar{y}.$$

$$5. x \vee (x \wedge y) = x.$$

$$6. (x \vee \bar{x}) \rightarrow y = (x \wedge \bar{x}) \vee y.$$

$$7. x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z).$$

Эквивалентлик билан тенг күчлилик орасидаги фарқни тушуниш учун уларни алгебраик тенглама ва айният билан

солиширамиз. Тенглама (масалан, $2x + y = 10$) ҳарфларнинг айрим қийматлари (масалан, $x = 4, y = 2$) учун бажарилиб, бошқа қийматлар (масалан, $x = 1, y = 2$) учун бажарилмайди. Шунга ўхшаш, эквивалентлик $A \leftrightarrow B$ деб, шундай (масалан, $x_1 \leftrightarrow (x_2 \wedge x_3)$) мулоҳазага айтиладики, унга x_1, x_2, \dots, x_n ҳарфларининг ўрнига бир хил конкрет мулоҳазалар қўйилганда у чин қиймат қабул қилиб, бошқа конкрет қийматлар қўйилганда ёлғон қийматни қабул қиласи. *Айният* деб, шундай тенгликка (масалан, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$) айтиладики, у ўзида қатнашадиган барча ҳарфлар учун бажарилади. Шунга ўхшаш, $A \equiv B$ мулоҳазада қатнашадиган барча x_1, x_2, \dots, x_n ҳарфларининг ўрнига ихтиёрий конкрет мулоҳазалар қўйилганда у чин қиймат қабул қилса, бундай мулоҳаза *тенг кучлилик* дейилади.

Алгебрада айний ифодаларни бир-бири билан алмаштириш мумкин бўлганидек, мантиқ алгебрасида тенг кучли мулоҳазаларни (формулаларни) ҳам бир-бири билан алмаштириш мумкин. Бу эса мураккаб формулаларни (мулоҳазаларни) соддалаштириш имконини беради.

Биз тенглама ва айният билан эквивалентлик ва тенг кучлилик орасидаги ўхшашликни келтирдик. Энди эса улар орасидаги фарқни кўрсатамиз. Маълумки, алгебрада ҳеч қандай алмаштириш ёрдамида тенгликни амаллар (қўшиш, айриш, даражага кўтариш, бўлиш ва ҳоказо) билан алмаштириб бўлмайди. Мантиқ алгебрасида эса эквивалентликни импликация (\rightarrow) ёки конъюнкция (\wedge), дизъюнкция (\vee) ва инкор (\neg) амалари орқали ифодалаш мумкинлигини биз юқорида кўрсатган эдик (1- § даги (1) формулага қаранг). (1) формуланинг тўғрилигини чинлик жадвали орқали кўрсатамиз:

x	y	$x \rightarrow y$	$y \rightarrow x$	$x \leftrightarrow y$	$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)$
ч	ч	ч	ч	ч	ч
ё	ч	ч	ё	ё	ё
ч	ё	ё	ч	ё	ё
ё	ё	ч	ч	ч	ч

Жадвалдан кўринадики, охирги икки устуннинг чинлик қиймати устма-уст тушади. Шу билан (1) формула исботланди.

Оддий алгебрада тенглик белгиси « \equiv » куйидаги аксиомаларни қаноатлантиради: 1) ихтиёрий a сон учун $a = a$ (рефлексивлик); 2) агар $a = b$ бўлса, у ҳолда $b = a$ (симметриклик); 3) агар $a = b$, $b = c$ бўлса, у ҳолда $a = c$ (транзитивлик) бўлади.

Шунга ўхшаш, мuloҳазалар алгебрасида, эквивалентлик таърифидан осонлик билан кўриш мумкинки, у рефлексив, симметрик ва транзитив, яъни:

- 1) ихтиёрий x мuloҳаза учун $x \equiv x$;
- 2) ихтиёрий икки x ва y мuloҳазалар учун, агар $x \equiv y$ бўлса, у ҳолда $y \equiv x$;
- 3) ихтиёрий x , y , z учта мuloҳазалар учун $x \equiv y$ ва $y \equiv z$ бўлса, у ҳолда $x \equiv z$.



Машқлар

1. Куйидаги формулаларнинг чинлик жадвалларини тузинг:
 - 1) $(\bar{x} \vee z) \wedge (y \rightarrow (u \rightarrow x))$;
 - 2) $x_1 \rightarrow (x_2 \rightarrow (\dots \rightarrow x_n) \dots)$;
 - 3) $x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n \rightarrow y_1 \wedge y_2 \wedge \dots \wedge y_n$.
2. Тенг кучлиликларни исботланг:
 - 1) $x \leftrightarrow y \equiv \bar{x} \leftrightarrow \bar{y}$;
 - 2) $xy \vee \bar{x}y \vee \bar{x}\bar{y} \equiv x \rightarrow y$;
 - 3) $x \rightarrow \bar{y} \equiv y \rightarrow \bar{x}$;
 - 4) $x \rightarrow (y \rightarrow z) \equiv x \wedge y \rightarrow z$;
 - 5) $x \equiv (x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge \bar{z}) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge z) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z})$.
3. Формулаларни соддалаштиринг:
 - 1) $(x \rightarrow x) \rightarrow x$;
 - 2) $x \rightarrow (x \rightarrow y)$;
 - 3) $\overline{\bar{x} \cdot \bar{y}} \vee (x \rightarrow y) \cdot x$;
 - 4) $(x \leftrightarrow y) \wedge (x \vee y)$.

3- §. Айнан чин, айнан ёлғон ва бажарилувчи формулалар

- Айнан чин. Айнан ёлғон. Тавтология. Бажарилувчи формула. Мантиқ қонунлари. Ечилиш муаммоси.

1-тәріф. Элементар мулоҳазаларнинг ҳамма қийматлар сатрларыда фәкәт чин қийматни қабул қылувчи формула айнан чин (доимо чин) формула ёки **тавтология** деб аталади ва J билан белгиланади.

A формулалың тавтология эканлиги ёки эмаслиги қийматлар жадвалини тузиш орқали анықланади.

Мисоллар.

1. $J = x \wedge (x \rightarrow y) \rightarrow y$ формула тавтологиядир. Ҳақиқатан:

x	y	$x \rightarrow y$	$x \wedge (x \rightarrow y)$	$x \wedge (x \rightarrow y) \rightarrow y$
ч	ч	ч	ч	ч
ч	ё	ё	ё	ч
ё	ч	ч	ё	ч
ё	ё	ч	ё	ч

2. $J = (\bar{x} \vee y) \rightarrow (x \rightarrow y)$ формула ҳам тавтологиядир:

x	y	\bar{x}	$\bar{x} \vee y$	$x \rightarrow y$	$(\bar{x} \vee y) \rightarrow (x \rightarrow y)$
ч	ч	ё	ч	ч	ч
ч	ё	ё	ё	ё	ч
ё	ч	ч	ч	ч	ч
ё	ё	ч	ч	ч	ч

2-тәріф. Элементар мулоҳазаларнинг ҳамма қийматлар сатрларыда фәкәт ёлғон қийматни қабул қылувчи формуласалар айнан ёлғон (доимо ёлғон) ёки бажарылмайдын формуласалар дейилади ва \bar{J} билан белгиланади.

Масалан, $\bar{J} = (\bar{x} \vee y) \wedge (\overline{x \rightarrow y})$ айнан ёлғон формулады:

x	y	\bar{x}	$\bar{x} \vee y$	$x \rightarrow y$	$\bar{x} \rightarrow y$	$(\bar{x} \vee y) \wedge (\bar{x} \rightarrow y)$
ч	ч	ё	ч	ч	ё	ё
ч	ё	ё	ё	ё	ч	ё
ё	ч	ч	ч	ч	ё	ё
ё	ё	ч	ч	ч	ё	ё

Маълумки, айнан чин формуланинг инкори айнан ёлғон формула бўлади ва аксинча. Айнан чин ва айнан ёлғон формулалар унга кирадиган ўзгарувчиларга боғлиқ бўлмай, фақат битта қиймат қабул қиласди.

3- таъриф. *Агар $(A \leftrightarrow B)$ тавтология бўлса, у ҳолда A ва B мантиқий эквивалент деб аталади. Агар $(A \rightarrow B)$ тавтология бўлса, у ҳолда B формула A нинг мантиқий хуласаси деб аталади.*

Энди Э.Мендельсоннинг [39] китобида баён этилган тавтологияларга оид айрим теоремаларни келтирамиз.

1-теорема. *Агар A ва $A \rightarrow B$ айнан чин формулалар (тавтологиялар) бўлса, у ҳолда B формула ҳам тавтология бўлади.*

Исбот. A ва $A \rightarrow B$ тавтологиялар бўлсин. A ва B формулаларнинг таркибига кирувчи ўзгарувчиларнинг бирор қийматлар сатрида B формула ёлғон қиймат қабул қиссин. A формула тавтология бўлганлиги учун ўзгарувчиларнинг ўша қийматлар сатрида A чин қиймат қабул қиласди. У ҳолда $(A \rightarrow B)$ формула ёлғон қиймат қабул қиласди. Бу натижа $(A \rightarrow B)$ нинг тавтология деган фаразимизга қарама-қаршидир. Демак, B тавтологияядир.

2-теорема. *Агар x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларга боғлиқ бўлган A формула тавтология ва B формула A формуладан x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчилар ўрнига мос равишда A_1, A_2, \dots, A_n формулаларни қўйиш натижасида ҳосил қилинган бўлса, у ҳолда B формула тавтология бўлади, яъни тавтологияда ўрнига қўйиш яна тавтологияни келтириб чиқаради.*

Исбот. *A* тавтология бўлсин ва *B* формула таркибига кирувчи ўзгарувчи мұлоҳазаларнинг ихтиёрий қийматлар сатри берилған бўлсин. У ҳолда A_1, A_2, \dots, A_n формулалар y_1, y_2, \dots, y_n (хар бир x , ч ёки ё қиймат қабул қиласи) қийматлар қабул қиласи. Агар x_1, x_2, \dots, x_n га мөсравинцида y_1, y_2, \dots, y_n қийматларни берсақ, у ҳолда *A* нинг натижавий қиймати *B* нинг чинлик қийматига мөс келади. *A* тавтология бўлганлиги учун *B* формула таркибига кирган ўзгарувчиларнинг берилған ихтиёрий қийматлар сатрида ч қиймат қабул қиласи. Шундай қилиб, *B* доимо ч қиймат қабул қиласи ва у тавтология бўлади.

3-төрекема. Агар A_1 формула таркибига бир ёки кўп марта кирган *A* формула ўрнига *B* формулатини кўйини натижасида *B*, формула ҳосил қилинса, у ҳолда $((A \leftrightarrow B) \rightarrow (A_1 \leftrightarrow B_1))$ тавтология бўлади. Демак, *A* ва *B* лар мантикий эквивалент бўлеа, у ҳолда A_1 ва B_1 ҳам мантикий эквивалент бўлади.

Исбот. Агар *A* ва *B* формулатар ўзгарувчиларнинг ихтиёрий қийматлар сатрида қарама-қарши чинлик қийматларига эга бўлса, у ҳолда $(A \leftrightarrow B)$ нинг чинлик қиймати ё бўлади ва натижада $((A \leftrightarrow B) \rightarrow (A_1 \leftrightarrow B_1))$ формула ч қиймат қабул қиласи. Агар *A* ва *B* лар ўзгарувчиларнинг ихтиёрий қийматлар сатрида бир хил чинлик қиймати қабул қилса, у ҳолда A_1 ва B_1 формулатар ҳам бир хил чинлик қиймати қабул қиласи, чунки теореманинг шартига асосан B_1 формула A_1 формулатан *A* нинг ўрнига *B* ни кўйиш натижасида ҳосил қилинган. Демак, бу ҳолда $(A \leftrightarrow B)$ ҳам, $(A_1 \leftrightarrow B_1)$ ҳам ч қиймат қабул қиласи. Шунинг учун $((A \leftrightarrow B) \rightarrow (A_1 \leftrightarrow B_1))$ формула ҳам ч қиймат қабул қиласи. Демак, $((A \leftrightarrow B) \rightarrow (A_1 \leftrightarrow B_1))$ формула тавтология бўлади.

4-таъриф. Элементар мұлоҳазаларнинг камидан битта қийматлар сатрида чин қиймат қабул қилувчи ва айнан чин бўлмаган формула бажарилувчи формула деб аталади.

Масалан, $(\bar{x} \wedge \bar{y}) \leftrightarrow (\bar{x} \wedge y)$; $[(x \leftrightarrow y) \wedge (x \vee y)] \rightarrow \bar{z}$; $x \vee y$; $x \rightarrow y \leftrightarrow z$ формулатар бажарилувчи формулатар ҳисобланади.

Айнан чин формулалар катта ахамиятта зета бўлиб, улар мантиқ қонунларини ифодалайди. Шу мунёсабат билан кўйидаги масала туғилади: шундай методни топиш керакки, у чекли микдордаги амаллар ёрдамида мантиқ алгебрасининг ихтиёрий муайян формуласини айнан чин ёки айнан чин эмаслитини аникласин. Бундай метод *ечиувчи метод*, ёки алгоритм, ёки ечиувчи процедура дейилади. Кўйилган масала-нинг ўзи эса «*ечинин мумимоси*» дейилади. Бу мумимо факат мулоҳазалар алгебраси учунгина эмас, балки бошқа манти-қий системалар учун ҳам кўйилади. У мулоҳазалар алгебраси учун ижобий ҳал этилади. Бу ерда ечиувчи процедура сифа-тида чинлик жадвалини олишимиз мумкин, чунки бундай жадвал ҳар бир муайян формула учун кўйилган саволга жавоб беради. Агар берилган формулага мөс келадиган жадвалнинг охирги устуннада факат «чин» бўлса, у ҳолда бу формула айнан «чин», агар охирги устунда ҳеч бўлмагандан битта «ёлғон» бўлса, у ҳолда формула айнан чин эмас бўлади. Табиийки, амалда бу усуслини ҳар доим ҳам қўллаб бўлавермайди (чунки формулада и та ўзгарувчи қатнашса, бундай жадвал 2^n та сатрга зета бўлади). Лекин ҳар доим чекли микдордаги амаллар бажариб, принцип жихатдан кўйилган саволга жавоб бериш мумкин. Кейинги параграфларда бошқа бир ечиувчи процедуруни келтирамиз, у берилган формулани нормал шаклга келтиришга яосланган. Нормал шакллар математик мантиқнинг бошқа масалаларида ҳам ишлатилади.



Машқлар

1. Кўйидагиларниң қайси бирлари айнан чин ва айнан ёлғон формула эканлигини аниқланг:

- 1) $\overline{(x \vee y \rightarrow x \wedge y)}$;
- 2) $(x \rightarrow y) \rightarrow (\bar{y} \rightarrow \bar{x})$;
- 3) $\overline{p_1 \rightarrow (p_2 \rightarrow p_1)}$;
- 4) $\bar{p} \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2)$;
- 5) $((p \wedge q) \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$;
- 6) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$.

2. Айнан чин ёки айнан ёлғон формула эканлигини исботланг:

- 1) $(x \rightarrow y) \wedge (x \rightarrow \bar{y}) \rightarrow \bar{x}$;
- 2) $x \wedge (x \rightarrow y) \wedge (x \rightarrow \bar{y})$;

- 3) $x \vee \bar{x} \rightarrow y \wedge \bar{y}$;
- 4) $(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z))$;
- 5) $(z \rightarrow x) \rightarrow ((z \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow x \wedge y))$;
- 6) $(x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow z))$;
- 7) $(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (x \wedge y \rightarrow z)$;
- 8) $(x \wedge y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow (y \rightarrow z))$.

4- §. Асосий тенг күчлиликлар

Асосий тенг күчлиликлар. \vee , \wedge , \rightarrow амаллар қатнашган мулоҳазалар. Коммутативлик, ассоциативлик ва дистрибутивлик қонунлари. Идемпотентлик ва ютиш қонунлари.

Бу параграфда көнг құлланиладиган тенг күчлиликлар қаралади. Аввало, оддий алгебрада маълум бўлган айниятларга ўхшашибарини келтирамиз. Маълумки, қўшиш ва қўпайтириш амали қўйидаги қонуниятларга бўйсунади:

- 1) $x + y = y + x$ (қўшишнинг коммутативлик қонуни);
- 2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ (қўшишнинг ассоциативлик қонуни);
- 3) $xy = yx$ (қўпайтиришнинг коммутативлик қонуни);
- 4) $(xy)z = x(yz)$ (қўпайтиришнинг ассоциативлик қонуни);
- 5) $x(y + z) = xy + xz$ (қўпайтиришнинг йиғиндига нисбатан дистрибутивлик қонуни).

Мантиқ алгебрасида шу айниятларга ўхшашибар қўйидаги тенг күчлиликлар ўринлидир:

$$x \wedge y = y \wedge x, \quad (3)$$

$$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z), \quad (4)$$

$$x \vee y = y \vee x, \quad (5)$$

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z) \quad (6)$$

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z), \quad (7)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z). \quad (8)$$

Бу тенг күчлиликларни текшириш учун чинлик жадвалидан фойдаланса бўлади. Бу ерда биз (8) ни текширадиган жадвални келтириш билан кифояланамиз:

x	y	z	$y \wedge z$	$x \vee y$	$x \vee z$	$x \vee (y \wedge z)$	$(x \vee y)$	$x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
é	é	é	é	é	é	é	é	ч
é	é	ч	é	é	ч	é	é	ч
é	ч	é	é	ч	é	é	é	ч
é	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч
ч	é	é	é	ч	ч	ч	ч	ч
ч	é	ч	é	ч	ч	ч	ч	ч
ч	ч	é	é	ч	ч	ч	ч	ч
ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч

Дизъюнкция (\vee) амали коммутативлик ва ассоциативлик хоссаларига эгадир. (7)–(8) тенг кучлиликлар эса \wedge ва \vee амалларининг бир-бирига нисбатан дистрибутивлик хоссасига эга эканлигини кўрсатади. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, оддий алгебрада (8) тенг кучлиликка ўхшаш айният йўқ (чунки $x + yz = (x + y)(x + z)$ айният эмас). Юқоридаги ўхшашлик асосида $x \vee y$ ни мантиқий иғинди, $x \wedge y$ ни эса мантиқий кўпайтма деб олишимиз мумкин. Бу ўхшашикни кучайтириш учун, алгебраик кўпайтмада нуқта (\cdot) ёзилмаганидек (масалан, $x \cdot y = xy$), мантиқий кўпайтириш белгиси (\wedge) ни ёзмаймиз, яъни $x \wedge y$ нинг ўрнига xy ни ёзамиш. Бундан кейин мантиқий ифодаларни соддалаштириш, уларда қавсларни камайтириш мақсадида қуйидагича шартлашамиз:

1) бирор мантиқий ифода инкор ишораси остида бўлса, уни қавссиз ёзамиш, яъни $(x \vee y) \wedge z$ нинг ўрнига $x \vee y \wedge z$ ни ёки $x \vee yz$ ни ёзамиш;

2) конъюнкция белгиси дизъюнкция, импликация ва эквивалентлик белгиларига нисбатан мустаҳкамроқ боғлайди деб ҳисоблаймиз, яъни $(xy) \vee z$ ўрнига $xy \vee z$, $x \rightarrow (yz)$ ўрнига $x \rightarrow yz$, $(xy) \leftrightarrow (zu)$ ўрнига $xy \leftrightarrow zu$ ёзамиш;

3) дизъюнкция белгиси импликация ва эквивалентлик белгиларига нисбатан мустаҳкамроқ боғлайди деб ҳисоблаймиз, яъни $(x \vee y) \rightarrow z$ ўрнига $x \vee y \rightarrow z$ ва $(x \vee y) \leftrightarrow z$ ўрнига $x \vee y \leftrightarrow z$ ёзамиз;

4) импликация белгиси эквивалентлик белгисига нисбатан мустаҳкамроқ боғлайди деб ҳисоблаймиз, яъни $(x \rightarrow y) \leftrightarrow z$ ўрнига $x \rightarrow y \leftrightarrow z$ ёзамиз. Бу келишувлар мантиқий ифодаларни ёзишни соддалаштиради, масалан,

$$(((x \leftrightarrow y) \rightarrow (x \wedge z)) \leftrightarrow (((\overline{x \wedge y}) \vee (\bar{x} \wedge y)) \vee (x \rightarrow z)))$$

ўрнига

$$(x \leftrightarrow y) \rightarrow \bar{x}\bar{z} \leftrightarrow x\bar{y} \vee \bar{x}y \vee (x \rightarrow z)$$

ни ёзамиз.

Юқоридаги 1- §, (1) тенг кучлилик ёрдамида \leftrightarrow белгисини \rightarrow ва \wedge белгилари орқали ифодалашимиз мумкин. Энди $x \rightarrow y$ импликацияни кўрайлик. Фақатгина x чин ва у ёлғон бўлгандагина $\bar{x} \vee y$ мулоҳаза ёлғон, бундан эса фақатгина x чин (яъни \bar{x} ёлғон) ва у ёлғон бўлгандагина $\bar{x} \vee y$ мулоҳаза ёлғон бўлиши келиб чиқади. Шундай қилиб, яна бир тенг кучлиликка эга бўламиз:

$$x \rightarrow y \equiv \bar{x} \vee y. \quad (9)$$

Демак, \rightarrow , \leftrightarrow , \vee , \wedge , $-$ белгиларни ўз ичига олган ихтиёрий мураккаб мулоҳазани унга тенг кучли бўлган шундай мулоҳаза билан алмаштириш мумкинки, натижада фақат \vee , \wedge , $-$ белгилар қатнашган мулоҳазаларга эга бўламиз. Бундай алмаштириш мантиқ алгебрасининг электротехникадаги татбиқи учун катта аҳамиятга эга, чунки у ерда ишлатиладиган ифодаларда фақат учта \vee , \wedge , $-$ белги қатнашади. Энди \vee белгини \wedge ва $-$ белгилар орқали ифодалаймиз. Буни икки карра инкорни ўчириш қонуни деб аталувчи $\bar{\bar{x}} = x$ тенг кучлиликдан ва де Морган қонунлари деб аталувчи ҳамда чинлик жадвали ёрдамида осонгина текшириладиган

$$\bar{x} \vee y \equiv \bar{x} \wedge \bar{y}, \quad (10)$$

$$\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y} \quad (11)$$

тeng күчлиліктер ёрдамида бажарыш мүмкін.

Хақиқатан ҳам,

$$x \vee y = \overline{\overline{x \vee y}} = \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}} \quad (12)$$

ва шунга үхаш

$$x \wedge y = \overline{\bar{x} \vee \bar{y}} \quad (13)$$

еканлыги келиб чиқади.

Шундай қилиб, мантиқ алгебрасининг ихтиёрий ифодасини унга teng күчли бұлған шундай ифода билан алмаштириш мүмкінки, охирғи ифодада фақат \wedge ва - ёки \vee ва - белгилар қатнашади. Шунга үхаш, барча мантиқтің амалдарни \rightarrow ва - амаллари билан алмаштириш мүмкін.

Шуни ҳам айтиш керакки, барча амалларни фақаттана Шеффер штрихи билан алмаштириш ҳам мүмкін:

$$\bar{x} = x|x, \quad x \wedge y = (x|y)|(x|y), \quad \overline{x \wedge y} = x|y, \quad x \vee y = \bar{x}|\bar{y},$$

$$x \rightarrow y = x|\bar{y}.$$

Бу teng күчлиліктерни, Шеффер амали таърифидан фойдаланиб, чинлик жадвали ёрдамида осонгина күрсатыш мүмкін.

Энди мисол сифатида $(x \rightarrow y)(y \rightarrow x) \rightarrow (\bar{x} \leftrightarrow \bar{y})$ ифодани шундай алмаштирамизки, натижада фақат \wedge , \vee ва - белгилари қатнашсын. Бунинг учун аввало (9), (2) ва (3) teng күчлиліктерден фойдаланамыз:

$$(x \rightarrow y)(y \rightarrow x) \rightarrow (\bar{x} \leftrightarrow \bar{y}) = (x \rightarrow y) \cdot (y \rightarrow x) \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{y}) \cdot (\bar{y} \rightarrow \bar{x}) = \\ = (\bar{x} \vee y)(\bar{y} \vee x) \rightarrow (\bar{\bar{x}} \vee \bar{y})(\bar{y} \vee \bar{x}) = \overline{(x \vee y)(y \vee x)} \vee (\bar{x} \vee y) \cdot (\bar{y} \vee x).$$

Коммутативлик ва дистрибутивлик қонунларидан фойдаланыб, бу ифодани қуидидеги күринишида ёзишимиз мүмкін:
 $(x \rightarrow y) \cdot (y \rightarrow x) \rightarrow (\bar{x} \leftrightarrow \bar{y}) = (\bar{x} \cdot y \vee \bar{y} \cdot x \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \vee x \cdot y \vee x\bar{y} \vee \bar{x}y).$

Энди шундай савол туғилади: агар ҳамма мантиқтің амалдарни иккита ($-$, \wedge) ёки ҳатто битта $\bar{x} = x$ га келтирішніңг қожати борми? Сабаб шундаки, фақат иккита ёки битта белгі

орқали алмаштирганда мантиқий ифодалар жуда чўзилиб кетади ва уни кўздан кечириш қийинлашади.

Иккинчи томондан, мантиқий хулосаларнинг қонуниятларини баён этаётганда, юқорида киритилган \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow амаллари катта аҳамиятга эга. Бу хусусан \rightarrow амалига хосдир. Яна бир нечта муҳим тенг кучлиликларни келтирамиз:

$$x \cdot \bar{x} \equiv \text{ч} \quad (\text{қарама-қаршилик қонуни}), \quad (14)$$

$$x \vee \bar{x} \equiv \text{ё} \quad (\text{учинчиси истисно қонуни}), \quad (15)$$

$$x \cdot x \equiv x, x \vee x \equiv x \quad (\text{идемпотентлик қонуни}), \quad (16)$$

$$x \cdot (x \vee y) \equiv x, x \vee x \cdot y \equiv x \quad (\text{ютиш қонунлари}) \quad (17)$$

$$x \vee \bar{y} \equiv x, x \vee \text{ч} \equiv \text{ч}, x \cdot \text{ч} \equiv x, x \cdot \bar{y} \equiv \bar{y}. \quad (18)$$

Бу тенг кучлиликлар ихтиёрий мантиқий ифодаларни керакли кўринишга келтиришга имкон беради.



Mашқлар

1. Тенг кучлиикни исботланг: $\overline{x \rightarrow y} \equiv x \wedge \bar{y}$.
2. Формулани соддалаштиrint: $A \equiv (\overline{x \vee y} \rightarrow \bar{x} \vee y) \wedge y$.
3. Берилган формуланинг айнан чинлитини исботланг:
$$A \equiv x \rightarrow (y \rightarrow x).$$

5- §. Тенг кучли формулаларга доир теоремалар

Теоремалар. Зарурый ва етарли шартлар.

1-теорема. A ва B формулалар тенг кучли бўлиши учун \bar{A} ва \bar{B} формулалар тенг кучли бўлиши зарур ва етарли.

Исбот. $A = B$ бўлсин. У вақтда ҳамма ҳолатларда формулалар бир хил қийматга эга бўлади. У ҳолда \bar{A} ва \bar{B} формулалар ҳам чинлик жадвалининг ҳар бир сатрида бир хил қийматларга эга бўлади. Демак, $\bar{A} = \bar{B}$.

Худди шунга ўхшаш, $\bar{A} = \bar{B}$ дан $A = B$ келиб чиқади.

2-теорема. A ва B формуласин тенг кучли бўлиши учун $A \leftrightarrow B$ формула айнан чин (тавтология) бўлиши зарур ва етарли.

Исбот. 1. $A = B$ бўлсин. Бу ҳолда, эквивалентлик таърифига асосан, $A \leftrightarrow B$ нинг ҳамма сатрларидағи қийматлари «ч» дан иборат, демак, $A \leftrightarrow B$ тавтологияни ифодалайди.

2. $A \leftrightarrow B$ тавтология бўлсин. У ҳолда $A \leftrightarrow B$ ҳар бир сатрда «ч» қийматга эга бўлади. Бундан эса A ва B нинг ҳар бир сатрдаги қийматлари бир хил, яъни $A = B$ келиб чиқади.

Мисоллар. 1. $\overline{x \vee y} \leftrightarrow \bar{x} \wedge \bar{y}$ – айнан чин.

2. $\overline{x \wedge y} \leftrightarrow \bar{x} \vee \bar{y}$ – айнан чин.

3-теорема. $A \leftrightarrow B$ айнан чин бўлиши учун $\bar{A} \leftrightarrow \bar{B}$ айнан чин бўлиши зарур ва етарли.

Исбот. а) $A \leftrightarrow B$ формула айнан чин бўлсин. У вактда 2-теоремага асосан $\bar{A} = \bar{B}$. Демак, 2-теоремага асосан $\bar{A} \leftrightarrow \bar{B}$ формуланинг айнан чинлиги келиб чиқади.

б) $\bar{A} \leftrightarrow \bar{B}$ айнан чин бўлсин. Бундан $\bar{A} = \bar{B}$ келиб чиқади ва ўз навбатида $A = B$. Демак, $A \leftrightarrow B$ формула айнан чин бўлади.

4-теорема. P формуланинг исталган A қисми ўрнига шу A билан тенг кучли B формулани қўйишдан ҳосил бўлган янги Q формула P билан тенг кучлидир.

Мисол. $P = \overline{x \vee y} \rightarrow z$ берилган бўлсин. $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$ бўлгани учун $P = Q = \bar{x} \wedge \bar{y} \rightarrow z = \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}} \vee z = x \vee y \vee z$.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Куйидаги муроҷазаларнинг чин ёки ёлғон эканлигини аниқланг:

$$1) 2 \in \{x | 2x^3 - 3x^2 + 1 = 0, x \in R\}; \quad 2) \{1\} \in N.$$

2. Куйидаги импликацияларнинг қайси бири чин бўлади:

- 1) агар $2 \cdot 2 = 4$ бўлса, у ҳолда $2 < 3$;
- 2) агар $2 \cdot 2 = 4$ бўлса, у ҳолда $2 > 3$.

3. Қуидаги тенг күчлиликтарни исботланг:

- 1) $x \vee \bar{x} = y \vee \bar{y}$;
- 2) $x \vee (x \wedge y) = x$;
- 3) $(x \vee \bar{x}) \rightarrow y = (x \wedge \bar{x}) \vee y$;
- 4) $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$.

4. Қуидаги формулаларнинг чинлик жадваллари тузилсин:

- 1) $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2$;
- 2) $(x \vee y) \rightarrow (x \wedge \bar{y} \vee \bar{x} \rightarrow \bar{y})$;
- 3) $(x_1 \wedge x_2) \vee x_3$;
- 4) $x \wedge \bar{y} \rightarrow (y \vee \bar{x} \rightarrow \bar{z})$;
- 5) $(x_1 \rightarrow \bar{x}_2) \rightarrow (\overline{x_1 \vee x_2} \wedge \bar{x}_3)$.

5. Тенг күчлиликтарни исбот қилинг:

- 1) $(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y}) \equiv x$;
- 2) $x \vee (\bar{x} \wedge y) \equiv x \vee y$;
- 3) $(x \vee y) \wedge (z \vee t) \equiv xz \vee yz \vee xt \vee yt$;
- 4) $xy \vee zt \equiv (x \vee z)(y \vee z)(x \vee t)(y \vee t)$;
- 5) $x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n \rightarrow y \equiv x_1 \rightarrow (x_2 \rightarrow (\dots \rightarrow (x_n \rightarrow y) \dots))$.

6. Қуидаги формулаларни соддалаштириңг:

- 1) $(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) \rightarrow (z \rightarrow x)$;
- 2) $(x \vee \bar{y} \rightarrow (z \rightarrow y \vee \bar{y} \vee x)) \wedge (x \vee \overline{x \rightarrow (x \rightarrow x)}) \rightarrow y$;
- 3) $(x \wedge x \wedge \bar{x} \rightarrow y \wedge \bar{y} \rightarrow z) \vee x \vee (y \wedge z) \vee (y \wedge z)$;
- 4) $(x \wedge (y \vee z \rightarrow y \vee z)) \vee (y \wedge x \wedge \bar{y}) \vee x \vee (y \wedge \bar{x} \wedge \bar{x})$.

7. Қуидагиларнинг қайси бирлари айнан чин ва айнан ёлғон формула эканлигини аниқланг:

- 1) $\overline{(x \rightarrow z)} \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z))$;
- 2) $(p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow ((p_1 \vee p) \rightarrow (p_2 \vee p))$;
- 3) $(p_1 \rightarrow (p_2 \rightarrow p_3)) \rightarrow ((p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow (p_1 \rightarrow p_3))$;
- 4) $\overline{(p_1 \rightarrow p_2)} \rightarrow ((p_1 \wedge p) \rightarrow (p_2 \wedge p))$.

8. Айнан чин ёки айнан ёлғон формула эканлигини исботланг:

- 1) $x \wedge y \rightarrow x$;
- 2) $x \rightarrow (x \vee y)$;
- 3) $(x \rightarrow y) \rightarrow (\bar{y} \rightarrow \bar{x})$;
- 4) $(\bar{y} \rightarrow \bar{x}) \rightarrow (x \rightarrow y)$.

9. F – айнан ёлғон формула бўлсин. $x \wedge \bar{y} \rightarrow F \equiv x \rightarrow y$ эканлигини исбот қилинг.

10. Ҳамма асосий мантиқий амалларни:

- 1) дизъюнкция, конъюнкция ва инкор;
- 2) конъюнкция ва инкор;
- 3) дизъюнкция ва инкор;
- 4) импликация ва инкор амаллари орқали ифодаланг.

11. Айнан чин ёки айнан ёлғон формула эканлигини исботланг:

- 1) $(x_1 \wedge \dots \wedge x_n) \wedge (x_1 \vee \dots \vee x_n \rightarrow \bar{y}) \wedge y$;
- 2) $x_1 \rightarrow (x_2 \rightarrow \dots \rightarrow (x_{n-1} \rightarrow (x_n \rightarrow y \vee \bar{y})) \dots)$;
- 3) $\overline{x \wedge \bar{x} \rightarrow y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \dots \rightarrow y_{n-1} \rightarrow y_n} \rightarrow (z \wedge \bar{z})$.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Мулоҳаза. Мулоҳазалар устида қандай мантиқий амаллар бажарилади?
2. Формулалар. Тенг кучли формулаларни келтириңг.
3. Айнан чин, айнан ёлғон ва бажарилувчи формулаларнинг таърифларини келтириңг.
4. Асосий тенг кучлиликларни исботланг.
5. Тенг кучли формулаларга доир теоремаларни исботланг.

6- §. Формулаларнинг нормал шакллари

- Элементар конъюнкция (дизъюнкция). КНШ. ДНШ. Теоремалар. Формуланинг доимо чин бўлишининг етарли ва зарурый шарти.

Тенг кучли алмаштиришлар бажариб, мулоҳазалар алгебрасининг формулаларини ҳар хил кўринишларда ёзиш мумкин. Масалан, $\tilde{A} \rightarrow BC$ формулани $A \vee BC$ ёки $(A \vee B)(A \vee C)$, кўринишларда ёза оламиз.

Мантиқ алгебрасининг контакт ва реле-контактли схемалар, дискрет техникадаги татбиқларида ва математик мантиқнинг бошқа масалаларида формулаларнинг нормал шакллари катта аҳамиятга эга. Куйидаги белгилашни киритамиз:

$$x^\sigma = \begin{cases} x, & \text{агар } \sigma = \text{ч бўлса,} \\ \bar{x}, & \text{агар } \sigma = \text{ё бўлса.} \end{cases}$$

$\sigma^\sigma = \text{ч эканлиги аниқ.}$

1- таъриф. Ушбу

$$x_1^{\sigma_1} \cdot x_2^{\sigma_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} \quad (1)$$

кўринишдаги формула элементар конъюнкция деб аталади, бу ерда $\sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ ихтиёрий қийматлар сатри ва x_i ўзгарувчилар орасида бир хиллари бўлиши мумкин.

2- таъриф. Ушбу

$$x_1^{\sigma_1} \vee x_2^{\sigma_2} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n} \quad (1)$$

кўринишдаги формула элементар дизъюнкция деб аталади, бу ерда ҳам $\sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ ихтиёрий қийматлар сатри ва x_i ўзгарувчилар орасида бир хиллари бўлиши мумкин.

3- таъриф. Элементар дизъюнкцияларнинг конъюнкцияси формуланинг конъюнктив нормал шакли (**КНШ**) ва элементар конъюнкцияларнинг дизъюнкцияси формуланинг дизъюнктив нормал шакли (**ДНШ**) деб аталади.

КНШ га $(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee z) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z)$ формула ва ДНШ га $xy \vee \bar{x}z \vee x\bar{y}z$ формула мисол бўла олади.

1- теорема. Элементар мулоҳазаларнинг ҳар бир P формуласига тенг кучли конъюнктив нормал шаклдаги Q формула мавжуд.

Бу теоремани исботлашда ушбу тенг кучлиликлардан фойдаланамиш:

- | | |
|--|---|
| 1) $\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B};$ | 2) $\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B};$ |
| 3) $A \rightarrow B = \overline{A} \vee B;$ | 4) $\overline{A \rightarrow B} = A \wedge \overline{B};$ |
| 5) $A \leftrightarrow B = (\overline{A} \vee B) \wedge (A \vee \overline{B});$ | 6) $\overline{A \leftrightarrow B} = (A \wedge \overline{B}) \vee (\overline{A} \wedge B).$ |
- (3)

Исбот. P формула нормал конъюнктив шаклда бўлмаса, қўйидаги ҳоллар бўлиши мумкин:

а) P даги элементар муроҳазалар \wedge ва \vee амаллари билан-тина бирлаштирилган бўлса ҳам, лекин \wedge сўнгги амални ифодаламайди. Бу ҳолда $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ дистрибутивлик қонунидан фойдаланиб, сўнгги амали \wedge дан иборат тенг кучли формулага келтирамиз;

б) P формула $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$ мантиқий амаллар воситасида тузилган бирор формулани ифодаласин. У ҳолда P га (3) тенг кучлиликларни татбиқ этиб, P билан тенг кучли ва \neg, \vee, \wedge билан ифодаланган P^1 формулани ҳосил қиласиз. Агар P^1 КНШ кўринишида бўлмаса, унга $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ дистрибутивлик қонунини татбиқ этиб, чекли қадамлардан кейин P билан тенг кучли Q конъюнктив нормал шаклдаги формулага келамиз.

Изоҳ. P формулани конъюнктив нормал шаклга келтириш жараёнида

$$A \wedge A = A, \quad A \vee A = A, \quad A \wedge J = A, \quad A \wedge J = J,$$

$$A \wedge \bar{J} = \bar{J}, \quad A \vee \bar{J} = A, \quad A \vee \bar{A} = J \quad (4)$$

тенг кучлиликлардан фойдаланиб, уни соддалаштириш мумкин.

Мисоллар. 1. $P = [(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})] \vee [x \wedge (\bar{x} \vee y)]$.

$$\begin{aligned} P &= \{(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})\} \vee x \wedge \{(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})\} \vee (\bar{x} \vee y) = \\ &= [(x \vee y) \vee x] \wedge [(\bar{x} \vee \bar{y}) \vee x] \wedge [(x \vee y) \vee (\bar{x} \vee y)] \wedge [(\bar{x} \vee \bar{y}) \vee (\bar{x} \vee y)] = \\ &= (x \vee y) \wedge [J \vee \bar{y}] \wedge (J \vee y) \wedge (\bar{x} \vee J) = (x \vee y) \wedge J \wedge J \wedge J = x \vee y; \\ P &= x \vee y. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, P формуланинг КНШ биттагина дизъюнктив $(x \vee y)$ ҳаддан иборат экан.

$$2. P = \overline{x \vee y} \leftrightarrow x \wedge y.$$

$$\begin{aligned} P &= \bar{x} \wedge \bar{y} \leftrightarrow x \wedge y = \overline{\bar{x} \vee \bar{y}} \leftrightarrow (x \wedge y) = \\ &= \left[\overline{\bar{x} \vee \bar{y}} \vee (x \wedge y) \right] \wedge \left[(\bar{x} \vee \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}) \right] = \\ &= [(x \vee y) \vee (x \wedge y)] \wedge [(\bar{x} \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \vee \bar{y})] = \\ &= [(x \vee y \vee x) \wedge (x \vee y \vee y)] \wedge [(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{x}) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{y})] = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (x \vee y) \wedge (x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y}) = (x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y}); \\
 P &= (x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y}).
 \end{aligned}$$

P формула тавтология эканлигини чинлик жадвалига мурожаат қилмай туриб ҳам аниқлаш мумкинми деган саволга қуидаги чинлик аломати деб аталган теорема ижобий жавоб беради.

2-теорема. *P* формула доимо чин бўлиши учун унинг КНШ даги ҳар бир элементар дизъюнктив ҳадида камида битта элементар мулоҳаза билан бирга бу мулоҳазанинг инкори ҳам мавжуд бўлиши зарур ва етарли.

Исбот: а) *P* формуланинг

$$P = A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \quad (5)$$

КНШ даги ҳар бир A_i ҳадида камида битта элементар мулоҳаза билан бирга бу мулоҳазанинг инкори ҳам мавжуд бўлсин, яъни $A_i = x \vee \bar{x} \vee y \vee \dots \vee u$ шаклида бўлсин, у ҳолда $x \vee \bar{x} = J$ ва $J \vee A = J$ ларга асосан $A_i = J \vee (y \vee \dots \vee u \vee V) = J$ бўлади. Демак, $P = J \wedge J \wedge \dots \wedge J = J$ бўлади, яъни айнан чин формула бўлади.

б) Энди *P* тавтология бўлсин ва A_i унинг КНШ даги шундай элементар дизъюнктив ҳади бўлсинки, унда бирорта элементар мулоҳаза билан бирга унинг инкори қатнашмаган бўлсин. Масалан, $A_i = x \vee \bar{y} \vee \dots \vee u$ шаклида бўлсин. Энди, элементар мулоҳазаларнинг шундай қийматлар сатрини олайликки, бу сатрда x нинг қиймати ё, у нинг қиймати ч, z нинг қиймати ё, ..., u нинг қиймати ё бўлсин. У вақтда

$$A_i = x \vee \bar{y} \vee \dots \vee u = \ddot{e} \vee \dot{c} \vee \dots \vee \ddot{e} = \ddot{e} \vee \dots \vee \ddot{e} = \ddot{e}.$$

Демак, $P = A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ нинг қиймати ҳам ёлғон бўлади. Аммо, теореманинг шартига асосан *P* нинг қиймати айнан чинdir. Натижада қарама-қаршиликка келдик. Демак, элементар дизъюнкцияларнинг ҳар бир ҳадида бирорта мулоҳаза ўзи ва узининг инкори билан қатнашиши шарт.

Мисол. 1. $P = x \wedge \bar{x} \rightarrow \overline{y \wedge \bar{y}} = \overline{x \wedge \bar{x}} \vee \overline{y \wedge \bar{y}} = \bar{x} \vee x \vee \bar{y} \vee y$.

$P = \bar{x} \vee x \vee \bar{y} \vee y$ – айнан чиндир.

2. $\overline{x \wedge \bar{x}} \wedge (\bar{y} \wedge \bar{y} \rightarrow z) = (\bar{x} \vee x) \wedge (\bar{y} \vee y) \vee z = P(\bar{x} \vee x) \wedge (\bar{y} \vee y \vee z)$ – айнан чин формуладир.

7- §. Дизъюнктив нормал шакл

ДНШ. Формуланинг доимо ёлғон бұлишининг етарлы ва зарурий шарти. Мисоллар.

Эслатиб ўтамизки, элементар конъюнкцияларниң дизъюнкцияси формуланинг дизъюнктив нормал шакли (**ДНШ**) деб аталади.

1-теорема. Элементар мұлоқазаларниң исталған P формуласини **ДНШ**га келтиріши мүмкін.

Исбот. Бунинг учун \overline{P} формуланы КНШ га келтирамиз:

$$\overline{P} = A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_m,$$

сүнгра \overline{P} нинг инкорини топғанимизда формула **ДНШ** күринишига келади:

$$\overline{\overline{P}} = P = \overline{\overline{A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_m}} = \overline{\overline{A_1}} \vee \overline{\overline{A_2}} \vee \dots \vee \overline{\overline{A_m}}.$$

Энди ёлғонлик аломати деб аталған теоремани исботлаймиз.

2-теорема. P формула айнан ёлғон бұлиши учун, унинг дизъюнктив нормал шаклидаги ҳар бир элементар конъюнкция ифодасида камида битта элементар мұлоқаза билан бирга бу мұлоқазаның инкори ҳам мавжуд бўлиши зарур ва етарли.

Исбот. а) P – айнан ёлғон бўлса, у ҳолда \overline{P} – айнан чин бўлади. Демак, \overline{P} нинг КНШ даги ҳар бир элементар дизъюнкция ифодасида камида битта элементар мұлоқаза билан бирга унинг инкори ҳам мавжуд бўлади. Шунинг учун $\overline{\overline{P}} = P$ нинг **ДНШ** даги ҳар бир конъюнктив ҳадида камида битта элементар мұлоқаза ва унинг инкори мавжуд бўлади;

б) энди ҳар бир элементар конъюнкция ифодасида камиди битта элементар мулоҳаза ва унинг инкори мавжуд бўлсин, яъни $A_i = x_i \wedge \bar{x}_i \wedge y_i \wedge \dots \wedge z_i$ бўлсин, у ҳолда $A_i = 0$ ва $P = 0 \vee 0 \vee \dots \vee 0 = 0$.

Демак, P айнан ёлғон формуладир.

$$\text{Мисол. } P = \overline{(\bar{x} \wedge x)} \rightarrow \overline{\bar{y} \wedge y} = (\overline{\bar{x} \wedge x}) \vee \overline{\bar{y} \wedge y} = \\ = (\bar{x} \vee \bar{x}) \vee \bar{y} \vee \bar{y} = (x \vee \bar{x}) \vee (y \vee \bar{y});$$

$$\bar{P} = (x \vee \bar{x}) \vee (y \vee \bar{y}) - \text{айнан чин;}$$

$$P = (\bar{x} \wedge x) \wedge (\bar{y} \wedge y) - \text{айнан ёлғон.}$$

З-т орима. Элементар мулоҳазаларнинг ҳар бир P формуласи учун ечилиши муаммоси ечиладигандир.

Исбот. 1) P ни КНШ га келтиргандан кейин, айнан чин бўлиш-бўлмаслиги дарҳол аниқланади;

2) P айнан чин бўлмаса, уни ДНШ га келтириб, айнан ёлғон бўлиш-бўлмаслигини аниқлаймиз;

3) P доимо чин ва доимо ёлғон бўлиш шартларини қаноатлантирумаса, у ҳолда бу формула бажарилувчи бўлади.

Демак, элементар мулоҳазалар формуласининг айнан чин, айнан ёлғон ёки бажарилувчи формула бўлишини чекли қадамлар жараёнида аниқлаш мумкин. Шунинг учун ечилиши муаммоси доимо ижобий ҳал бўлади.

8- §. Мукаммал конъюнктив ва дизъюнктив нормал шакллар

МКНШ. МДНШ. Тўлиқ ва тўғри элементар конъюнкциялар (дизъюнкциялар). Формулани МКНШ (МДНШ)га келтириш алгоритми.

Мантиқ алгебрасининг битта формуласи учун бир нечта ДНШ (КНШ) мажбур бўлиши мумкин. Масалан, $(x \vee y)(x \vee z)$ формуласи қўйидаги $x \vee y$, $x \vee z$ ДНШ ларга келтириш мумкин. Булар дистрибутивлик ва идемпотентлик қонунларини қўллаш натижасида ҳосил қилинган.

Формулаларни бир қийматли равища нормал шақлда іске үрлаш учун мұкаммал дизъюнктив нормал шақл ва мұкаммал конъюнктив нормал шақл (МДНШ ва МКНШ) көб атап көзіндеңдік атап аталауда.

n та x_1, x_2, \dots, x_n элементар мұлоҳазаныңг

$$x_1^{\sigma_1} \vee x_2^{\sigma_2} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n} \quad (1)$$

элементар дизъюнкциялари ва

$$x_1^{\sigma_1} \wedge x_2^{\sigma_2} \wedge \dots \wedge x_n^{\sigma_n} \quad (2)$$

элементар конъюнкциялари берилған бўлсин.

1-таъриф. (1) элементар дизъюнкция ((2) элементар конъюнкция) ифодасида ҳар бир элементар мұлоҳаза x_i бир марта қатнашган бўлса, у **тўғри элементар дизъюнкция** (**тўғри элементар конъюнкция**) деб аталади.

Масалан, $x_1 \vee x_2 \vee x_3$ ва $\bar{x}_1 \vee x_4 \vee x_6$ элементар дизъюнкциялар ва $x_1 x_2 x_3$ ва $x_1 \bar{x}_3 x_6$ элементар конъюнкциялар мос равища тўғри элементар дизъюнкциялар ва элементар конъюнкциялар бўлади.

2-таъриф. (1) элементар дизъюнкция ((2) элементар конъюнкция) нинг ифодасида x_1, x_2, \dots, x_n мұлоҳазаларнинг ҳар биттаси бир мартагина қатнашган бўлса, у x_1, x_2, \dots, x_n мұлоҳазаларга нисбатан **тўлиқ элементар дизъюнкция** (**тўлиқ элементар конъюнкция**) деб аталади.

Масалан, $x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$ ва $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$ элементар дизъюнкциялар ва $\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3, x_1 x_2 \bar{x}_3$ элементар конъюнкциялар x_1, x_2, x_3 мұлоҳазаларга нисбатан тўлиқ элементар дизъюнкциялар ва тўлиқ элементар конъюнкциялар бўлади.

3-таъриф. Агар ДНШ (КНШ) ифодасида бир хил элементар конъюнкциялар (элементар дизъюнкциялар) бўлмаса ва ҳамма элементар конъюнкциялар (элементар дизъюнкциялар) тўғри ва тўлиқ бўлса, у **мұкаммал дизъюнктив нормал шақл** (**мұкаммал конъюнктив нормал шақл**) **МДНШ** (**МКНШ**) деб аталади.

Масалан, $xyz \vee xy\bar{z} \vee \bar{x}yz \vee x\bar{y}z$ ДНШ x, y, z муроҳазаларга нисбатан МДНШ бўлади. $(x \vee y)(x \vee \bar{y})(\bar{x} \vee y)$ КНШ муроҳазаларга нисбатан МКНШ бўлади.

Асосий мантиқий амалларнинг МДНШ ва МКНШ кўринишлари қўйидагича бўлади:

а) МДНШ: $\bar{x} = \bar{\bar{x}}$; $xy = xy$; $x \vee y = xy \vee \bar{x}y \vee x\bar{y}$;
 $x \rightarrow y = xy \vee \bar{x}y \vee \bar{x}\bar{y}$; $x \rightarrow y = xy \vee \bar{x}\bar{y}$;

б) МКНШ: $\bar{x} = \bar{\bar{x}}$; $xy = (\bar{x} \vee y)(x \vee \bar{y})(x \vee y)$; $x \vee y = x \vee y$;
 $x \rightarrow y = \bar{x} \vee y$; $x \rightarrow y = (\bar{x} \vee y)(x \vee \bar{y})$.

I-төрим. *и та элементар муроҳазанинг айнан чин формуласидан фарқли ҳар бир A формулани мукаммал конъюнктив нормал шаклга (МКНШ) келтириш мумкин.*

Исбот. Қўйидаги исбот тавтологиядан фарқ қилувчи ҳар қандай A формулани МКНШ га келтириш алгоритми бўлади.

1. Аввало A формулани конъюнктив нормал шаклга келтирамиз. Бунинг учун A формулани конъюнкция, дизъюнкция ва инкор мантиқий амаллари орқали ифодалаймиз (инкор амали фақатгина ўзгарувчилар устида бўлиши керак). Сўнгра дистрибутивлик қонунларидан фойдаланиб, A формулани КНШ га келтирамиз ва ҳамма лозим бўлган соддлаштиришларни бажарамиз.

2. Агар КНШ ифодасида бир нечта бир хил элементар дизъюнкциялар мавжуд бўлса, у ҳолда $x \wedge x = x$ тенг кучлилик формуласидан фойдаланиб, улардан биттасини A ифодасида қолдирамиз.

3. Қўйидаги икки усул орқали ҳамма элементар дизъюнкцияларни тўғри элементар дизъюнкцияларга айлантирамиз:

а) агар бирор элементар дизъюнкция ифодасида бирорта ўзгарувчи ўзининг инкори билан қатнашган бўлса, у ҳолда $x \vee \bar{x} = 1$, $x \vee x = x$ тенг кучлилик формулаларга асосан биз бу элементар конъюнкцияни КНШ ифодасидан олиб ташлаймиз;

6) агар бирор ўзгарувчи элементар дизъюнкция ифодасида бир неча марта қатнашган бўлса (ёки ҳамма ҳолда инкорниораси остида эмас, ёки ҳамма ҳолда инкор ишораси остида), у ҳолда $x \vee x$ формуласига асосан биз улардан фақаттинга биттасини КНШ ифодасида қолдирамиз.

Натижада, ҳамма элементар дизъюнкциялар тўғри элементар дизъюнкцияларга айланади.

4. Агар баъзи элементар дизъюнкциялар тўлиқ элементар цитъюнкциялар бўлмаса, яъни дизъюнктив ҳадларда элементар мулоҳазаларнинг баъзилари (ёки уларнинг инкорлари) мавжуд бўлмаса, у ҳолда бундай элементар дизъюнкцияларни тўлиқ элементар дизъюнкциялар ҳолатига келтириши керак.

Масалан, ушбу

$$x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \dots \vee x_{i-1} \vee x_{i+1} \vee \dots \vee x_n$$

элементар дизъюнкция ифодасида x_i ёки \bar{x}_i йўқ деб фараз қиласлик. У ҳолда уни $x_i \wedge \bar{x}_i = 0$ ва $D \vee 0 = D$ формулалардан фойдаланиб қуидаги икки тўлиқ элементар дизъюнкция конъюнкциясига келтира оламиз:

$$\begin{aligned} & (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \dots \vee x_{i-1} \vee \bar{x}_{i+1} \vee \dots \vee x_n) \vee (x_i \wedge \bar{x}_i) = \\ & = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \dots \vee x_{i-1} \vee x_i \vee \bar{x}_{i+1} \vee \dots \vee x_n) \wedge \\ & \quad \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \dots \vee x_{i-1} \vee \bar{x}_i \vee x_{i+1} \vee \dots \vee x_n). \end{aligned}$$

Агарда элементар дизъюнкция ифодасида бир нечта y_1, y_2, \dots, y_n ўзгарувчилар қатнашмаётган бўлса, у ҳолда унинг ифодасига $(y_i \wedge \bar{y}_i)$ ($i = 1, m$) конъюнкцияларни мантиқий қўшиб, дистрибутивлик қонунини қўллаймиз. Натижада, битта тўлиқ эмас элементар дизъюнкция ўрнига $2m$ та тўлиқ элементар дизъюнкцияга эга бўламиз.

5. Тўртинчи қадам бажарилиши натижасида КНШ ифодасида бир хил элементар дизъюнкциялар пайдо бўлади. Шунинг учун яна 2- қадамни ишлатамиз.

Демак, 1–5- қадамлар натижасида КНШ ифодасида бир хил элементар дизъюнкциялар мавжуд бўлмайди ва ҳамма элементар дизъюнкциялар тўғри ва тўлиқ бўлади. Таърифга асосан, бундай КНШ мукаммал конъюнктив нормал шакл бўлади.

Мисоллар. 1. $A = (\bar{x} \rightarrow x) \wedge (y \rightarrow \bar{y}) \vee (z \leftrightarrow u)$ формула куйидаги МКНШ га эга бўлади:

$$A = (x \vee \bar{z} \vee u) \wedge (x \vee z \vee \bar{u}) \wedge (\bar{y} \vee \bar{z} \vee u) \wedge (\bar{y} \vee z \vee \bar{u}).$$

$$2. A = (\overline{x \vee z}) \wedge (x \rightarrow y) = (\bar{x} \wedge \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee y).$$

$$\begin{aligned} A &= [\bar{x} \vee (y \wedge \bar{y}) \vee (z \wedge \bar{z})] \wedge [(x \wedge \bar{x}) \vee (y \wedge \bar{y}) \vee \bar{z}] \wedge \\ &\quad \wedge (\bar{x} \vee y \vee (z \wedge \bar{z})) = [(\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge \\ &\quad \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z})] \wedge [(x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (x \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \wedge \\ &\quad \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z})] \wedge [(\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z})]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= (\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \wedge \\ &\quad \wedge (x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (x \vee \bar{y} \vee \bar{z}). \end{aligned}$$

$$3. A = (x \vee y) \wedge (y \vee z) \wedge (z \vee t).$$

$$\begin{aligned} A &= [z \vee y \vee (z \wedge \bar{z}) \vee (t \wedge \bar{t})] \wedge [(x \wedge \bar{x}) \vee y \vee z \vee (t \wedge \bar{t})] \wedge \\ &\quad \wedge [(x \wedge \bar{x}) \vee (y \wedge \bar{y}) \vee z \vee t] = [(x \vee y \vee z \vee t) \wedge (x \vee y \vee \bar{z} \vee t) \wedge \\ &\quad \wedge (x \vee y \vee z \vee \bar{t}) \wedge (x \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t})] \wedge [(x \vee y \vee z \vee t) \wedge \\ &\quad \wedge (\bar{x} \vee y \vee z \vee t) \wedge (x \vee y \vee z \vee \bar{t}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee t)] \wedge \\ &\quad \wedge [(x \vee y \vee z \vee t) \wedge x \vee \bar{y} \vee z \vee t] \wedge (\bar{x} \vee y \vee z \vee t) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z \vee t)]. \end{aligned}$$

n та мулоҳазали мукаммал конъюнктив нормал шакл

$$\wedge (x_1^1 \vee x_2^1 \vee \dots \vee x_n^1)$$

ифодасида \wedge ўрнига \vee ни ва аксинча, \vee ўрнига \wedge ни қўйтанимизда биз *n* та мулоҳазали

$$\vee (x_1^1 \wedge x_2^1 \wedge \dots \wedge x_n^1)$$

мукаммал дизъюнктив нормал шаклга эга бўламиз.

Мукаммал дизъюнктив нормал шаклнинг ҳар бир $x_1^1 \wedge x_2^1 \wedge \dots \wedge x_n^1$ ҳади **конъюнктив конституент** деб аталади.

2-теорема. и та элементар муроҳазаларнинг айнан сони формуласидан фарқли ҳар бир A формуласини мукаммал конъюнктив нормал шаклга келтириш мумкин.

Исбот. Берилган формулани A билан белгилаб, аввало 1 ни мукаммал конъюнктив нормал шаклга келтирамиз:

$$\bar{A} = \wedge(x_1^! \vee x_2^! \vee \dots \vee x_n^!).$$

Бундан $\bar{\bar{A}} = A$ нинг МДНШ ни топамиш:

$$A = \wedge(\overline{x_1^! \vee x_2^! \vee \dots \vee x_n^!}) = \vee(\bar{x}_1^! \wedge \bar{x}_2^! \wedge \dots \wedge \bar{x}_n^!).$$

Мисол. $A = [(\bar{x} \rightarrow x) \wedge (y \rightarrow \bar{y})] \vee (z \leftrightarrow u)$.

$$A = (x \vee \bar{z} \vee u) \wedge (x \vee z \vee \bar{u}) \wedge (\bar{y} \vee \bar{z} \vee u) \wedge (\bar{y} \vee z \vee \bar{u}) \wedge \\ \wedge (x \vee \bar{z} \vee u) \vee (y \wedge \bar{y}) = (x \vee \bar{z} \vee u \vee y) \wedge (x \vee \bar{z} \vee u \vee \bar{y}).$$

9- §. Формулаларнинг асосий хоссалари

Чинлик жадвали бўйича формулани тиклаш. Формулани ўзгарувчилар бўйича қаторга ёйиш. Чинлик жадвали бўйича формулани МКНШ (МДНШ) кўринишида ёзиш.

Маълумки, берилган формула учун чинлик жадвали тузиш мумкин. Формуланинг чинлик жадвалини тузишни биламиш. Энди тескари масала билан шуғулланайлик, яъни берилган чинлик жадвали бўйича формулани топишни мақсад қилиб қўяйлик. Масалан, x ва у элементар муроҳазаларнинг қўйидаги чинлик жадвалларига эга бўлган A, B, C, D формулаларини топайлик (1- жадвал):

1- жадвал

x	y	A	B	C	D	$A \vee B$	$A \vee C$	$A \vee D$	$B \vee D$	$A \vee B \vee C$	$A \vee B \vee C \vee D$
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1

Бундан кейин бирор мулоҳазанинг «чин» қийматини «1» ва «ёлғон» қийматини «0» деб белгилаймиз. Маълумки,

$$A = x \wedge y; B = x \wedge \bar{y}; C = \bar{x} \wedge y; D = \bar{x} \wedge \bar{y}. \quad (1)$$

(1) формулаларнинг ҳар қайсиси учун жадвалнинг, мос равишида, 1, 2, 3, 4- сатрида «1» қиймат ва қолган сатрларида «0» қиймат туради. (1) формулалар икки мулоҳазали конъюнктив конституентлардан иборат.

Энди шундай формулаларни топайликки, улар учун жадвалнинг икки сатрида «1» қиймат ва икки сатрида «0» қиймат турган бўлсин. Бу талабга қуйидаги формулалар жавоб беради:

$$A \vee B = (x \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y}); A \vee C = (x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge y);$$

$$A \vee D = (x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}); B \vee D = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}) \text{ ва } \text{х.к.}$$

Шундай қилиб, ушбу қоида ўринли: 2 ва 4- сатрларда «1», 1 ва 3- сатрларда «0» қийматга эга бўлган формулани ҳосил қилиш учун, биттасининг «1» қиймати худди 2- сатрда ва иккинчисининг «1» қиймати худди 4- сатрда турган икки конъюнктив конституент дизъюнкциясини оламиз:

$$B \vee D = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}).$$

Худди шу каби, 1-жадвалдаги учта конъюнктив конституент дизъюнкцияси учта сатрда «1» қийматга ва битта сатрда «0» қийматга эга бўлган формулани тасвирлайди. Масалан,

$$A \vee B \vee C = (x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y}).$$

Шундай қилиб, тўртала A, B, C, D конъюнктив конституент дизъюнкцияси тўртала сатрда ҳам «1» қийматга эга, яъни айнан чин:

$$E = A \vee B \vee C \vee D = (x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}).$$

Бу формула икки мулоҳазали тўлиқ мукаммал дизъюнктив нормал шаклдан иборат. Демак, E нинг инкори

$$\begin{aligned} \overline{E} &= \overline{(x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y})} = \\ &= \overline{x \wedge y} \wedge \overline{\bar{x} \wedge y} \wedge \overline{x \wedge \bar{y}} \wedge \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}} \end{aligned}$$

СКИ

$$\bar{E} = (\bar{x} \vee \bar{y}) \wedge (x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee y) \wedge (x \vee y)$$

Лішан ёлғон формулани ифодалайди. Бу эса икки мұлоқазали түлиқ мұкаммал конъюнктив нормал шақлдир.

Шундай қилиб, икки x ва y элементар мұлоқаза учун чинлик жадвалларига қараб мос формулаларни тиклаш масаласи ҳал қилинди.

Әнді берилған чинлик жадваллари бүйіча учта x, y, z элементар мұлоқазаның формулаларини топиш масаласига үтәмиз. Бу уч мұлоқаза учун $2^3 = 8$ та қийматлар сатрлари үзилади (2- жадвал).

2-жадвал

x	y	z	\bar{x}	\bar{y}	\bar{z}	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

2- жадвалнинг сатрларидан биридагина «1» қийматга, қолғанларida «0» қийматта эга бўлиш талабига жавоб берувчи формулалар ушбу уч мұлоқазали ҳамма $2^3 = 8$ та конъюнктив конституентлардан иборатдир:

- 1) $x \wedge y \wedge z = A_1$; 4) $x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z} = A_4$; 7) $\bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z = A_7$;
- 2) $x \wedge y \wedge \bar{z} = A_2$; 5) $\bar{x} \wedge y \wedge z = A_5$; 8) $\bar{x} \wedge \bar{y} \wedge \bar{z} = A_8$. (2)
- 3) $x \wedge \bar{y} \wedge z = A_3$; 6) $\bar{x} \wedge y \wedge \bar{z} = A_6$;

Бу (2) конъюнктив конституентлардан ҳар иккитасининг дизъюнкциясини олиб, қийматлари икки сатрда «1», қолганларида «0» бўлган формулаларни; ҳар утасининг дизъюнкциясини олиб, қийматлари уч сатрда «1», қолган сатрларда «0» бўлган формулаларни ҳосил қиласиз ва ҳ.к.

Масалан:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \vee A_2; & B_2 &= A_1 \vee A_3; & B_3 &= A_1 \vee A_4; & B_4 &= A_1 \vee A_5; \\ B_5 &= A_1 \vee A_6; & B_6 &= A_1 \vee A_7; & B_7 &= A_1 \vee A_8; \\ C_1 &= A_1 \vee A_2 \vee A_3 = B_1 \vee A_3; & C_2 &= B_1 \vee A_4; & \dots; \\ D_1 &= A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee A_4 = C_1 \vee A_4; & \dots; \\ E &= A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee A_4 \vee A_5 \vee A_6 \vee A_7 \vee A_8 = \text{МДНШ}; \end{aligned} \quad (3)$$

$$\bar{E} = \bar{A}_1 \wedge \bar{A}_2 \wedge \bar{A}_3 \wedge \bar{A}_4 \wedge \bar{A}_5 \wedge \bar{A}_6 \wedge \bar{A}_7 \wedge \bar{A}_8 = \text{МКНШ}. \quad (4)$$

Бунда саккизтасининг дизъюнкцияси (3) айнан чин formulани ва унинг инкори (4) айнан ёлғон formulани ифодалайди.

n та x_1, x_2, \dots, x_n элементар мuloҳаза учун ҳам масала худди шу усул билан ечилади.

Юқорида келтирилган мuloҳазалардан келиб чиқадики, ҳар бир айнан ёлғон бўлмаган n аргументли A formulани қуйидаги мукаммал дизъюнктив нормал шаклда ёзиш мумкин:

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{A(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=1} x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n}, \quad (5)$$

яъни қийматлар сатрида чин қийматга эга бўлган элементар конъюнкцияларнинг дизъюнкцияси шаклида ёзилади. (5) formulани қуйидагича ҳам ёзиш мумкин:

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)} A(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \cdot x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n}. \quad (6)$$

Бу ерда $x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n}$ элементар конъюнкцияларнинг дизъюнкцияси ҳамма 2^n қийматлар сатри бўйича олинади.

Худди шу каби айнан чиндан фарқ қиливчи исталган A formulани қуйидаги мукаммал конъюнктив нормал шаклда келтириш мумкин:

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{A(\bar{\sigma}_1, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_n) = 0} x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n} \quad (7)$$

СКИ

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} A(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) \vee x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}, \quad (8)$$

яъни $x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}$ элементар дизъюнкцияларнинг конъюнкцияси ҳамма 2^n қийматлар сатри бўйича олинади.

Шундай қилиб, (7) ва (8) формулалар орқали исталган функцияларнинг чинлик жадвалидан фойдаланиб уни МДНШ ва МКНШ кўринишида ёзиш мумкин.

Мисол. 1. Берилган чинлик жадвалига асосан A_1, \dots, A_5 формулаларни МДНШ кўринишида ёзиш талаб этилсин:

3-жадвал

x	y	z	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1

$$A_1(x, y, z) = xy\bar{z} \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z;$$

$$A_2(x, y, z) = xyz \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z;$$

$$A_3(x, y, z) = xyz \vee xy\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z};$$

$$A_4(x, y, z) = xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z};$$

$$A_5(x, y, z) = xyz \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}.$$



Mашқлар

1. Учинчи жадвалда берилган A_1, \dots, A_5 формулаларнинг МКНШ кўринишини топинг.
2. Бир, икки ва уч аргументли ҳар қандай айнан ёлғон бўлган функцияларнинг МКНШ кўринишини топинг.

10- §. Тенг кучлимас формулалар сони

п ўзгарувчили формулалар сони. Элементар конъюнкциялар сони.

и та элементар

$$x_1, x_2, \dots, x_n \quad (1)$$

мулоҳазаларнинг нечта ўзаро тенг кучлимас, яъни ҳар хил формулалари мавжуд деган масалани қўямиз.

Икки x ва у элементар мулоҳаза учун нечта тенг кучлимас формулалар борлигини кўрайлик. x ва унинг $2^2=4$ қийматлар сатри учун: 4 та A, B, C, D формулалардан ҳар қайси-сининг қийматларидан биттаси «1» ва учтаси «0» дан иборат устуни мавжуд. Бундай устунлар сони 4 та, яъни $C_4^1 = 4$.

Ундан кейин, олтига $A \vee B, A \vee C, \dots, C \vee D$ формулалардан ҳар қайси-сининг қийматлари иккита «1» ва иккита «0» дан иборат устунни ҳосил қиласди. Бундай устунлар сони $C_4^2 = 6$ га тенг. Яна тўртта

$$A \vee B \vee C, \quad A \vee C \vee D, \quad A \vee B \vee D, \quad B \vee C \vee D$$

формулалардан ҳар қайси-сининг қийматлари учта «1» ва битта «0» дан ташкил этилган устунни беради. Бундай устунлар $C_4^3 = 4$ тадир. Ниҳоят, E формуланинг қийматлари факат «1» дан тузилган $C_4^4 = 1$ та устунни ташкил этади.

Шундай қилиб, 1-жадвалда

$$C_4^0 + C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 2^4 = 2^{2^2}$$

устун мавжуд бўлади. Бундан эса худди шунча формула борлиги келиб чиқади. Устунларнинг ҳеч қайси иккитаси бир хил бўлмаганинигидан, ҳеч қайси иккита формула ҳам ўзаро тенг кучли эмасdir.

Демак, икки x ва y мулоҳазаининг шу 16 та формуласидан ташқари, уларни ифодалайдиган бошқа тенг кучли формула йўқ. Бундан, x ва y нинг исталган $A(x, y)$ формуласи жадвалда келтирилган формулаларнинг бири билан тенг кучли деган холосага келамиз. Масалан, $(x \leftrightarrow y) \wedge \bar{y}$ формулани олсак, ушбу чинлик жадвалидан

x	\bar{y}	y	$x \leftrightarrow y$	$(x \leftrightarrow \bar{y} \wedge y)$
1	1	0	1	0
1	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1

$$(x \leftrightarrow y) \wedge \bar{y} = \bar{x} \wedge \bar{y} \text{ эканлиги маълум бўлади.}$$

Юқорида ҳосил қилинган формулалардан 15 таси МДНШ ва 1 таси МКНШ кўринишига эга.

Худди шундай фикр юритиш йўли билан x, y, z элементар мулоҳазаларнинг тенг кучлимас формулалар сони

$$C_8^0 + C_8^1 + C_8^2 + C_8^3 + C_8^4 + \dots + C_8^8 = 2^8 = 2^{2^3}$$

га тенглиги келиб чиқади. Тўртта x, y, z, f мулоҳазаларнинг ҳар хил формулалари сони 2^{2^4} га ва, умуман, n та мулоҳазаининг ҳар хил тенг кучлимас формулалари сони

$$C_{2^n}^0 + C_{2^n}^1 + C_{2^n}^2 + \dots + C_{2^n}^{2^n} = 2^{2^n},$$

яъни $N = 2^{2^n}$ га тенг.

Шундай қилиб, n та аргументли тенг кучлимас формулалардан $2^{2^n} - 1$ таси МДНШ ва биттаси МКНШ кўринишига эга.



Муаммоли масала ва топшириқлар

- Күйидаги формулаларни КНШ кўринишига келтиринг:
 - $x \wedge (x \rightarrow y)$; 2) $(\bar{xy} \rightarrow \bar{x}) \wedge (\bar{xy} \rightarrow \bar{y})$;
 - $(x \rightarrow y) \rightarrow (y \rightarrow x)$; 4) $(x \vee \bar{z}) \rightarrow y \wedge z$;
 - $(x \vee \bar{y} \rightarrow x \wedge z) \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{y}) \vee y \wedge \bar{z}$;
 - $(ab \rightarrow bc) \rightarrow ((a \rightarrow b) \rightarrow (c \rightarrow b))$;
 - $(\bar{a} \rightarrow c) \rightarrow ((\bar{b} \rightarrow \bar{a}) \rightarrow (\bar{a} \rightarrow \bar{b}) \rightarrow (bc \rightarrow ac))$.
 - 1- масалада келтирилган формулаларни ДНШ кўринишига келтиринг.
 - Күйидаги формулаларни ДНШ кўринишига келтиринг ва айнан ёлғон ёки айнан ёлғон эмаслигини аниқланг:
 - $\bar{xy} \leftrightarrow \bar{x} \vee \bar{y}$;
 - $(x \leftrightarrow y) \wedge (\bar{xy} \vee \bar{x}\bar{y})$;
 - $xy \rightarrow (x \rightarrow \bar{y})$;
 - $x \vee y \rightarrow (x \leftrightarrow y)$;
 - $x \vee y \rightarrow z$;
 - $(x \rightarrow z)(y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow y)$.
 - 1 ва 3- масалаларда келтирилган формулаларни МКНШ ва МДНШ кўринишига келтиринг.
 - $f(x, y, z)$ функция ўзгарувчиларнинг фақат биттаси чин қиймат олганда ва фақат шунда чин қиймат олади. $f(x, y, z)$ функциянинг чинлик жадвалини тузинг ва уни формула орқали ифодаланг.
 - Чинлик жадвалидан $f_1(x, y, z), f_2(x, y, z), f_3(x, y, z), f_4(x, y, z), f_5(x, y, z), f_6(x, y, z)$ функцияларни ифодаловчи формулаларни топинг ва уларни соддалаштиринг:

7. Куйидаги мұккамал нормал шаклдаги формулаларнинг чинлик жадвалини түзинг ва уларни соддалаштириңг:
 - 1) $xy \vee x\bar{y} \vee \bar{x}y$;
 - 2) $(x \vee \bar{y})(\bar{x} \vee y)(\bar{x} \vee \bar{y})$;
 - 3) $x\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee x\bar{y}\bar{z}$;
 - 4) $(x \vee y \vee \bar{z})(\bar{x} \vee y \vee z)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z})$.
8. Бир, икки ва уч аргументли ҳар қандай айнан чин бўлган функцияларнинг МДНШ кўринишини толинг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Формулаларнинг нормал шакллари деб нимага айтамиз?
2. Формуланинг дизъюнктив ва конъюнктив нормал шаклларини ифодаланг.
3. Формулани мұккамал конъюнктив ва дизъюнктив нормал шаклларга келтириш алгоритмини ёзинг.
4. Формулаларнинг асосий хоссаларини келтириңг.
5. Тенг кучлимас формулалар сони нимага тенг?

11- §. Формуланинг чинлик түплами

- Чинлик түплами. Мантиқий амалларнинг чинлик түплами.

Маълумки, *n* та элементар x_1, x_2, \dots, x_n муроҳазаларнинг қийматлари 2^n та қийматлар сатрини ташкил этади. Бу муроҳазаларнинг ҳар бир *A* формуласи баъзи қийматлар сатрларида «1» қийматни ва баъзиларида «0» қийматни қабул қиласди.

Таъриф. *A* формула «1» қиймат қабул қилувчи элементар муроҳазаларнинг ҳамма қийматлар сатрларидан тузилган түплам *A* формуланинг чинлик түплами дейилади.

Ўтган параграфларда кўрганимиздек, элементар муроҳазаларнинг (*A*) формулаларидан $C_{2^n}^1 = 2^n$ таси битта қийматлар сатрида «1» қийматни қабул қиласди. Демак, бундай ҳар бир формула бир элементли чинлик түпламига эга.

Худди шунингдек, (*A*) формулаларнинг $C_{2^n}^2$ тасининг ҳар бири икки элементли чинлик түпламига, $C_{2^n}^3$ тасининг

ҳар бири уч элементли чинлик тўпламига, ..., $C_{2^n}^{2^n}$ формула эса 2^n та элементли чинлик тўпламига эгадир. Ё айнан ёлғон формуланинг чинлик тўплами эса \emptyset бўш тўпламдан иборат.

x_1, \dots, x_n мулоҳазаларнинг айнан чин формуласига тегишли чинлик тўпламини U универсал тўплам деб олсак, шу мулоҳазаларнинг ҳамма формулаларга тегишли чинлик тўпламлари U нинг қисм тўпламларини ташкил этади ва бу универсал тўплам

$$C_{2^n}^0 + C_{2^n}^1 + \dots + C_{2^n}^{2^n-1} + C_{2^n}^{2^n} = 2^{2^n} \text{ та}$$

қисм тўпламларга эга бўлади.

Шундай қилиб, n та элементар мулоҳазанинг ҳамма A формулалари билан уларнинг чинлик тўпламлари орасида ўзаро бир қийматли мослих ўрнатилади.

Ҳамма ўзаро тенг кучли формулаларга битта чинлик тўплами мос келади.

Мисоллар. 1. Уч элементар x, y, z мулоҳазанинг $A = x \wedge \bar{y} \wedge z$ формуласи фақат битта $(1, 0, 1)$ қийматлар сатрида «1» қийматни қабул қиласди. Шу сабабли, бу формуланинг чинлик тўплами ушбу бир элементли $P = \{1, 0, 1\}$ тўпламдир.

2. $A = (x \wedge y \wedge z) \vee (\bar{x} \wedge y \wedge \bar{z}) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge z)$ формула уч элементли $Q = \{(1, 1, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ чинлик тўпламига эгадир.


3. Ушбу $A = \overline{x \vee y} \leftrightarrow \bar{x} \wedge \bar{y}$ формула айнан чиндир. Шунинг учун унинг чинлик тўплами универсал $U = \{(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)\}$ тўпламдан иборат.

A формула P тўпламда чин бўлса, у ҳолда P нинг тўлдирувчиси бўлган \bar{P} тўпламда ёлғон бўлади. Лекин A нинг \bar{A} инкори \bar{P} да чин ва P да ёлғон бўлади. Худди шу каби, айнан чин J формула U да чин, лекин $\bar{U} = \emptyset$ да ёлғон. Айнан ёлғон \bar{J} формула эса, аксинча, \emptyset да чин ва $\emptyset = \bar{U}$ да ёлғондир.


и та элементар муроҳаза формуалалари билан чинлик түпламлари орасидаги бундай боғланиш муроҳазалар мантиқидаги масалани түпламлар назариясидаги масалага ва, аксинча, түпламлар назариясидаги масалани муроҳазалар мантиқидаги масалага кўчириш имкониятини беради. Ҳақиқатан ҳам:

1. A формула P түпламда чин ва B формула Q түпламда чин бўлса, $A \wedge B$ формула қандай түпламда чин бўлади?

Маълумки (конъюнкция таърифига асосан), бу формула A ва B нинг иккаласи ҳам чин бўлган түпламда чиндир. Демак, $P \cap Q$ кесишмада чиндир. Масалан, $A = x \wedge \bar{y} \wedge z$ ва $B = (x \wedge y \wedge z) \vee (\bar{x} \wedge y \wedge \bar{z}) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge z)$ формуаларнинг $(A \wedge B)$ конъюнкцияси $P \cap Q = \{(1, 0, 1)\}$ түпламда чиндир. Шундай қилиб, муроҳазалар мантиқидаги \wedge амалига түпламлар назариясидаги \cap амали мос келади (ІІ.1- шакл).



ІІ.1- шакл.




ІІ.2- шакл.

2. $A \vee B$ формула қандай түпламда чин бўлади?

Дизъюнкция таърифига асосан $A \vee B$ формула A ва B формуаларнинг камида биттаси чин бўлган түпламда чиндир. Демак, $P \cup Q$ түпламда $A \vee B$ формула чиндир. Шундай қилиб, муроҳазалар мантиқидаги \vee амалига түпламлар назариясидаги \cup амалининг мос келишини кўрамиз (ІІ.2- шакл). Юқорида келтирилган A ва B формуалалар учун

$$P \cup Q = \{(1, 1, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 1)\}.$$



III.3- шакл.

3. $A \rightarrow B$ импликациянинг чинлик тўпламини топайлийк.

Импликация таърифига асосан $A \rightarrow B$ формула фақат A чин бўлиб, B ёлғон бўлган тўпламда ёлғондир. Демак, $P - Q = \{(1, 1, 1), (0, 1, 0)\}$ айирмада $A \rightarrow B$ формула ёлғондир. Шундай қилиб, $A \rightarrow B$ формула U нинг штрихланган бўлагида ёлғон бўлиб, қолган бўлагида чиндир (III.3- шакл). U нинг қолган бўлаги эса $\bar{P} \cup Q$ га тенг. Демак, $A \rightarrow B$ формула $\bar{P} \cup Q$ тўпламда чиндир.

Иккинчи томондан, \bar{A} формула \bar{P} да ва B формула Q да чин бўлгани учун, $\bar{A} \vee B$ формула $\bar{P} \cup Q$ да чиндир. Демак, бизга маълум бўлган $A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$ тенг кучлиликни бошқа йўл билан исботладик.

4. (1) мулоҳазаларнинг исталган A ва B формулаларини олиб, $A \vee \bar{A} \vee B = J$ тенг кучлиликни исботлайдик. \bar{A} формула \bar{P} да чин, A формула P да ва B формула Q да чин бўлсин. Шундай қилиб, $\bar{A} \vee A \vee B$ формула $\bar{P} \cup P \cup Q = U \cup Q = U$ тўпламда чин. Шу сабабли, $\bar{A} \vee A \vee B$ айнан чин формула бўлиб, $\bar{A} \vee A \vee B = J$ дир.

5. Қандай шартда $A \rightarrow B = J$ тенг кучлилик бажарилади?

Маълумки, $A \rightarrow B$ формула U нинг $P - Q$ дан бошқа бўлагида, демак, $\overline{P - Q}$ да чин. $\overline{A \rightarrow B = J}$ шарт бўйича $\overline{P - Q} = U$ бўлиши керак. Бундан $\overline{P - Q} = \overline{U}$ ёки $P - Q = \emptyset$ келиб чиқади. Бу эса $P \subseteq Q$ эканини билдиради.

6. $A \rightarrow B$ формуланинг чинлик тўпламини аниқлайдик.

Бу формула A чин ва B ёлғон, шунингдек, B чин ва A ёлғон бўлган тўпламда, яъни $(P - Q) \cup (Q - P)$ дагина ёлғон бўлиб, U нинг қолган бўлагида, яъни $(P - Q) \cup (Q - P)$ да чиндир.

Шундай қилиб, $A \leftrightarrow B$ нинг чинлик түплами U нинг штрихланган бүлгидан бошқа қисми билан тасвирланади (II.4- шакл):

Бошқа қисмiga мос келувчи түпламни топамиз. $P - Q = P \cap \bar{Q}$ ва $Q - P = Q \cap \bar{P} = \bar{P} \cap Q$. Бундан $\overline{P - Q} = \bar{P} \cup Q$ ва $\overline{Q - P} = P \cup \bar{Q}$ келиб чиқади. Шундай қилиб,

$$(P - Q) \cup (Q - P) = \overline{P - Q} \cap \overline{Q - P} = (\bar{P} \cup Q) \cap (P \cup \bar{Q}).$$

Демак, $A \leftrightarrow B$ формула $(\bar{P} \cup Q) \cap (P \cup \bar{Q})$ түпламда чиндир.

Иккинчи томондан, $(\bar{P} \cup Q) \cap (P \cup \bar{Q})$ түплам $(\bar{A} \vee B) \wedge (A \vee \bar{B})$ формуланинг чинлик түплами бўлгани учун, ушбу маълум тенг кучлиликка эга бўламиз:

$$A \leftrightarrow B = (\bar{A} \vee B) \wedge (A \vee \bar{B}).$$

Куйидаги $\bar{A} \vee B = A \rightarrow B$, $\bar{B} \vee A = B \rightarrow A$ формулаларга асосан

$$A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A).$$

7. Формулалар билан түпламлар орасидаги боғланишга таяниб, куйидаги теоремани исботлайлик.


Теорема. A ва B формулалар тенг кучли бўлиши учун $A \leftrightarrow B$ формула тавтология бўлиши зарур ва етарли.

Исбот. а) $A = B$ бўлсин. Демак, $P = Q$. $A \leftrightarrow B$ нинг чинлик түплами

$$(\bar{P} \cup Q) \cap (P \cup \bar{Q}) = (\bar{P} \cup P) \cap (P \cup \bar{P}) = U \cap U = U.$$

Бундан $A \leftrightarrow B = J$ келиб чиқади, яъни $A \leftrightarrow B$ тавтологиядир;

б) $(\bar{P} \cup Q) \cap (P \cup \bar{Q}) = J$ бўлсин, у ҳолда $A \leftrightarrow B = J$ бўлади. Демак, $A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) = J$. Бундан, конъюнкция таърифига асосан $A \rightarrow B = J$ ва $B \rightarrow A = J$. Бу ердан, 5- бандга биноан $P \subseteq Q$ ва $Q \subseteq P$. Демак, $Q = P$ келиб чиқади. Бу ўз навбатида $A = B$ бўлишини кўрсатади.



II.4- шакл.

Шундай қилиб, мулоҳазалар алгебрасидаги \wedge , \vee , – мантиқий амалларига мос равишида түпламлар алгебрасидаги Π , U , – (кўпайтма, бирлашма, тўлдирувчи) амаллари мос келади. Мулоҳазалар алгебрасидаги «1», «0» константаларга түпламлар алгебрасидаги U ва \emptyset (универсал ва бўш) түпламлар мос келади. Демак, мулоҳазалар алгебрасидаги бирор ифодада \wedge ни Π га, \vee ни U га, инкорни ($-$) тўлдирувчига, «1» ни универсал U тўпламга, «0» ни бўш \emptyset тўпламга алмаштирилса, тўпламлар алгебрасидаги ифода ҳосил бўлади ва аксинча.

12- §. Мулоҳазалар алгебраси функциялари. Функциялар тенг кучлилиги. Функциялар суперпозицияси

- Функция.** *Функциялар тенг кучлилиги. 0 ва 1 сақловечи функциялар. n аргументли функциялар сони. Бир ранги суперпозиция.*

Маълумки, мантиқий амаллар мулоҳазалар алгебраси нуқтаи назаридан чинлик жадваллари билан тўлиқ тавсифланади. Агарда функциянинг жадвал шаклида берилишини эсга олсак, у ҳолда мулоҳазалар алгебрасида ҳам функция тушунчаси мавжудлигини биламиз.

1-таъриф. *Мулоҳазалар алгебрасининг x_1, \dots, x_n аргументли $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияси деб, 0 ва 1 қийматлар қабул қилувчи функцияга айтилади ва унинг x_1, \dots, x_n аргументлари ҳам 0 ва 1 қийматлар қабул қиласди. $f(x_1, \dots, x_n)$ функция ўзининг чинлик жадвали билан берилади:*

x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n	$f(x_1, \dots, x_n)$
0	0	0	...	0	0	$f(0, 0, \dots, 0, 0)$
1	0	0	...	0	0	$f(1, 0, \dots, 0, 0)$
...
1	1	1	...	1	0	$f(1, 1, \dots, 1, 0)$
1	1	1	...	1	1	$f(1, 1, \dots, 1, 1)$

Бу жадвалнинг ҳар бир сатрида аввал ўзгарувчиларнинг $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ қийматлари ва шу қийматлар сатрида f функцияниң $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ қиймати берилади. Олдинги параграфларда исбот қилган эдикки, и та ўзгарувчи учун қийматлар сатрларининг сони 2^n ва функцияларнинг сони 2^{2^n} га тенг бўлади.

Мулоҳазалар алгебрасида асосий элементар функциялар куйидагилардан иборат:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x, & f_2(x) &= \bar{x}, & f_3(x, y) &= xy, & f_4(x, y) &= x \vee y, & f_5(x, y) &= x \rightarrow y, \\ f_6(x, y) &= x \leftrightarrow y, & f_7(x_1, \dots, x_n) &= 1, & f_8(x_1, \dots, x_n) &= 0. \end{aligned}$$

Агар $f(0, 0, \dots, 0) = 0$ бўлса, у ҳолда $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция 0 сақловчи функция деб аталади. Агар $f(1, 1, \dots, 1) = 1$ бўлса, у ҳолда $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция 1 сақловчи функция деб аталади.

n та аргументли 0 сақловчи функцияларнинг сони 2^{2^n-1} га ва 1 сақловчи функцияларнинг сони ҳам 2^{2^n-1} га тенг бўлади (исбот қилишни ўқувчига ҳавола этамиш).

Мулоҳазалар алгебрасидаги n та аргументли 0 сақловчи функциялар тўпламини P_0 ва 1 сақловчи функциялар тўпламини P_1 билан белгилаймиз.

2-таъриф. f ва g мулоҳазалар алгебрасининг функциялари ва x_1, \dots, x_n лар ҳеч бўлмагандан улардан биттасининг аргументлари бўлсин. Агар x_1, \dots, x_n аргументларнинг ҳамма қийматлар сатрлари учун f ва g функцияларнинг мос қийматлари бир хил бўлса, у ҳолда f ва g функциялар тенг кучли функциялар деб аталади ва $f = g$ шаклида ёзилади.

3-таъриф. Агарда

$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n)$ муносабат бажарилса, у ҳолда x_i аргумент $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияниң соҳта аргументи деб аталади.

Агарда

$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n) \neq f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n)$ бўлса, у ҳолда x_i аргумент $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияниң соҳта эмас (муҳим) аргументи деб аталади.

Мисол. $f(x, y) = x \vee (xy)$ функция учун у аргументи сохта аргумент бўлади, чунки $f(1, 0) = f(0, 1)$.

Функцияниң аргументлари қаторига исталганча сохта аргументларни ёзиш мумкин ва у қатордан ҳамма сохта аргументларни олиб ташлаш мумкин.

Энди мулоҳазалар алгебраси функцияларининг суперпозицияси тушунчасини кўрайлик.

4-тади Φ . $\Phi = \{\phi_1(x_{11}, \dots, x_{1k_1}), \dots, \phi_m(x_{m1}, \dots, x_{mk_m})\}$ мулоҳазалар алгебраси функцияларининг чекли системаси бўлсин. Кийидаги икки усулнинг биттаси билан ҳосил қилинадиган ψ функция Φ системадаги ϕ_1, \dots, ϕ_m функцияларининг элементар суперпозицияси ёки бир ранги суперпозицияси деб аталади:

а) бирор $\phi_j \in \Phi$ функцияниң x_j аргументини қайта номлаш усули, яъни

$$\phi_j(x_{j1}, x_{j2}, \dots, x_{j-1}, y, x_{j+1}, \dots, x_{jk_j}),$$

бу ерда у ўзгарувчи, x_{jk} ўзгарувчиларнинг бирортаси билан мос тушиши мумкин;

б) бирор $\phi_j \in \Phi$ функцияниң бирор x_j аргументи ўрнига иккинчи бир $\phi_e(x_{e1}, \dots, x_{ek}) \in \Phi$ функцияни қўйиш усули, яъни

$$\phi_j(x_{j1}, \dots, x_{j-1}, \phi_e(x_{e1}, \dots, x_{ek}), x_{j+1}, \dots, x_{jk_j}).$$

Агар Φ система функцияларининг k ранги суперпозициялари синфи $\Phi^{(k)}$ берилган бўлса, у ҳолда $\Phi^{(k+1)} = (\Phi^{(k)})^{(1)}$ бўлади.

1-изоҳ. 4-таърифнинг а) қисмiga асосан бир хил чинлик жадвалига эга бўлиб, лекин ўзгарувчиларнинг белгиланиши билан фарқ қиласидиган функциялар бир-бирининг суперпозицияси бўлади.

2-изоҳ. 4-таърифнинг а) қисмiga асосан бирор x_j ўзгарувчини x_{jk} ($i \neq k$) билан қайта номласак, натижада кам ўзгарувчили функцияга эга бўламиз. Бу ҳолда x_j ва x_{jk} ўзгарувчилар айнан тенглаштирилди деб айтамиз. Масалан, $x \vee y$ ва $x \wedge \bar{y}$ функциялардаги у ни x билан қайта номласак, у вақтда $x \vee x = x$ ва $x \wedge \bar{x} = 0$ функцияларни ҳосил қиласидиган.

3-изоҳ. 4-таърифнинг а) қисмига асосан агар $\Phi \subset \Phi^{(1)}$ бўлса, у ҳолда $\Phi^{(r)} \subset (\Phi)^{(r+1)}$ ва умуман $r \leq s$ бўлганда $\Phi^{(r)} \subseteq (\Phi)^{(s)}$.

5-таъриф. \bar{x} , xy , $x \vee y$, $x \rightarrow y$, $x \leftrightarrow y$ асосий элементар функцияларнинг суперпозицияси формула деб аталади.

13- §. Буль алгебраси

Буль алгебрасининг таърифи. Мисоллар.

Таъриф. Конъюнкция ($x \wedge y$), дизъюнкция ($x \vee y$), инкор (\bar{x}) амалари ва 0, 1 $\in M$ элементлари аниқланган M тўпламда шумантиқий амаллар ва 0, 1 элементлар учун қўйидаги аксиомалар

$$\bar{\bar{x}} = x; \quad (1)$$

$$xy = yx; \quad (2)$$

$$(xy)z = x(yz); \quad (3)$$

$$x \vee y = y \vee x; \quad (4)$$

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z); \quad (5)$$

$$x(y \vee z) = xy \vee xz; \quad (6)$$

$$x \vee yz = (x \vee y)(x \vee z); \quad (7)$$

$$\overline{x \vee y} = \bar{x} \bar{y}; \quad (8)$$

$$\overline{xy} = \bar{x} \vee \bar{y}; \quad (9)$$

$$x \vee x = x; \quad (10)$$

$$xx = x; \quad (11)$$

$$1x = x; \quad (12)$$

$$0 \vee x = x \quad (13)$$

бажарилса, бундай M тўплам Буль алгебраси деб аталади.

Буль алгебрасига қуидаги түпламлар мисол бўла олади:

1. M – бирор түплам (масалан, тўғри чизикда ётган нуқталар түплами ёки натурал сонлар түплами) ва μ_M – шу M нинг ҳамма қисм түпламларидан иборат түплам бўлсин. $xy(x, y \in \mu_M)$ орқали x ва у түпламларнинг $x \sqcup y$ кесишмасини, $x \vee y$ орқали x ва у түпламларининг $x \sqcup y$ бирлашмасини, \bar{x} орқали x түпламнинг M түпламгача \bar{x} тўлдирувчисини, 0 орқали \emptyset бўш түпламни ва 1 орқали M түпламни белгилаб оламиз. У ҳолда μ_M түплам Буль алгебраси бўлади, чунки юқорида кўрсатилган 13 та аксиома бажарилади.

2. Мулоҳазалар түплами учун \wedge , \vee ва – амаллари ҳамда 0 ва 1 элементлари аниқланганлиги учун бу түпламни Буль алгебраси деб тахмин қилишимиз турган гап. Лекин бунинг учун қуидаги аниқликни киритиш керак. A ва B мулоҳазалар айнан teng бўлиши учун $A \leftrightarrow B$ эквивалентлик абсолют чин бўлиши керак. Ана шундай тушунча киритилган мулоҳазалар түплами Буль алгебраси бўлади.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Қуидаги формулаларнинг чинлик түпламларини топинг:

$$A = xy \vee x\bar{y} \vee \bar{x}y; \quad B = (x \vee \bar{y})(\bar{x} \vee y)(\bar{x} \vee \bar{y});$$

$$C = xyz \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}\bar{y}z; \quad D = (x \vee y \vee \bar{z})(\bar{x} \vee y \vee z)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z});$$

$$E = \bar{x}\bar{y} \leftrightarrow \bar{x} \vee xy; \quad F = (x \leftrightarrow y) \wedge (\bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}y);$$

$$G = xy \rightarrow (x \leftrightarrow \bar{y}); \quad J = x \vee y \rightarrow (x \leftrightarrow y);$$

$$L = x \vee y \rightarrow z; \quad M = (x \rightarrow z)(y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow y).$$

2. 1- масалада келтирилган формулалардан тузилган $A \vee B$, $A \vee C$, $A \vee D$, $A \vee F$, $A \wedge B$, $A \wedge C$, $A \wedge D$, $A \wedge F$, $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $A \leftrightarrow D$, $A \leftrightarrow F$, $C \rightarrow D$, $C \rightarrow F$, $C \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow B$, $C \leftrightarrow F$, $F \leftrightarrow E$, $A \rightarrow B \rightarrow C$, $A \rightarrow F \rightarrow C$, $(A \leftrightarrow F) \rightarrow C$, $(A \leftrightarrow F) \rightarrow D$, $A \leftrightarrow F \leftrightarrow E$, $E \rightarrow B$, $E \rightarrow C$, $E \leftrightarrow D$, $E \leftrightarrow F$, $G \rightarrow B$, $G \rightarrow C$, $G \leftrightarrow D$, $G \leftrightarrow F$, $J \rightarrow B$, $J \rightarrow C$, $J \leftrightarrow D$, $J \leftrightarrow F$, $L \rightarrow B$, $L \rightarrow C$, $L \leftrightarrow D$, $L \leftrightarrow F$, $M \rightarrow B$, $M \rightarrow C$, $M \leftrightarrow D$,

$M \leftrightarrow F$, $E \rightarrow F \rightarrow L$, $M \rightarrow J \rightarrow G$, $(L \leftrightarrow E) \rightarrow M$, $(A \leftrightarrow G) \rightarrow F$, $A \leftrightarrow M \leftrightarrow J$ мураккаб формулаларнинг чинлик тўпламини топинг.

3. $f_1 = \overline{xy \vee \bar{z}}$ ва $f_2 = x(xy \vee \bar{yz}) \vee (\bar{y} \vee \bar{iz})$ функцияларга тенг кучли бўлган функцияларни топинг.
4. Ёлғон қиймат сақловчи $(f(0, 0, \dots, 0) = 0)$ n та аргументли ҳар хил функцияларнинг сони нечта?
5. Чин қиймат сақловчи $(f(1, 1, \dots, 1) = 1)$ n та аргументли ҳар хил функцияларнинг сони нечта?
6. Қуидаги $f_1(x, y, z, t) = (x \vee y)(z \vee t)$ ва $f_2(x, y, z, t) = xz \vee yz \vee xt \vee yt$ ҳамда $f_3(x, y, z, t) = xy \vee zt$ ва $f_4(x, y, z, t) = (x \vee z)(y \vee z)(x \vee t)(y \vee t)$ функцияларнинг тенг кучлилигини исботланг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Мантиқий амалларнинг чинлик тўпламлари.
2. Формуланинг чинлик тўплами деб нимага айтамиз?
3. Мулоҳазалар алгебраси функциялари. Қачон функциялар тенг кучли деб айтилади? Функциялар суперпозицияси нимадан иборат?
4. Буль алгебраси таърифини келтиринг.

14- §. Мантиқ алгебрасидаги икки тарафлама қонун

Икки тарафлама функция. Ўз-ўзига икки тарафлама функция. Икки тарафлама қонун. Мисоллар. Теорема. Лемма.

Энди икки тарафлама (қўшма) функция тушунчасини киритамиз. $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияга икки тарафлама бўлган функцияни топиш учун f функциянинг чинлик жадвалида ҳамма ўзгарувчиларни уларнинг инкорига алмаштириш керак, яъни ҳамма жойда 1 ни 0 га ва 0 ни 1 га алмаштириш керак.

1-т аъриф . Куйидагича аниқланган

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \tilde{f}(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$$

функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциянинг икки тарафлама функцияси деб аталади.

2-таъриф. Агар

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{f}(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$$

муносабат бажарилса, у ҳолда $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ га ўз-ўзига икки тарафлама функция деб аталади.

Таърифга асосан, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ икки тарафлама функция $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ва $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n)$ қийматлар сатрларида қарама-қарши қийматлар қабул қиласи.

Мисоллар. 1. Мулоҳазалар алгебрасининг асосий элементар функцияларига икки тарафлама бўлган функцияларни топинг.

$$1) f_1(x) = x \text{ га икки тарафлама функция } f_1^*(x) = x \text{ бўлади.}$$

$$2) f_2(x) = \bar{x} \text{ га икки тарафлама функция } f_2^*(x) = \bar{x} \text{ бўлади.}$$

$$3) f_3(x, y) = xy \text{ га икки тарафлама функция } f_3^* = x \vee y \text{ бўлади.}$$

$$4) f_4(x, y) = x \vee y \text{ га икки тарафлама функция } f_4^* = xy \text{ бўлади.}$$

$$5) f_5(x, y) = x \rightarrow y \text{ га икки тарафлама функция } f_5^* = \overline{y \rightarrow x} \text{ бўлади.}$$

$$6) f_6(x, y) = x \leftrightarrow y \text{ га икки тарафлама функция } f_6^* = \overline{x \leftrightarrow y} \text{ бўлади.}$$

$$7) f_7 = 1 \text{ га } f_7^* = 0 \text{ ва } f_8 = 0 \text{ га } f_8^* = 1 \text{ икки тарафлама функция бўлади.}$$

Келтирилган мисолнинг ечимидан кўриниб турибдики, $f_1(x)$ ва $f_2(x)$ функциялар, таърифга асосан, ўз-ўзига икки тарафлама функциялар бўлади.

2. $f(x, y, z) = xy \vee yz \vee xz$ функциясининг ўз-ўзига икки тарафлама функция эканлигини исбот қилинг.

Исбот.

$$f^*(x, y, z) = \overline{\bar{x}y \vee \bar{y}z \vee \bar{x}z} = \overline{\bar{x}y} \wedge \overline{\bar{y}z} \wedge \overline{\bar{x}z} = (x \vee y)(y \vee z)(x \vee z) =$$

$$= [(x \vee y)y \vee (x \vee y)z](x \vee z) = [y \vee yz \vee xz](x \vee z) = (y \vee xz)(x \vee z) =$$

$$= xy \vee yz \vee xz = xy \vee yz \vee xz.$$

Демак, $f(x, y, z) = f^*(x, y, z)$ эканлитиги учун f ўз-ўзига икки тарафлама функциядир.

Теорема. Агар

$$\Phi(x_1, \dots, x_n) = f(f_1(x_{11}, \dots, x_{1p_1}), \dots, f_m(x_{m1}, \dots, x_{mp_m}))$$

бўлса, у ҳолда

$$\Phi^*(x_1, \dots, x_n) = f^*(f_1^*(x_{11}, \dots, x_{1p_1}), \dots, f_m^*(x_{m1}, \dots, x_{mp_m}))$$

бўлади.

Исбот. $\Phi^*(x_1, \dots, x_n) = \overline{\Phi}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) =$

$$\begin{aligned} &= \tilde{f}(f_1(\bar{x}_{11}, \dots, \bar{x}_{1p_1}), \dots, f_m(\bar{x}_{m1}, \dots, \bar{x}_{mp_m})) = \\ &= \tilde{f}(\tilde{f}_1(\bar{x}_{11}, \dots, \bar{x}_{1p_1}), \dots, \tilde{f}_m(\bar{x}_{m1}, \dots, \bar{x}_{mp_m})) = \\ &= \tilde{f}(f_1^*(x_{11}, \dots, x_{1p_1}), \dots, \tilde{f}_m^*(x_{m1}, \dots, x_{mp_m})) = \\ &= f^*(f_1^*(x_{11}, \dots, x_{1p_1}), \dots, f_m^*(x_{m1}, \dots, x_{mp_m})). \end{aligned}$$

Теореманинг исботидан икки тарафлама қонун келиб чиқади.

Икки тарафлама қонуни. $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ функцияларнинг суперпозициясига икки тарафлама бўлган функция мос равишда $\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_m^*$ икки тарафлама функциялар суперпозициясига тенг кучлидир, яъни агар $A = C[\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m]$ формула $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни реализация этса, у ҳолда $C = [\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_m^*]$ формула $f^*(x_1, \dots, x_n)$ функцияни реализация этади.

Бу формула A формулага икки тарафлама бўлган формула деб айтилади ва уни A^* деб белгилаймиз. Демак,

$$A^* = C[\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_m^*].$$

Ушбу қонундан ўз-ўзига икки тарафлама бўлган функцияларнинг суперпозицияси яна ўз-ўзига икки тарафлама функция бўлиши тиги келиб чиқади, яъни агар $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ ўз-ўзига икки тарафлама функция бўлса,

у ҳолда $\Phi^* = \phi^*(\phi_1^*, \dots, \phi_m^*)$ функция ҳам ўз-ўзига икки тарафлама бўлади. Ҳақиқатан ҳам,

$$\Phi^* = \phi^*(\phi_1^*, \dots, \phi_m^*) = \phi(\phi_1, \dots, \phi_m) = \Phi.$$

Агар функция формула орқали ифодалантган ва бу формула ўз навбатида \wedge , \vee , – мантиқ амаллари орқали ифодалантган бўлса, у ҳолда бу функцияга (формулага) икки тарафлама бўлган функцияни (формулани) топиш учун \vee ни \wedge га, \wedge ни \vee га, 1 ни 0 га ва 0 ни 1 га алмаштириш кифоя. Бу принципни тенг кучли формулаларга ишлатганда, яна тенг кучли формулалар ҳосил қиласиз, яъни $A(x_1, \dots, x_n) = B(x_1, \dots, x_n)$ бўлса, у ҳолда $A^*(x_1, \dots, x_n) = B^*(x_1, \dots, x_n)$.

Ушбу принцип орқали мантиқ алгебрасининг бир формуласидан иккинчи формуласига, бир теоремасидан иккинчи теоремасига, бир таърифидан иккинчи таърифиға келамиз.

Масалан, юқорида келтирилган (2), (3), (6), (8), (10), (12) тенг кучли формулаларга ушбу принципни ишлатсак, (4), (5), (7), (9), (11), (13) тенг кучли формулалар келиб чиқади.

Мантиқ алгебрасида элементлари n та аргументли ўз-ўзига икки тарафлама функциялардан иборат бўлган тўпламни S билан белгилаймиз, унинг элементларининг сони 2^{2^n-1} га тенгdir.

Энди ўз-ўзига икки тарафлама бўлмаган функциялар ҳақидаги леммани кўриб чиқайлик.

Л е м м а . Агар $\phi(x_1, \dots, x_n) \notin S$ бўлса, у ҳолда ундан аргументларининг ўрнига x ва \bar{x} функцияларни қўйиш усули билан бир аргументли ўз-ўзига икки тарафлама бўлмаган функция, яъни константани ҳосил қилиш мумкин.

И с б о т . $\phi(x_1, \dots, x_n) \notin S$ бўлганлиги учун, шундай $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ қийматлар сатри топиладики, $\phi(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) = \phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ бўлади.

$\varphi_i(x) = x^{\alpha_i} (i = 1, \dots, n)$ функцияни киритамиз ва $\varphi_i(x) = \phi(\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x))$ деб белгилаб оламиз. У вақтда

Күйидаги натижага эга бўламиз:

$$\begin{aligned}\phi(0) &= \phi(\phi_1(0), \dots, \phi_n(0)) = \phi(0^{\alpha_1}, \dots, 0^{\alpha_n}) = \phi(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) = \\ &= \phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \phi(1^{\alpha_1}, \dots, 1^{\alpha_n}) = \phi(\phi_1(1), \dots, \phi_n(1)) = \phi(1).\end{aligned}$$

Лемма исбот бўлди.

15- §. Мантиқ алгебрасидаги арифметик амаллар. Жегалкин күпхәди

- Арифметик амаллар. Жегалкин күпхәди. Мантиқий амалларни арифметик амаллар орқали ифодалаш. Чизиқли функция. Теорема.

$\{0, 1\}$ Буль алгебрасидаги x конъюнкция амали оддий арифметикадаги 0 ва 1 сонлари устидаги кўпайтма амалига мос келади. Аммо 0 ва 1 сонларини қўшиш натижаси $\{0, 1\}$ тўплам доирасидан четта чиқади. Шунинг учун И.И.Жегалкин 2 модулига асосан қўшиш амалини киритади (И.И.Жегалкин ўтган асрнинг 30-йиллар бошида Москва давлат университетида биринчи бўлиб математик мантиқ бўйича илмий семинар ташкил этган). x ва y мулоҳазаларни 2 модули бўйича қўшишни $x + y$ сифатида белгилаймиз ва у кўйидаги чинлик жадвали билан берилади:

x	y	$x+y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Чинлик жадвалидан қўриниб турибдики, $x + y = x \leftrightarrow y$. Мантиқ алгебрасидаги кўпайтма ва 2 модули бўйича қўшиш мантиқ амаллари учун коммутативлик, ассоциативлик ва дистрибутивлик арифметик қонунлари ўз кучини сақлади.

Буль алгебрасидаги асосий мантиқий амалларни кири-
тилган арифметик амаллар орқали қуидагича ифодалаш
мумкин:

- 1) $\tilde{x} = x + 1$; 2) $x \wedge y = xy$; 3) $x \vee y = xy + x + y$;
- 4) $x \rightarrow y = xy + x + 1$; 5) $x \leftrightarrow y = x + y + 1$.

2 модули бўйича қўшиш амалининг таърифига асосан $x + x = 0$ ва $xx = x$ ($x^n = x$).

Мантиқ алгебрасидаги исталган функцияни ягона ариф-
метик кўпҳад шаклига келтириш мумкин. Ҳақиқатан ҳам,
биз олдинги параграфларда исталган функцияни конъюнк-
ция ва инкор мантиқий амаллари орқали ифодалаш мумкин-
литини кўрган эдик. Юқорида конъюнкция, дизъюнкция
ва инкор мантиқий амалларини арифметик амаллар орқали
ифодаладик. Демак, исталган функцияни арифметик кўпҳад
шаклига келтириш мумкин.

1- таъриф. $\sum x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} + a$ кўринишидаги кўпҳад
Жегалкин кўпҳади деб аталади, бу ерда ҳамма x_{i_j} ўзгарувчилар
биринчи даражада қатнашади, (i_1, \dots, i_k) қийматлар сатрида
ҳамма i_j лар ҳар хил бўлади, $a \in E_2 = \{0, 1\}$.

2- таъриф. $x_{i_1} + x_{i_2} + \dots + x_{i_k} + a$ кўринишидаги функция
чизиқли функция деб аталади, бу ерда $a \in E_2 = \{0, 1\}$.

Чизиқли функциянинг ифодасидан кўриниб турибдикি,
 n та аргументли чизиқли функциялар сони 2^{n+1} га teng ва
бир аргументли функциялар доимо чизиқли функция бўлади.

Жегалкин кўпҳади кўринишидаги ҳар бир функциянинг
аргументлари сохта эмас аргументлар бўлади. Ҳақиқатан ҳам,
 x_i шундай аргумент бўлсин. У ҳолда ихтиёрий $f(x_1, \dots, x_n)$
функцияни қуидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \phi(x_2, \dots, x_n) + \psi(x_2, \dots, x_n).$$

Бу ерда ϕ функция айнан 0 га teng эмас, акс ҳолда x_i аргумент
 f функциянинг (кўпҳаднинг) аргументлари сафига қўшил-
масди.

Әнді x_1, \dots, x_n аргументларнинг шундай қийматларини оламизки, $\phi = 1$ бўлсин. У ҳолда f функцияянинг қиймати x , аргументнинг қийматига боғлиқ бўлади. Демак, x , соҳта аргумент эмас.

Мантиқ алгебрасидаги ҳамма n аргументли чизиқли функциялар тўпламини L ҳарфи билан белгилаймиз. Унинг элементларининг сони 2^{n-1} га тенг бўлади.

Теорема. Агар $f(x_1, \dots, x_n) \in L$ бўлса, у ҳолда ундан аргументлари ўрнига 0 ва 1 константаларни ҳамда x ва \bar{x} функцияларни, айрим ҳолда f устига « $-$ » инкор амалини қўйиш усули билан $x_1 x_2$ функцияни ҳосил қилиши мумкин.

16- §. Мантиқ алгебрасидаги монотон функциялар

- Монотон функция.** Қийматлар сатрининг олдин келиши.
Таъриф. Монотон функциялар суперпозицияси. КНШ (ДНШ) кўринишидаги функцияянинг монотон функция бўлиш шарти.

$0 < 1$ муносабати орқали $\{0, 1\}$ тўпламни тартиблаштирамиз.

1-таъриф. $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ва $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ қийматлар сатри бўлсин. Агар $\alpha_i \leq \beta_i$ (χ еч бўлмагандан битта i рақам учун тенгсизлик ишораси бажарлса) ёки α ва β қийматлар сатрлари устма-уст тушса, у ҳолда α қийматлар сатри β қийматлар сатридан олдин келади деб айтамиз ва $\alpha < \beta$ шаклида ёзамиш.

2-таъриф. $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ва $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ ихтиёрий қийматлар сатрлари бўлсин. $\alpha < \beta$ дан $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \leq f(\beta_1, \dots, \beta_n)$ бажарилиши келиб чиқса, у ҳолда $f(x_1, \dots, x_n)$ функция монотон функция деб аталади.

3-таъриф. $\alpha < \beta$ дан $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) > f(\beta_1, \dots, \beta_n)$ муносабат келиб чиқса, у ҳолда $f(x_1, \dots, x_n)$ номонотон функция деб аталади.

Асосий элементар мантиқий функциялардан 0, 1, x , xy , $x \vee y$ функциялар монотон функциялар бўлиб, \bar{x} , $x \rightarrow y$, $x \leftrightarrow y$, $x + y$ функциялар номонотон функциялардир.

1-төрөм. Монотон функцияларнинг суперпозициясидан ҳосил қилинган функция яна монотон функция бўлади.

Исбот. Φ монотон функциялар системаси бўлсин ва шу системадаги функциялар суперпозициясидан ҳосил қилинган функция монотон эканлигини исбот қилиш керак бўлсин. 0 рангли суперпозиция учун бу тасдиқнинг тўғрилиги аниқ, чунки Φ системадаги ҳамма функциялар монотон функциялардир. k рангли суперпозиция учун теоремадаги тасдиқ тўғри бўлсин. Унинг $(k+1)$ рангли суперпозиция учун ҳам тўғрилигини исботлаймиз.

$\phi(x_1, \dots, x_n), \psi(y_1, \dots, y_k) \in \Phi^{(k)}$ бўлсин. У ҳолда

$$\begin{aligned} & \phi(x_1, \dots, x_{i-1}, y, x_{i+1}, \dots, x_k); \\ & F(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k) = \\ & = \phi(x_1, \dots, x_{i-1}, \psi(y_1, \dots, y_k), x_{i+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

функцияларнинг монотон эканлигини исботлаш лозим. Бу ерда y ва y_i лар x_j ўзгарувчиларнинг бирортаси билан мос келиши мумкин. ϕ функциянинг монотонлигидан $\phi(x_1, \dots, x_{i-1}, y, x_{i+1}, \dots, x_k)$ нинг монотон функция эканлиги келиб чиқади. F функциянинг монотонлигини исботлаймиз. Бунинг учун F функциянинг иккита γ' ва γ'' таққосланадиган қийматлар сатрини кўриб чиқамиз:

$$\gamma' = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_{i-1}, \dots, \alpha'_{i+1}, \dots, \alpha'_n, \beta'_1, \dots, \beta'_k);$$

$$\gamma'' = (\alpha''_1, \dots, \alpha''_{i-1}, \dots, \alpha''_{i+1}, \dots, \alpha''_n, \beta''_1, \dots, \beta''_k).$$

$\gamma' \prec \gamma''$ бўлсин. У ҳолда $F(\gamma') \leq F(\gamma'')$ эканлигини кўрсатишмиз керак. Куйидагилар маълум:

$$F(\gamma') = \phi(\delta'), \text{ бу ерда } j=i \text{ бўлганда } \delta'_j = \alpha'_j, \delta'_i = \psi(\beta'_i);$$

$$F(\gamma'') = \phi(\delta''), \text{ бу ерда } j=i \text{ бўлганда } \delta''_j = \alpha''_j, \delta''_i = \psi(\beta''_i).$$

ψ монотон функция ва $\gamma' \prec \gamma''$ дан $\beta' \prec \beta''$ келиб чиқсанлигидан $\delta' \prec \delta''$ бўлади. Яъни $\phi(\delta') = F(\gamma') \leq \phi(\delta'') = F(\gamma'')$, чунки ϕ монотон функциядир.

$\psi(x_1, \dots, x_{i-1}, \dots, y, x_{i+1}, \dots, x_k)F(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n, y_1, \dots, y_l) \in$
жекалитидан $(k+1)$ рангли суперпозиция учун теорема исбот бўлди. Демак, монотон функцияларнинг суперпозициясидан ҳосил қилинган функция яна монотон функциядир.

Конъюнкция ва дизъюнкция монотон функциялар бўлганлиги учун, теоремага асосан, уларнинг суперпозициясидан ҳосил қилинган функция ҳам монотон бўлади.

2-теорема. Агар $f(x_1, \dots, x_n) \in M$ бўлса, у ҳолда ундан аргументлари ўрнига 0, 1 ва x функцияни қўйиш усули билан \bar{x} функцияни ҳосил қилиш мумкин.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Мулоҳазалар алгебрасининг асосий элементар функцияларига икки тарафлама бўлган функцияларни топинг.
2. Ҳамма икки аргументли ўз-ўзига икки тарафлама бўлган функцияларни топинг.
3. n та аргументли ўз-ўзига икки тарафлама бўлган функцияларнинг сонини топинг.
4. $f = (\bar{x} \vee y\bar{z})(xy \vee x\bar{z})$ ва $\phi = (x \vee \bar{y})z\bar{t} \vee \bar{x}t$ функцияларга икки тарафлама бўлган функцияларни топинг.
5. а) $x \rightarrow y \leftrightarrow z$; б) $x \vee y \vee z \vee t$; в) $x \leftrightarrow y \leftrightarrow z$ формулаларни Жегалкин кўпҳади кўринишига келтиринг.
6. Функцияният Жегалкин кўпҳади кўринишидаги ифодаси ягона эканлитини исботланг.
7. Чизиқли функцияларнинг қайси бири ўз-ўзига икки тарафлама функция бўлади?
8. $xy \vee xz \vee yz = xy + xz + yz$ эканлитини исботланг.
9. Куйидаги формулаларни Жегалкин кўпҳади кўринишига келтиринг:

$$x \vee y \vee z; \quad xy \vee yz \vee xz; \quad xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}.$$

10. Жегалкин кўпҳади кўринишидаги функцияният ҳамма аргументлари сохта аргументлар эмаслигини исботланг.

11. Чизиқли функцияларнинг қайси бири монотон функциялар бўлади?
12. Ноль (бир) сақловчи монотон функциялар айнан бирга (нолга) тенг эканлигини исботланг.
13. Икки аргументли ҳамма монотон функцияларни топинг.
14. Куйида келтирилган функцияларнинг қайси бири монотон функция эканлигини аниқланг:
 - a) $xy \vee xz \vee x\bar{z}$; б) $x \rightarrow (x \rightarrow y)$; в) $\overline{x \vee y} \leftrightarrow \bar{x} \vee \bar{y}$;
 - г) $\overline{x \vee y} \leftrightarrow \bar{x}\bar{y}$; д) $xy \vee x \vee \bar{x}z$; е) $xy \vee yz \vee xz$.
15. Айнан константадан (0 ёки 1) фарқ қилувчи функция монотон бўлиши учун уни конъюнкция ва дизъюнкция суперпозицияси орқали ифодалаш етарли ва зарурлигини исботланг.
16. Монотон функцияга икки тарафлама бўлган функция монотон эканлигини исбот қилинг.
17. Фақат ва фақат ёки константалар, ёки ўзгарувчилар устида инкор амали бўлмаган КНШ ва ДНШ кўринишида ифодаланган функциялар монотон бўлишигини кўрсатинг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Икки тарафлама функция ва ўз-ўзига икки тарафлама функция таърифларини келтиринг.
2. Мантиқ алгебрасидаги икки тарафлама қонунни ёзинг.
3. Мантиқ алгебрасидаги арифметик амаллар. Жегалкин кўпҳади.
4. Мантиқ алгебрасидаги монотон функциялар.

17- §. Функционал ёпиқ синфлар ва Пост теоремаси

Тўлиқ функциялар системаси. Икки тарафлама функциялар системасининг тўлиқ бўлиши шарти. Ёпиқ синфлар. Хусусий функционал ёпиқ синф. Максимал функционал ёпиқ синф. Пост теоремаси. Натижса. Тўплам ёпиги. Пост жадвали.

Мантиқ алгебрасининг $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ функциялар системаси берилган бўлсин.

1-таъриф. Агар мантиқ алгебрасининг исталган функцияси $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ системадаги функциялар суперпозицияси орқали ифодалаш мумкин бўлса, у ҳолда Φ тўлиқ функциялар системаси деб аталади.

Исталган функцияни МКНШ ёки МДНШ кўринишида ифодалаш мумкинлигидан $\{xy, x \vee y, \bar{x}\}$ функциялар системасининг тўлиқлиги келиб чиқади. $\{xy, x + y, 1\}$ функциялар системаси ҳам тўлиқ бўлади, чунки исталган функцияни Жегалкин кўпхади кўринишига келтириш мумкин.

Қуйидаги функциялар системасининг тўлиқлигини исботлаймиз:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| а) xy, \bar{x} ; | б) $x \vee y, \bar{x}$; | в) $xy, x + y, 1$; |
| г) $\overline{x \vee y}$; | д) $\bar{x}\bar{y}$; | и) $x + y, x \vee y, 1$; |
| ж) $x + y + z, xy, 0, 1$; | з) $x \rightarrow y, \bar{x}$; | е) $x \rightarrow y, 0$. |

Исбот. а) $x \vee y = \overline{\overline{xy}}$, яъни дизъюнкция амалини конъюнкция ва инкор амаллари орқали ифодалаш мумкин. Демак, $\{xy, \bar{x}\}$ функциялар системаси тўлиқ бўлади;

б) $xy = \overline{\bar{x}\bar{y}} = \overline{\bar{x} \vee \bar{y}}$ эканлиги маълум. Демак, исталган мантиқий функцияни дизъюнкция ва инкор амаллари орқали ифодаласа бўлади. Шунинг учун $\{x \vee y, \bar{x}\}$ функциялар системаси тўлиқдир;

в) мантиқ алгебрасининг ихтиёрий функциясини ягона Жегалкин кўпхади кўринишига келтириш мумкинлигидан $\{xy, x + y, 1\}$ функциялар системасининг тўлиқлиги келиб чиқади;

г) ва д) мантиқ алгебрасидаги исталган функцияни $\psi(x, y) = \overline{xy}$ ва $\phi(x, y) = \overline{x \vee y}$ Шеффер функциялари орқали ифодалаш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, $\bar{x} = \phi(x, x)$,

$$x \vee y = \overline{\overline{x \vee y}} = \overline{\phi(x, y)} = \phi(\phi(x, y), \phi(x, y))$$

ва

$$xy = \phi(\bar{x}, \bar{y}) = \phi(\phi(x, x), \phi(y, y))$$

асосий мантиқий амалларни Шеффер функцияси орқали ифодалаш мумкин. Демак, $\{\bar{xy}\}$ ва $\{x \vee y\}$ функциялар системаси түлиқ бўлади.

и) $x \vee y = xy + x + y$ бўлғанлиги учун $x \vee y + (x + y) = xy$ бўлади. $\{xy, x + y, 1\}$ түлиқ система эканлиги в) бандда исбот қилинган эди, демак, $\{x + y, x \vee y, 1\}$ система түлиқдир.

Худди шундай бошқа функциялар системасининг түлиқлигини исбот қилиш мумкин.

I-теорема. Агар $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ функциялар системаси түлиқ бўлса, у ҳолда унга икки тарафлама бўлган $\Phi^* = \{\phi_1^*, \dots, \phi_n^*\}$ функциялар системаси ҳам түлиқ бўлади.

Исбот. Φ^* системанинг түлиқлигини исботлаш учун исталған $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни Φ системасидаги функциялар суперпозицияси орқали ифодалаш мумкинлигини кўрсатишмиз керак. Бунинг учун аввал f^* функцияни $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ системадаги функциялар орқали ифодалаймиз (Φ система түлиқ бўлғанлиги учун бу процедуруни бажариш мумкин). Кейин икки тарафлама қонунга асосан икки тарафлама функциялар суперпозицияси орқали f функцияни ҳосил қиласиз.

Мисол. Куйидаги функциялар системасининг түлиқ эмаслигини исботлайлик:

- а) $\bar{x}, 1$; б) $xy, x \vee y$; в) $x + y, \bar{x}$;
- г) $xy \vee yz \vee xz, \bar{x}$; д) $xy \vee yz \vee xz, 0, 1$.

а) $\bar{x} = x + 1$ га тент. Демак, $\{\bar{x}, 1\}$ системадаги функциялар бир аргументли функциялар бўлади. Бизга маълумки, бир аргументли функцияларнинг суперпозицияси натижасида ҳосил қилинган функция яна бир аргументли функция бўлади. Натижада, бу системадаги функциялар орқали кўп аргументли функцияларни ифодалаб бўлмайди. Щунинг учун $\{\bar{x}, 1\}$ түлиқ система эмас.

б) $\{xy, x \vee y\}$ системадаги функцияларнинг иккаласи ҳам монотондир. Монотон функцияларнинг суперпозицияси орқали ҳосил қилинган функция яна монотон бўлишини исбот қиласан эдик. Демак, бу иккала функциянинг суперпо-

зиясиси орқали монотон бўлмаган функцияларни ифодалаш мумкин эмас ва натижада, $\{xy, x \vee y\}$ система тўлиқмас система бўлади.

в) $\{x + y, \bar{x}\}$ системадаги функциялар чизиқли функциялардир. Шунинг учун бу функциялар орқали чизиқлимас функцияларни ифодалаб бўлмайди. Демак, $\{x + y, \bar{x}\}$ функциялар системаси тўлиқ эмас.

г) $\{xy \vee yz \vee xz, \bar{x}\}$ системадаги функциялар ўз-ўзига икки тарафлама функциялардир. Бу функцияларнинг суперпозициясидан ҳосил қилинган ҳар қандай функция ҳам ўз-ўзига икки тарафлама функция бўлади. Демак, $\{xy \vee yz \vee xz, \bar{x}\}$ функциялар системаси тўлиқ эмас.

д) $\{xy \vee yz \vee xz, 0, 1\}$ системадаги функцияларнинг ҳаммаси монотон функциялар бўлади. Монотон эмас функциялар бу системадаги функциялар орқали ифодаланмайди. Демак, $\{xy \vee yz \vee xz, 0, 1\}$ система тўлиқ эмас.

Шундай қилиб, юқорида келтирилган масала ечимининг анализидан қуидаги холоса келиб чиқади.

Берилган Φ функциялар системасининг тўлиқ эмаслигини исботлаш учун системадаги функцияларнинг шундай умумий хусусиятини топиш керакки, бу хусусият функциялар суперпозицияси натижасида сақлансан.

Ҳақиқатан ҳам, у вақтда бундай хусусиятга эга бўлмаган функцияни Φ системадаги функциялар суперпозицияси орқали ҳосил қилиб бўлмайди.

Функцияларнинг бу маълум хусусиятларини текшириш учун одатда функционал ёниң синфлар тушунчасидан фойдаланилади.

2-таъриф. Агар A системадаги функциялар суперпозициясидан ҳосил бўлган функция яна шу системанинг элементи бўлса, у ҳолда бундай система суперпозицияга нисбатан ёниқ системадеб аталади.

3-таъриф. Мантиқ алгебрасининг суперпозицияга нисбатан ёниқ бўлган ҳар қандай функциялар системаси функционал ёниқ синф деб аталади.

Равшанки, маълум бир хил хусусиятга эга бўлган функциялар системаси функционал ёпиқ синфни ташкил этади ва, аксинча, маълум функционал ёпиқ синфга кирувчи функциялар бир хил хусусиятга эга бўлган функциялардир. Куйидаги функциялар системаси функционал ёпиқ синфларга мисол бўла олади:

- а) бир аргументли функциялар;
- б) мантиқ алгебрасининг ҳамма функциялари;
- в) L – чизиқли функциялар;
- г) S – ўз-ўзига икки тарафлама функциялар;
- д) M – монотон функциялар;
- е) P_0 – ноль қийматни сақловчи функциялар;
- ж) P_1 – бир қийматни сақловчи функциялар.

4-таъриф. *Бўш синфдан ва мантиқ алгебрасининг ҳамма функциялари тўпламидан фарқ қилувчи функционал ёпиқ синф хусусий функционал ёпиқ синф деб аталади.*

Шундай қилиб, функциялар системасининг тўлиқ бўлишилиги учун бу системада ҳар қандай хусусий функционал ёпиқ синфга кирмайдиган функция топилиши етарли ва зарурдир.

5-таъриф. *Ўз-ўзидан ва мантиқ алгебрасининг ҳамма функциялари синфи (P_2) дан фарқ қилувчи функционал ёпиқ синфларга кирмайдиган хусусий функционал ёпиқ синф максимал функционал ёпиқ синф деб аталади.*

Мантиқ алгебрасида ҳаммаси бўлиб бешта максимал функционал ёпиқ синф мавжуд:

P_0 – ноль сақловчи функциялар синфи, P_1 – бир сақловчи функциялар синфи, M – монотон функциялар синфи, S – ўз-ўзига икки тарафлама функциялар синфи, L – чизиқли функциялар синфи.

Пост теоремаси. $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ функциялар системаси тўлиқ бўлишилиги учун бу системада P_0, P_1, M, S, L максимал функционал ёпиқ синфларнинг ҳар бирига кирмайдиган камида битта функция мавжуд бўлиши етарли ва зарур

(яъни $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ система P_0, P_1, M, S, L максимал функционал ёпиқ синфларнинг бирортасининг ҳам қисм тўплами бўлмагандга ва фақат шундагина тўлиқ система бўлади).

Исбот. $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ тўлиқ система бўлсин, яъни $[\Phi] = P_2$. Фараз қиласизки, Φ максимал функционал ёпиқ синфларнинг бирортаси. У вақтда F нинг ёпиқлигини хисобга олиб, $P_2[\Phi] \subseteq [F] = F$ ни ёзиш мумкин, яъни $F = P_2$. Аммо бундай бўлиши мумкин эмас. Демак, $\Phi \subseteq F$ муносабат бажарилмайди.

Теореманинг етарлилиги исботини ўқувчиларга ҳавола этамиш.

Натижা. Мантиқ алгебрасидаги ҳар қандай функционал ёпиқ синф P_0, P_1, M, S, L максимал функционал ёпиқ синфларнинг бирортасининг қисм тўплами бўлади.

Амалда бирорта $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ системанинг тўлиқ ёки тўлиқ эмаслигини аниқлаш учун Пост жадвалидан фойдаланилади. Пост жадвали қуйидаги кўринишда бўлади:

	P_0	P_1	S	L	M
φ_1					
φ_2					
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots
φ_{n-1}					
φ_n					

Жадвалнинг хоналарига ўша сатрдаги функция функционал ёпиқ синфларнинг элементи бўлса «+» ишора, бўлмаса «-» ишораси қўйилади.

$\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ система тўлиқ функциялар системаси бўлиши учун, теоремага асоссан, жадвалнинг ҳар бир устунида камида битта «-» ишораси бўлиши етарли ва зарур.

$\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ функциялар системаси тўлиқ бўлмаслиги учун P_0, P_1, M, S, L максимал функционал ёпиқ синфлар-

нинг бирортасининг қисм тўплами бўлиши, яъни Пост жадвалининг бирор устуни тўлиқ «+» ишораларидан иборат бўлиши керак.

Функциялар системасининг тўлиқлиги тушунчаси билан синфнинг (тўпламнинг) ёниги тушунчаси ўзаро боелангандан.

6-таъриф. A билан P_2 (мантиқ алгебрасининг натижада аргументли ҳамма функцияларини ўз ичига олган) тўпламнинг бирор қисм тўпламини белгилаймиз. A тўплам функцияларининг суперпозициясидан ҳосия қилинган ҳамма буль функциялари тўплами (A тўплам функциялари орқали ифодаланган ҳамма буль функциялари тўплами) A тўпламнинг ёниги деб аталади ва $[A]$ каби белгиланади.

Мисоллар. 1. $A = P_2$, бўлсин, у ҳолда $[A] = P_2$.

2. $A = \{1, x_1 + x_2\}$ бўлсин, у ҳолда A тўпламнинг ёниги ҳамма L – чизикли функциялар тўпламидан иборат бўлади.

Тўплам ёниги қўйидаги хоссаларга эга:

1) $[A] \supseteq A$;

2) $[[A]] = [A]$;

3) агар $A_1 \subseteq A_2$ бўлса, у ҳолда $[A_1] \subseteq [A_2]$ бўлади;

4) $[A_1 \cup A_2] \supseteq [A_1] \cup [A_2]$.

7-таъриф. Агар $[A] = A$ бўлса, у ҳолда A тўплам (синф) функционал ёпиқ синф деб аталади.

Мисоллар. 1. $A = P_2$ синф ёпиқ синф бўлади.

2. $A = \{1, x_1 + x_2\}$ синфи ёпиқ синф бўлмайди.

3. L синф ёпиқ синф бўлади.

Осонгина кўриш мумкинки, ҳар қандай $[A]$ синф ёпиқ синф бўлади. Бу ҳол кўптина функционал ёпиқ синфларни топишга ёрдам беради.

Тўплам ёниги ва ёпиқ синф тилида функциялар системасининг тўлиқлиги ҳақидаги таъриф (аввалги таърифга эквивалент бўлган таъриф) ни бериш мумкин.

8-таъриф. Агар $[A] = P_2$ бўлса, у ҳолда A функциялар системаси тўлиқ деб аталади.

Мисол. Күйидаги функциялар системаларининг тўлиқ эмаслигини Пост жадвали орқали исбот қиласлийк:

- а) $\Phi_1 = \{0, xy, x + y + z\}$; б) $\Phi_2 = \{1, xy, x + y + z\}$;
 в) $\Phi_3 = \{\bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{z}\}$; г) $\Phi_4 = \{0, 1, x + y\}$;
 д) $\Phi_5 = \{0, 1, xy\}$.

		P_0	P_1	S	L	M
а)	0	+	-	-	+	+
	xy	+	+	-	-	+
	$x+y+z$	+	+	+	+	-
б)	1	-	+	-	+	+
	xy	+	+	-	-	+
	$x+y+z$	+	+	+	+	-
в)	$\bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{z}$	-	-	+	-	-
г)	0	+	-	-	+	+
	1	-	+	-	+	+
	$x+y$	+	-	-	+	-
д)	0	+	-	-	+	+
	1	-	+	-	+	+
	xy	+	+	-	-	+

Жадвалдан кўриниб турибдики, юқорида келтирилган ҳамма функциялар системаси тўлиқ эмас, чунки ҳар бир система учун жадвалда битта устун фақаттинга «+» ишораларидан иборат. Шуни таъкидлашимиз керакки, ҳар бир система учун бу устунлар ҳар хил. Демак, Пост теоремаси шартидан P_0, P_1, M, S, L максимал функционал ёпиқ синфларнинг бирортасини ҳам олиб ташлаш мумкин эмас. Бу хуносадан ўз навбатида P_0, P_1, S, L, M максимал функционал ёпиқ синфларнинг бирортаси иккинчисининг қисм тўплами бўла олмаслиги келиб чиқади.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Куйидаги функциялар системаси функционал ёпиқ синфлар бўлишини исбот қилинг:
 - а) бир аргументли функциялар;
 - б) ҳамма мантиқ алгебрасининг функциялари;
 - в) L – чизиқли функциялар;
 - г) S – ўз-ўзига икки тарафлама функциялар;
 - д) M – монотон функциялар;
 - е) P_0 – ноль қийматни сақловчи функциялар;
 - ж) P_1 – бир қийматни сақловчи функциялар.
2. Агар $\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ ва $F = (f_1, \dots, f_n)$ функционал ёпиқ синфлар бўлса, у ҳолда $\Phi \cap F$ ва $\Phi' = \{\phi'_1, \dots, \phi'_n\}$ лар ҳам функционал ёпиқ синфлар бўлишини ва $\Phi \cup F$ нинг функционал ёпиқ синф бўлмаслигини исботланг.
3. Куйидаги максимал функционал ёпиқ P_0, P_1, S, L, M синфларнинг бирортаси иккинчисининг қисем тўплами бўлмаслигини исботланг.
4. Ҳар қандай шахсий функционал ёпиқ синф P_0, P_1, S, L, M максимал функционал ёпиқ синфларнинг бирортасининг қисем тўплами эканлигини исботланг.
5. Ноль сақламовчи функция номонотон функция ёки ўз-ўзига икки тарафлама бўлмаган функция эканлигини исботланг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Тўлиқ функциялар системаси.
2. Функционал ёпиқ синфлар ва хусусий функционал ёпиқ синфлар.
3. Максимал функционал ёпиқ синф ва Пост теоремаси.
4. Тўплам ёпиги ва Пост жадвали.

Мулоҳазалар ҳисоби аксиоматик мантиқий система бўлиб, мулоҳазалар алгебраси эса унинг интерпретациясидир (талқинидир).

Берилган аксиомалар системаси негизида (базасида) қурилган аксиоматик назария деб, шу аксиомалар системасига таяниб исботланувчи ҳамма теоремалар мажмуасига айтилади.

Аксиоматик назария формал ва формалмас назарияларга бўлинади.

Формалмас аксиоматик назария назарий-тўпламий мазмун билан тўлдирилган бўлиб, келтириб чиқариш тушунчаси аниқ берилмаган ва бу назария асосан фикр мазмунига суюнади.

Қаралаётган аксиоматик назария учун қуйидаги шартлар бажарилган бўлса, яъни:

- 1) назариянинг тили берилган;
- 2) формула тушунчаси аниқланган;
- 3) аксиомалар деб аталадиган формулалар тўплами берилган;
- 4) бу назарияда келтириб чиқариш қоидаси аниқланган бўлса, формал аксиоматик назария аниқланган деб ҳисобланади.

Куйида мулоҳазалар ҳисобининг символлари, формуласи, аксиомалар системаси, келтириб чиқариш қоидалари, формулалар мажмуасидан формулани келтириб чиқариш қоидаси, дедукция ва умумлашган дедукция теоремалари, айrim мантиқ қонунларининг исботи, мулоҳазалар алгебраси ва мулоҳазалар ҳисоби ўртасидаги муносабатлар, мулоҳазалар ҳисобида ечилиш, зидсизлик, тўлиқлилик ва эркинлик муаммолари каби масалалар баён этилади.

1- §. Мулоҳазалар ҳисоби формуласи тушунчаси

Мулоҳазалар ҳисоби. Мантиқий боғловчилар. Символлар. Формула. Қисмий формула.

Ҳар қандай ҳисобнинг тавсифи бу ҳисобнинг символлари тавсифидан, формулалар ва келтириб чиқариш формулалари таърифидан иборат.

Мулоҳазалар ҳисобида уч категорияли символлардан иборат алфавит қабул қилинади:

Биринчи категория символлари: $x, y, z, \dots, x_1, x_2, \dots$. Бу символларни ўзгарувчилар деб атаемиз.

Иккинчи категория символлари: $\vee, \wedge, \rightarrow, \neg$. Булар мантиқий боғловчилардир. Биринчиси – дизъюнкция ёки мантиқий кўшиш белгиси, иккинчиси – конъюнкция ёки мантиқий кўпайтма белгиси, учинчиси – импликация белгиси ва тўртингчиси – инкор белгиси деб аталади.

Учинчи категорияга қавс деб аталадиган (,) символ киритилади.

Мулоҳазалар ҳисобида бошқа символлар йўқ.

Мулоҳазалар ҳисобининг формуласи деб мулоҳазалар ҳисоби алфавити символларининг маълум бир кетма-кетлигига айтилади.

Формулаларни белгилаш учун лотин алфавитининг бош ҳарфларидан фойдаланамиз. Бу ҳарфлар мулоҳазалар ҳисобининг символлари қаторига кирмайди. Улар фақатгина формулаларнинг шартли белгилари бўлиб хизмат қиласди.

Энди формула тушунчаси таърифини берайлик. Бу тушунча қуйидагича аниқланади:

1) ҳар қандай x, y, z, \dots ўзгарувчиларнинг исталган бири формуладир;

2) агар A ва B нинг ҳар бири формула бўлса, у ҳолда $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ ва $\neg A$ ҳам формуладир;

3) бошқа ҳеч қандай символлар сатри формула бўла олмайди.

Ўзгарувчиларни элементар формулалар деб атайдиз.

Мисол. Формула таърифининг 1- бандига кўра x, y, z, \dots ўзгарувчилар формула бўлади. У вақтда таърифнинг 2- бандига мувофиқ $(x \wedge y), (x \vee y), (x \rightarrow y), \bar{x}$ лар ҳам формулалардир. Худди шу тариқада $(x \vee y), ((x \wedge y) \rightarrow z)$, $((x \wedge y) \rightarrow (y \rightarrow z))$ ҳам формулалар бўлади.

Куйидагилар формула бўла олмаслигини тушунтиринг:

$$\bar{x} \bar{y}, \wedge z, x \vee y, x \rightarrow y, (x \wedge y) \rightarrow \bar{x}.$$

Қисмий формула тушунчасини киритамиз:

1. Элементар формула учун фақат унинг ўзи қисмий формуладир.

2. Агар \bar{A} формула бўлса, у ҳолда шу формуланинг ўзи, A формула ва A формуланинг ҳамма қисмий формулалари унинг қисмий формулалари бўлади.

3. Агар формула $A * B$ кўринишда бўлса (бу ерда ва бундан кейин * ўрнида $\vee, \wedge, \rightarrow$ символларининг исталганини тушунамиз), у ҳолда шу формуланинг ўзи, A ва B формулалар ҳамда A ва B формулаларнинг барча қисмий формулалари $A * B$ формуланинг қисмий формулалари бўлади. Масалан, $((x \vee \bar{y}) \rightarrow (\bar{z} \rightarrow y))$ формула учун:

$((x \vee \bar{y}) \rightarrow (\bar{z} \rightarrow y))$ – нолинчи чуқурликдаги қисмий формула;

$(x \vee \bar{y}), (\bar{z} \rightarrow y)$ – биринчи чуқурликдаги қисмий формулалар;

$x, \bar{y}, (\bar{z} \rightarrow y)$ – иккинчи чуқурликдаги қисмий формулалар;

y, \bar{z} – учинчи чуқурликдаги қисмий формулалар;

z – тўртинчи чуқурликдаги қисмий формула бўлади.

Формулаларни ёзишда айрим соддалаштиришларни қабул қиласиз. Худди мулоҳазалар алгебрасидаги каби формулалар ёзувидаги қавсларни тушириб қолдиришга кели-

шамиз. Бу келишувга биноан $((x \vee y) \wedge z)$, $(\overline{x \wedge y})$, $((x \wedge y) \rightarrow (z \wedge t))$ формулаларни мос равища $x \vee y \wedge z$, $\overline{x \wedge y}$, $x \wedge y \rightarrow z \wedge t$ кўришида ёзамиш.

2- §. Использованные формулы таърифи. Мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалар системаси (тизими). Келтириб чиқариш қоидалари

- Использованные формулы. Аксиома. Келтириб чиқариш қоидаси. Ўрнига қўйиш қоидаси. Холоса қоидаси. Аксиомалар тизими. Использование.

Энди мулоҳазалар ҳисобида использованные формулы синфини ажратамиз. Использованные формулы формулалар таърифига ўхшаш характерда таърифланади. Аввал дастлабки использованные формулы (аксиомалар), ундан кейин эса келтириб чиқариш қоидаси аниқланади. Келтириб чиқариш қоидаси орқали бор использованные формулы формулалардан янги использованные формулы ҳосил қилинади.

Дастлабки использованные формулы формулалардан келтириб чиқариш қоидасини қўллаш йўли билан янги использованные формулы формулаларни ҳосил қилиш шу формулы формулаларни *аксиомалардан келтириб чиқариши* деб аталади.

2.1. Мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалар системаси (тизими). Мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалар тизими 11 аксиомадан иборат бўлиб, булар тўрт гурӯҳга бўлинади.

Биринчи гурӯҳ аксиомалари:

$$I_1 \quad x \rightarrow (y \rightarrow x).$$

$$I_2 \quad (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)).$$

Иккинчи гурӯҳ аксиомалари:

$$II_1 \quad x \wedge y \rightarrow x.$$

$$II_2 \quad x \wedge y \rightarrow y.$$

$$II_3 \quad (z \rightarrow x) \rightarrow ((z \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow x \wedge y)).$$

Учинчи гурӯҳ аксиомалари:

$$\text{III}_1 \quad x \rightarrow x \vee y.$$

$$\text{III}_2 \quad y \rightarrow x \vee y.$$

$$\text{III}_3 \quad (x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)).$$

Тӯртинчи гурӯҳ аксиомалари:

$$\text{IV}_1 \quad (x \rightarrow y) \rightarrow (\bar{y} \rightarrow \bar{x}).$$

$$\text{IV}_2 \quad x \rightarrow \bar{\bar{x}}.$$

$$\text{IV}_3 \quad \bar{\bar{x}} \rightarrow x.$$

2.2. Келтириб чиқариш қоидаси.

2.2.1. Ўрнига қўйиш қоидаси. Агар A муроҳазалар ҳисобининг использование формуласи, x ўзгарувчи, B муроҳазалар ҳисобининг ихтиёрий формуласи бўлса, у ҳолда A формула ифодасидаги ҳамма x лар ўрнига B formulани қўйиш натижасида ҳосил қилинган формула ҳам использование формула бўлади.

A формуладаги x ўзгарувчилар ўрнига B formulани қўйиш операцияси (жараёни)ни ўрнига қўйиш қоидаси деб айтамиш ва уни қўйидаги символ билан белгилаймиз:

$$\int_x^B(A).$$

Зикр этилган қоидага қўйидаги аниқликларни киритамиз:

а) агар A фақат x ўзгарувчидан иборат бўлса, у ҳолда

$\int_x^B(A)$ ўрнига қўйиш B formulани беради;

б) агар A формула x дан фарқли у ўзгарувчидан иборат

бўлса, у ҳолда $\int_x^B(A)$ ўрнига қўйиш A ни беради;

в) агар A ўрнига қўйиш аниқланган формула бўлса, у ҳолда \bar{A} формуладаги x ўрнига B formulани қўйиш нати-

жасида ўрнига қўйишнинг инкори келиб чиқади, яъни $\int_x^B (\bar{A})$ ўрнига қўйиш $\int_x^B A$ ни беради;

г) агар A_1 ва A_2 формулаларда ўрнига қўйиш аниқланган бўлса, у ҳолда $\int_x^B (A_1 * A_2)$ ўрнига қўйиш $\int_x^B (A_1) * \int_x^B (A_2)$ ни беради.

Агар A исботланувчи формула бўлса, уни $\vdash A$ шаклда ёзишга келишамиз. У ҳолда ўрнига қўйиш қоидасини қуидагича схематик равища ифодалаш мумкин:

$$\frac{\vdash A}{\vdash \int_x^B (A)}$$

ва уни «агар A исботланувчи формула бўлса, у ҳолда $\int_x^B (A)$ ҳам исботланувчи формула бўлади» деб ўқилади.

2.2.2. Хулоса қоидаси. Агар A ва $A \rightarrow B$ мулоҳазалар ҳисобининг исботланувчи формулалари бўлса, у ҳолда B ҳам исботланувчи формула бўлади. Бу қоида қуидагича схематик равища ёзилади:

$$\frac{\vdash A; \vdash A \rightarrow B}{\vdash B}.$$

2.2.3. Исботланувчи формуланинг таърифи.

- Ҳар қандай аксиома исботланувчи формуладир;
- исботланувчи формуладаги x ўзгарувчи ўрнига ихтиёрий B формулани қўйиш натижасида ҳосил бўлган формула исботланувчи формула бўлади;
- A ва $A \rightarrow B$ исботланувчи формулалардан хулоса қоидасини қўллаш натижасида олинган B формула исботланувчи формуладир;
- мулоҳазалар ҳисобининг бошқа ҳеч қандай формуласи исботланувчи деб саналмайди.

Таъриф. Использование формулой χ осил қилиш процесси (жараёни) испот қилиш (использование) деб аталади.

1-мисол. $\vdash A \rightarrow A$ эканлиги (импликациянинг рефлексивлигиги) использованисин.

Импликациянинг рефлексивлигини испотлаш учун ушбу

$$\vdash (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)) - I_2$$

аксиомадан фойдаланамиз. Бу ерда $\int_z^x (I_2)$ ўрнига қўйишни бажариш натижасида

$$\vdash (x \rightarrow (y \rightarrow x)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow x)) \quad (1)$$

келиб чиқади. $\vdash (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)) - I_2$ аксиома ва (1) формулага хulosса қоидасини қўллаб

$$\vdash (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow x) \quad (2)$$

формулани ҳосил қиласиз. (2) формулага ушбу

$$\int_y^{\bar{x}} (2)$$

ўрнига қўйишни бажариш натижасида

$$\vdash (x \rightarrow \bar{x}) \rightarrow (x \rightarrow x) \quad (3)$$

использование формулага эга бўламиз. $x \rightarrow \bar{x} - IV_2$ аксиома ва (3) формулага нисбатан хulosса қоидасини қўллаш натижасида

$$\vdash x \rightarrow x \quad (4)$$

использование формулага келамиз. Ниҳоят, (4) формуладаги x ўзгарувчи ўрнига A формулани қўйсак,

$$\vdash A \rightarrow A$$

использованиши керак бўлган формула ҳосил бўлади.

2-мисол. $\vdash \overline{x \vee y} \rightarrow \bar{x} \wedge \bar{y}$ эканлигини исботланг.

$(z \rightarrow x) \rightarrow ((z \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow x \wedge y))$ – II₃ аксиомага нисбатан кетма-кет икки марта ўрнига қўйиш усулини қўллаймиз: аввал x ни \bar{x} га ва кейин y ни \bar{y} га алмаштирамиз. Натижада қўйидаги исботланувчи формулага эга бўламиз:

$$\vdash (z \rightarrow \bar{x}) \rightarrow ((z \rightarrow \bar{y}) \rightarrow (z \rightarrow \bar{x} \wedge \bar{y})). \quad (5)$$

(5) формулага нисбатан $\int_{\bar{y}}^{\bar{x \vee y}}$ ўрнига қўйишни бажарив, қўйидагини ҳосил қиласмиз:

$$\vdash ((\overline{x \vee y}) \rightarrow \bar{x}) \rightarrow ((\overline{x \vee y}) \rightarrow \bar{y}) \rightarrow (\overline{x \vee y} \rightarrow \bar{x} \wedge \bar{y}). \quad (5.a)$$

Энди

$$\overline{x \vee y} \rightarrow \bar{x}, \quad (6)$$

$$\overline{x \vee y} \rightarrow \bar{y} \quad (7)$$

формулаларнинг исботланувчи эканлигини кўрсатамиз. Бунинг учун $(x \rightarrow y) \rightarrow (\bar{y} \rightarrow \bar{x})$ – IV₁ аксиомага нисбатан

$$\int_y^{x \vee y} (\text{IV}_1)$$

ўрнига қўйишни бажарамиз. Натижада

$$\vdash (x \rightarrow x \vee y) \rightarrow (\overline{x \vee y} \rightarrow \bar{x}) \quad (8)$$

формулага эга бўламиз. (8) формула ва $x \rightarrow x \vee y$ – III₁ аксиомага нисбатан хulosса қоидасини ишлатиб, (6) нинг исботланувчи формула эканлигига ишонч ҳосил қиласмиз. Худди шу каби (7) нинг ҳам исботланувчи формула эканлигини кўрсатиш мумкин.

(6) ва (5) формулаларга хulosса қоидасини қўлласак,

$$\vdash (\overline{x \vee y} \rightarrow \bar{y}) \rightarrow (\overline{x \vee y} \rightarrow \bar{x} \wedge \bar{y}) \quad (9)$$

исботланувчи формула келиб чиқади.

(7) ва (9) формулаларга хulosса қоидасини кўллаб,

$$\vdash \overline{x \vee y} \rightarrow \bar{x} \wedge \bar{y}$$

дастлабки формуланинг исботланувчи эканлигини ҳосил қиласиз.

3- §. Келтириб чиқариш қоидасининг ҳосилалари

- Ҳосилавий қоидалар.** Бир вақтда ўрнига қўйиш қоидаси. Мураккаб хulosса қоидаси. Силлогизм қоидаси. Контрпозиция қоидаси. Икки марталик инкорни тушириш қоидаси.

Хulosса ва ўрнига қўйиш қоидалари сингари келтириб чиқариш қоидасининг ҳосилалари ҳам янги исботланувчи формулалар ҳосил қилишга имкон яратади.

3.1. Бир вақтда ўрнига қўйиш қоидаси.

Таъриф. Агар $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – исботланувчи формула ва B_1, B_2, \dots, B_n мулоҳазалар ҳисобининг ихтиёрий формулалари бўлса, у ҳолда A формуланинг x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчилари ўрнига бир вақтда мос равишда B_1, B_2, \dots, B_n формулаларни қўйиш натижасида С исботланувчи формулани ҳосил қилиши бир вақтда ўрнига қўйиш қоидаси деб аталади.

z_1, z_2, \dots, z_n лар A, B_1, B_2, \dots, B_n формулалардаги бошқа ўзгарувчилардан фарқ қиливчи ўзгарувчилар ва $z_i \neq z_j$ ($i, j = \overline{1, n}$) бўлсин. У ҳолда A формулада n та кетма-кет ўрнига қўйишни бажарамиз: аввал x_1 ўрнига z_1 ни, кейин x_2 ўрнига z_2 ни ва ҳоказо x_n ўрнига z_n ни қўямиз. Натижада қуйидаги исботланувчи формулаларга эга бўламиз: $\vdash \int_{x_1}^{z_1}(A)$ ўрнига қўйиш $\vdash A_1$ ни, $\vdash \int_{x_2}^{z_2}(A_1)$ ўрнига қўйиш $\vdash A_2$ ни, ..., $\vdash \int_{x_n}^{z_n}(A_{n-1})$ ўрнига қўйиш $\vdash A_n$ ни беради.

Бундан кейин A_n формулага нисбатан яна n та кетма-кет ўрнига қўйишни бажарамиз: аввал x_1 ўрнига B_1 ни, кейин x_2 ўрнига B_2 ни ва ҳоказо x_n ўрнига B_n ни қўйиб чиқамиз.

Бунинг натижасида $\vdash \int_{z_1}^{B_1}(A_n)$ ўрнига қўйишдан $\vdash C_1$ ни,

$\vdash \int_{z_2}^{B_2}(C_1)$ ўрнига қўйишдан $\vdash C_2$ ни, ..., $\vdash \int_{z_n}^{B_n}(C_{n-1})$ ўрнига

қўйишдан $\vdash C_n$ ни ҳосил қиласиз. Демак, C_n исботланувчи формула A формуладаги x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчилар ўрнига бир вақтда мос равишда B_1, B_2, \dots, B_n формулаларни қўйиш натижасида ҳосил бўлади.

Бир вақтда ўрнига қўйиш операция (қоида)сини қуидагича ифодалаймиз:

$$\frac{\vdash A}{\vdash \int_{x_1, x_2, \dots, x_n}^{B_1, B_2, \dots, B_n}(A)} . \quad (1)$$

3.2. Мураккаб хulosса қоидаси. Бу қоидада

$$\vdash A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots)))$$

кўринишдаги формулаларга нисбатан иккинчи ҳосилавий қоида ишлатилади ва уни қуидаги тасдиқ орқали изоҳлаш мумкин.

1-теорема. Агар A_1, A_2, \dots, A_n лар ва

$$A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots))) \quad (2)$$

исботланувчи формулалар бўлса, у ҳолда L ҳам исботланувчи формула бўлади.

Исбот. Теоремани хulosса қоидасини кетма-кет қўллаш орқали исботлаш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, агар A_1 ва (2) исботланувчи формулалар бўлса, у ҳолда хulosса қоидасига асосан

$$A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots)) \quad (3)$$

ҳам исботланувчи формула бўлади. A_2 ва (3) исботланувчи формула бўлганлиги учун

$$A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots) \quad (4)$$

формула ҳам исботланувчи бўлади. Худди шундай муҳокамани давом эттириб, охири L нинг исботланувчи формула эканлигига ишонч ҳосил қиласиз.

Мураккаб хulosса қоидасини схематик равищада қуидагича ёзиш мумкин:

$$\frac{\vdash A_1, \vdash A_2, \dots, \vdash A_n, \vdash A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (A_3 \rightarrow (\dots (A_n \rightarrow L) \dots)))}{\vdash L} \quad (5)$$

3.3. Силлогизм қоидаси.

2- теорема. Агар $A \rightarrow B$ ва $B \rightarrow C$ исботланувчи формуласар бўлса, у ҳолда $A \rightarrow C$ формула ҳам исботланувчи бўлади.

Исбот. Теоремани схематик равищада қуидагича ёзамиш:

$$\frac{\vdash A \rightarrow B, \vdash B \rightarrow C}{\vdash A \rightarrow C}. \quad (6)$$

$x \rightarrow (y \rightarrow x) = I_1$ ва $x \rightarrow (y \rightarrow z) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)) = I_2$ аксиомаларга нисбатан қуидаги

$$\frac{\begin{array}{c} A, B, C \\ \int(I_2) \end{array}}{x, y, z} \quad \text{ва} \quad \frac{\begin{array}{c} B \rightarrow C, A \\ \int(I_1) \end{array}}{x, y}$$

бир вақтда ўрнига қўйиш қоидаларини қўллаш натижасида ушбу исботланувчи формулаларни ҳосил қиласиз:

$$\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)), \quad (7)$$

$$\vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C)). \quad (8)$$

Теореманинг шартига асосан

$$\vdash A \rightarrow B, \quad (9)$$

$$\vdash B \rightarrow C \quad (10)$$

формулалар исботланувчилир. (10) ва (8) дан хulosса қоидасига асосан

$$\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C) \quad (11)$$

формулани ҳосил қиласиз. У вақтда (11), (9) ва (7) дан мураккаб холоса қоидасига асосан $\vdash A \rightarrow C$ эканлиги келиб чиқади.

Агар $A \rightarrow B$ ва $B \rightarrow C$ исботланувчи формулалар бўлса, у ҳолда $A \rightarrow C$ ҳам исботланувчи формула бўлишини *силлогизм қоидаси* деб атаймиз.

3.4. Контрпозиция қоидаси.

3-теорема. Агар $A \rightarrow B$ исботланувчи формула бўлса, у ҳолда $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$ ҳам исботланувчи формула, яъни

$$\frac{\vdash A \rightarrow B}{\vdash \bar{B} \rightarrow \bar{A}} \quad (12)$$

бўлади.

Исбот. $(x \rightarrow y) \rightarrow (\bar{y} \rightarrow \bar{x})$ – IV₁ аксиомага нисбатан бир вақтда ўрнига қўйиш қоидаси

$$\int_{x,y}^{A,B} (\text{IV}_1)$$

ни қўллаб,

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow \bar{A}) \quad (13)$$

исботланувчи формулани ҳосил қиласиз. Теореманинг шартига асосан

$$\vdash A \rightarrow B \quad (14)$$

исботланувчи формуладир. Шунинг учун (14) ва (13) дан холоса қоидасига асосан $\vdash (\bar{B} \rightarrow \bar{A})$ исботланувчи формула эканлиги келиб чиқади.

Агар $A \rightarrow B$ исботланувчи формула бўлса, у ҳолда $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$ ҳам исботланувчи формула бўлишини *контрпозиция қоидаси* деб атаймиз.

3.5. Икки карралик инкорни түшириш қоидаси.

4-теорема. 1) Агар $A \rightarrow \bar{\bar{B}}$ исботланувчи формула бўлса, у ҳолда $A \rightarrow B$ ҳам исботланувчи бўлади;

2) агар $\bar{\bar{A}} \rightarrow B$ исботланувчи формула бўлса, у ҳолда $A \rightarrow B$ формула ҳам исботланувчи, яъни

$$\vdash A \rightarrow \bar{\bar{B}} \quad \text{ва} \quad \vdash \bar{\bar{A}} \rightarrow B \quad (15)$$

бўлади.

Исбот. $x \rightarrow \bar{x}$ – IV₂ ва $\bar{x} \rightarrow x$ – IV₃ аксиомаларга нисбатан ушбу

$$\int_x^A (\text{IV}_2) \quad \text{ва} \quad \int_x^B (\text{IV}_3)$$

ўрнига кўйиш қоидаларини қўллаб,

$$\vdash A \rightarrow \bar{\bar{A}}, \quad (16)$$

$$\vdash \bar{\bar{B}} \rightarrow B \quad (17)$$

исботланувчи формулаларни ҳосил қиласиз. Теореманинг 1- ва 2- шартларига асосан

$$\vdash A \rightarrow \bar{\bar{B}}, \quad (18)$$

$$\vdash \bar{\bar{A}} \rightarrow B \quad (19)$$

формулалар исботланувчидир.

Агар теореманинг 1-шарти бажарилса, у ҳолда (17) ва (18) формулалардан силлогизм қоидасига асосан $\vdash A \rightarrow B$ келиб чиқади.

Агар 2- шарти бажарилса, у ҳолда (16) ва (19) формулалардан $\vdash A \rightarrow B$ ни келтириб чиқарамиз.

Агар $A \rightarrow \bar{\bar{B}}$ ($\bar{\bar{A}} \rightarrow B$) исботланувчи формула бўлса, у ҳолда $A \rightarrow B$ ҳам исботланувчи формула бўлишини икки марталик инкорни түшириш қоидаси деб атаемиз.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Қўйидаги ифодаларнинг қайси бири мuloҳазалар ҳисобининг формулалари бўлади:

- 1) $(\bar{p}_1 \wedge \bar{p}_2) \rightarrow (p_1 \vee p_2)$;
- 2) $((p_1 \vee p_2) \vee (p_1 p_2)) \rightarrow \bar{p}_3$;
- 3) $(p_1 \rightarrow (p_2 \vee p_3)) \rightarrow p_3$;
- 4) $(p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow ((p_1 \rightarrow \bar{p}_2) \rightarrow p_1)$;
- 5) $(p_1 \wedge (\rightarrow p_2) \rightarrow (p_2 \rightarrow \bar{p}_1)$;
- 6) $(p_1 \rightarrow p_3) \rightarrow ((p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow ((p_1 \vee p_2) \rightarrow p_3))$;
- 7) $((p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_1 \rightarrow p_3)) \rightarrow (p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$;
- 8) $((p_1 \rightarrow \bar{p}_2) \rightarrow (\bar{\bar{p}}_1 \vee p_2)) \leftrightarrow (p_1 \vee p_2)$.

2. Қўйидаги формулаларнинг ҳамма қисм формулаларини ёзиб чиқинг:

$$A = \overline{x \rightarrow y} \wedge (\bar{x} \vee y), \quad B = (x \leftrightarrow y) \vee (\bar{x}y),$$

$$C = (x \leftrightarrow y) \rightarrow (\bar{y} \rightarrow t), \quad D = xy \vee xz \vee yz.$$

- 1) $x \rightarrow (y \rightarrow x)$;
- 2) $\overline{a \vee b} \rightarrow c$;
- 3) $a \wedge \overline{c \vee b}$;
- 4) $x \rightarrow y \wedge z$;
- 5) $x \vee y \wedge z \rightarrow x$;
- 6) $\overline{x \rightarrow y} \vee x \wedge y$;
- 7) $((x \rightarrow x) \wedge (y \rightarrow z)) \rightarrow (\bar{x} \vee z)$;
- 8) $(x \rightarrow y) \rightarrow ((x \rightarrow \bar{y}) \rightarrow \bar{y})$.

3. $L_1 = (A \rightarrow B) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow \bar{A})$, $L_2 = A \vee B$, $L_3 = A \rightarrow B \vee C$ формулалар учун қўйидаги ўрнига қўйишларнинг натижалари ни ёзинг:

$$1) \int_{A,B}^{B,C}(L_1); \quad 2) \int_A^{A \rightarrow B}(L_2); \quad 3) \int_{A,C}^{B \rightarrow A \wedge B, B}(L_3);$$

$$4) \int_{A,B}^{A \wedge B, A \vee B}(L_1); \quad 5) \int_{A,B}^{B,A}(L_2); \quad 6) \int_{A,B,C}^{A \wedge \bar{A}, C, \bar{A}}(L_3).$$

4. Ўрнига қўйиш қоидасини қўллаб, қўйидаги формулаларнинг исботланувчи эканлигини исботланг:

- 1) $(A \rightarrow B) \wedge B \rightarrow B;$
- 2) $A \wedge B \rightarrow A \wedge B \vee C;$
- 3) $(\bar{A} \rightarrow B) \rightarrow ((C \rightarrow B) \rightarrow (\bar{A} \vee C \rightarrow B));$
- 4) $\overline{\overline{C} \vee D} \rightarrow C \vee D;$
- 5) $(A \wedge B \rightarrow (C \rightarrow B \wedge C)) \rightarrow ((A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \rightarrow B \wedge C)).$

5. Ўрнига қўйиш ва хulosса қоидаларини қўллаб, қўйидаги формулаларнинг исботланувчи эканлигини аниқланг:

- 1) $A \vee A \rightarrow A;$
- 2) $A \rightarrow A \wedge A;$
- 3) $A \wedge B \rightarrow B \wedge A;$
- 4) $A \vee B \rightarrow B \vee A;$
- 5) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A);$
- 6) $\overline{\overline{A}} \rightarrow \bar{A}.$

6. Келтириб чиқаришнинг ҳосилавий қоидаларидан фойдаланиб, қўйидаги формулаларнинг исботланувчи эканлигини исботланг:

- 1) $\bar{A} \vee \bar{B} \rightarrow \overline{A \wedge B};$
- 2) $A \rightarrow R;$
- 3) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \vee B);$
- 4) $F \rightarrow A;$
- 5) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A);$
- 6) $A \wedge \bar{A} \rightarrow F;$
- 7) $(A \rightarrow B) \wedge \bar{B} \rightarrow \bar{A};$
- 8) $\bar{A} \wedge \bar{B} \rightarrow \overline{A \vee B}.$

7. Келтириб чиқаришнинг ҳосилавий қоидаларини исботланг:

- 1) $\frac{\vdash \bar{A}}{\vdash A \wedge B};$
- 2) $\frac{\vdash A}{\vdash A \vee B};$
- 3) $\frac{\vdash \bar{A}}{\vdash A \rightarrow \bar{B}};$
- 4) $\frac{\vdash B}{A \rightarrow \bar{B}};$
- 5) $\frac{\vdash A \wedge B}{\vdash A};$
- 6) $\frac{\vdash \bar{B}}{\vdash A \wedge B};$
- 7) $\frac{\vdash A \rightarrow B, \vdash \bar{B}}{\vdash \bar{A}};$
- 8) $\frac{\vdash A, \vdash B}{\vdash A \wedge B};$
- 9) $\frac{\vdash \bar{A}, \vdash \bar{B}}{\vdash A \vee B};$
- 10) $\frac{\vdash A, \vdash \bar{B}}{\vdash A \rightarrow \bar{B}};$
- 11) $\frac{\vdash A \rightarrow \bar{A}}{\vdash \bar{A}};$
- 12) $\frac{\vdash \bar{A} \rightarrow A}{\vdash A};$
- 13) $\frac{\vdash A \rightarrow B, \vdash \bar{A} \rightarrow B}{\vdash B};$
- 14) $\frac{\vdash A \rightarrow B, \vdash A \rightarrow \bar{B}}{\vdash \bar{A}}.$



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Мулоҳазалар ҳисоби формуласи тушунчаси. Мантиқий боғловчилар. Символлар. Қисмий формула.
2. Исботланувчи формула таърифи. Мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалар системаси (тизими). Келтириб чиқариш қоидалари.
3. Келтириб чиқариш қоидасининг ҳосилалари.
4. Бир вақтда ўрнига кўйиш ва мураккаб холоса қоидалари.
5. Силлогизм, контрпозиция ва икки марталик инкорни тушириш қоидалари.

4- §. Формулалар мажмуасидан формулани келтириб чиқариш қоидаси

- Келтириб чиқариш қоидаси. Келтириб чиқариладиган формулалар синфи. Исботланувчи формулалар синфи.

$H = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ чекли формулалар мажмуаси (тўплами) берилган бўлсин. Бу формулалар мажмуасидан формулани келтириб чиқариш тушунчасини берамиз.

Таъриф. 1) Ҳар қандай $A_i \in H$ формулалар мажмуаси H дан келтириб чиқариладиган формуладир.

2) Ҳар қандай исботланувчи формула H дан келтириб чиқарилади.

3) С ва $C \rightarrow B$ лар H формулалар мажмуасидан келтириб чиқарилган формулалар бўлса, у ҳолда B формула ҳам H дан келтириб чиқарилади.

Бирор B формула H формулалар мажмуасидан келтириб чиқариладиган бўлса, уни символик равишида $H \vdash B$ шаклда ёзамиз.

Агар H бўш тўплам ёки элементлари фақат исботланувчи формулалардан иборат бўлса, у ҳолда H дан келтириб чиқариладиган формулалар синфи исботланувчи формулалар синфи билан мос келади. Агар формулалар мажмуаси H нинг ҳеч бўлмаганда битта элементи исботланмайдиган

формуладан иборат бўлса, у ҳолда H дан көлтириб чиқарилидиган формулалар синфи исботланувчи формулалар синфига нисбатан кенгроқ бўлади.

Мисол. $A \vee B$ формула $H = \{A, B\}$ формулалар мажмусидан көлтириб чиқарилишини исботланг.

Исбот. $A \in H$ ва $B \in H$ бўлганлиги учун формулани көлтириб чиқариши қоидасига асосан

$$H \vdash A, \quad (1)$$

$$H \vdash B. \quad (2)$$

Π_1 ва I_1 аксиомаларга нисбатан $\int_{x,y,z}^{A,B,A} (\Pi_3)$ ва $\int_{x,y}^{B,A} (I_1)$ ўрнига қўйиниларни бажарамиз. Натижада исботланувчи формулалар ҳосил бўлади. Улар формулани көлтириб чиқариш қоидасига асосан H дан көлтирилиб чиқарилади, яъни

$$H \vdash (A \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \wedge B)), \quad (3)$$

$$H \vdash B \rightarrow (A \rightarrow B) \quad (4)$$

каби бўлади. $A \rightarrow A$ исботланувчи формула эканлиги учун

$$H \vdash A \rightarrow A. \quad (5)$$

(5) ва (3) формулалардан хulosса қоидасига асосан

$$H \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \wedge B) \quad (6)$$

ни ҳосил қиласиз. Худди шу каби (2) ва (4) формулалардан

$$H \vdash (A \rightarrow B) \quad (7)$$

муносабатга келамиз. (7) ва (6) формулалардан хulosса қоидасига асосан

$$H \vdash A \rightarrow A \wedge B \quad (8)$$

келиб чиқади. У ҳолда (1) ва (8) формулалардан

$$H \vdash A \wedge B \quad (9)$$

ни ҳосил қиласиз, яъни $A \wedge B$ формула H формулалар мажмусидан келиб чиқишини кўрсатдик.

H формулалар мажмуасидан бирорта ихтиёрий формулани келтириб чиқаришда мураккаб хулоса қоидасидан ҳам фойдаланса бўлади. Бу ҳолда (9) муносабатга (5), (7), (1) ва (3) муроҳазалар орқали келиш мумкин.

5- §. Келтириб чиқариш (исботлаш) тушунчаси.

**Дедукция теоремаси. Умумлашган
дедукция теоремаси**

- Исботлаш тушунчаси. Келтириб чиқарининг хоссалари. Келтириб чиқарининг асосий қоидалари. Дедукция теоремаси. Дедукция умумлашган теоремаси. Конъюнкцияни киритиш қоидаси. Дизъюнкцияни киритиш қоидаси.*

5.1. Келтириб чиқариш (исботлаш) тушунчаси.

Таъриф. Агар B_1, B_2, \dots, B_n чекли формулалар кетма-кетлигининг ҳар қандай ҳади қуйидаги уч шартнинг бирортасини қаноатлантирса, у ҳолда бу кетма-кетлик **H чекли формулалар мажмуасидан келтириб чиқарилган** деб аталади:

- 1) H формулалар мажмуасининг бирорта формуласи;
- 2) исботланувчи формула;
- 3) B_1, B_2, \dots, B_n кетма-кетликнинг исталган иккита оддинма-кейин келадиган элементларидан хулоса қоидасига асосан ҳосил қилинади.

Олдинги параграфдаги мисолда қўрсатилдики, $H = \{A, B\}$ дан қўйидаги формулалар чекли кетма-кетлиги келтирилиб чиқарилади:

$$A, B, (A \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \wedge B)), B \rightarrow (A \rightarrow B),$$

$$A, B, A \rightarrow A, (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow (A \wedge B)), A \rightarrow B, A \rightarrow A \wedge B, A \wedge B.$$

Агар мураккаб хулоса қоидасидан фойдалансак, у ҳолда (исбот) келтириб чиқариш формулалари қўйидагича бўлади:

$$A, B, (A \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \wedge B)),$$

$$B \rightarrow (A \rightarrow B), A \rightarrow A, A \rightarrow B, A \wedge B.$$

Формулалар мажмусидан келтириб чиқариш таърифларига асосан келтириб чиқаришнинг қўйидаги ҳоссалари ҳосил бўлади:

1) H формулалар мажмусидан келтириб чиқарилган чекли кетма-кетликнинг бошланғич қисми ҳам H дан келтириб чиқариладиган бўлади;

2) агар H дан келтириб чиқарилган кетма-кетликнинг иккита қўшни ҳадлари (элементлари) орасига H дан келтириб чиқарилган бирор бошқа кетма-кетлик қўйилса, у ҳолда ҳосил қилинган янги формулалар кетма-кетлиги ҳам H дан келтириб чиқарилиши мумкин.

Ҳақиқатан ҳам, масалан, агар $B_1, B_2, \dots, B_i, B_{i+1}, \dots, B_k$ ва C_1, C_2, \dots, C_m лар H дан келтириб чиқарилса, у вақтда келтириб чиқариш таърифига асосан $B_1, B_2, \dots, B_i, C_1, C_2, \dots, C_m, B_{i+1}, \dots, B_k$ ҳам H дан келтириб чиқариладиган бўлади.

3) H формулалар мажмусидан келтириб чиқарилган формулалар кетма-кетлигининг ҳар қандай ҳади H дан келтириб чиқариладиган формуладир.

4) агар $H \subset W$ бўлса, у ҳолда H дан келтириб чиқарилган ҳар қандай формула W нинг ҳам формуласи бўлади.

5) B формула H дан келтириб чиқариладиган формула бўлиши учун H дан келтириб чиқарилган ихтиёрий формулалар кетма-кетлигига бу формуланинг мавжуд бўлиши етарли ва зарурдир.

5.2. Келтириб чиқариш қойдаси. H ва W мулоҳазалар ҳисобининг иккита формулалар мажмуси бўлсин. H, W орқали бу мажмуаларнинг йигиндисини (бирлашмасини) белгилаймиз, яъни

$$H, W = H \cup W.$$

Агар W мажмуа битта C формуладан иборат бўлганда ҳам $H \cup \{C\}$ бирлашмани H, C кўринишда ёзамиш.

Энди келтириб чиқаришнинг асосий қоидаларини кўриб ўтамиш.

$$\text{I. } \frac{H \vdash A}{H, W \nvdash A}.$$

Бу қоида бевосита формулалар мажмуасидан келтириб чиқариш қоидасидан ҳосил бўлади.

$$\text{II. } \frac{H, C \vdash A, H \vdash C}{H \vdash A}.$$

Исбот. Қоиданинг шартига асосан H, C формулалар мажмуасидан A формула келтириб чиқарилади. Шунинг учун H, C дан охирги формуласи A бўлган келтириб чиқариш мавжуд:

$$B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, A. \quad (1)$$

Худди шу каби H формулалар мажмуасидан C формуланни келтириб чиқарилиши мумкинлигидан H дан кейинги формуласи C бўлган келтириб чиқариш мавжуд:

$$C_1, C_2, \dots, C_m, C. \quad (2)$$

(1) келтириб чиқаришда C формула иштирок этмаган ҳолда, у фақат H формулалар мажмуасидан келтириб чиқарилган кетма-кетликда бўлади. Демак, H дан A формула келтириб чиқарилади.

Агар (1) келтириб чиқаришда бирорта формула C бўлса (масалан формула B_i), у ҳолда B_{i-1} ва B_{i+1} формулалар орасига (2) ни кўйамиз. Натижада қўйидаги фақат H дан келтириб чиқаришни оламиз:

$$B_1, B_2, \dots, B_{i-1}, C_1, C_2, \dots, C_m, B_{i+1}, \dots, B_{k-1}, A.$$

Шундай қилиб, H дан A формула келтириб чиқарилади.

$$\text{III. } \frac{H, C \vdash A, W \vdash C}{H, W \nvdash A}.$$

Исбот. $H, C \vdash A$ бўлганлиги учун I қоидага асосан $H, W, C \vdash A$. Қоиданинг шартига биноан $W \vdash C$, у ҳолда I қоидага кўра $H, W \vdash C$. II қоидадан фойдаланиб $H, W \nvdash A$ ни топамиз.

$$\text{IV. } \frac{H \vdash C \rightarrow A}{H, C \vdash A}.$$

И с б о т . $C \rightarrow A$ формула H формулалар мажмусидан келтириб чиқарыладиганлиги сабабли H нинг шундай келтириб чиқарыш мавжудки, унинг охирида $C \rightarrow A$ формула туради:

$$B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, C \rightarrow A. \quad (3)$$

Энди H формулалар мажмусига C formulани қўшиб, H, C формулалар мажмусини ҳосил қиласиз. (3) келтириб чиқарышга C formulани қўшиб, ушбу келтириб чиқарышга эга бўламиз:

$$B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, C \rightarrow A, C. \quad (4)$$

Ўз навбатида бу H, C формулалар мажмусининг келтириб чиқарыш бўлади.

(4) нинг охирита A формулани ёзиш мумкин, чунки у хулоса қоидасига асосан $C \rightarrow A$ ва C формулалардан ҳосил қилинади. Демак, охирги формуласи A бўлган H, C формулалар мажмусининг

$$B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, C \rightarrow A, C, A$$

келтириб чиқарышига эга бўламиз, бу ердан $H, C \vdash A$ эканлиги келиб чиқади.

$$\text{V. Дедукция теоремаси: } \frac{H, C \vdash A}{H \vdash C \rightarrow A}.$$

Аввал H, C формулалар мажмусининг ҳар қандай B_1, B_2, \dots, B_k келтириб чиқарыши учун $H \vdash C \rightarrow B_k$ нинг тўғрилитини математик индукция методидан фойдаланиб исбот қиласиз.

1. $k = 1$ ҳол учун масала тўғри. Ҳақиқатан ҳам, агар B_1 формула H, C нинг келтириб чиқарыши бўлса, у вақтда уч ҳол бўлиши мумкин:

- $B_1 \in H;$
- B_1 – исботланувчи формула,
- B_1 формула C нинг ўзиdir.

а) ва б) ҳоллар учун H дан қўйидаги келтириб чиқариши ни ёзиш мумкин: $B_1, B_1 \rightarrow (C \rightarrow B_1), C \rightarrow B_1$. Демак, $H \vdash C \rightarrow B_1$.

в) ҳол учун $H \vdash C \rightarrow C$ эканлигини исботлаш керак.

Аммо $C \rightarrow C$ исботланувчи формуладир. Шунинг учун уни ҳар қандай мажмуадан келтириб чиқариш мумкин.

2. Энди исталган i ($i < k$) чуқурликдаги ҳар қандай келтириб чиқариш учун масала тўғри бўлсин деб ҳисоблаб, унинг k чуқурликдаги келтириб чиқариш учун тўғрилигиги исбот қиласиз.

B_1, B_2, \dots, B_k лар H, C мажмуанинг келтириб чиқариши бўлсин, бу ерда $k > 1$. Шунинг учун ҳам B_k формулага нисбатан тўрт ҳол юз бериши мумкин:

а) $B_k \in H$;

б) B_k – исботланувчи формула;

в) B_k формула C нинг ўзидир,

г) B_k формула хулоса қоидасига асосан келтириб чиқаришидаги иккита ундан олдин кетма-кет келадиган формулалардан ҳосил қилинади.

а), б), в) ҳолатлар учун исбот тўлиқ равишда $k = 1$ ҳолдаги исботга мос келади.

Шунинг учун г) ҳолни кўрамиз. Бу ҳолда B_k формула B_i ва B_j формулалардан ҳосил қилиниб ($i < k, j > k$), B_j формула $B_i \rightarrow B_k$ кўринишни олади ва қўйидаги тасдиқлар тўғри бўлади:

$$H \vdash C \rightarrow B_i, \quad (5)$$

$$H \vdash C \rightarrow (B_i \rightarrow B_k). \quad (6)$$

I_2 аксиомада

$$\int_{x,y,z}^{C, B_i, B_k} (I_2)$$

ўрнига қўйишни бажариб, қўйидаги исботланувчи формулага эга бўламиз:

$$\vdash (C, (B_i \rightarrow B_k)) \rightarrow ((C \rightarrow B_i) \rightarrow (C \rightarrow B_k)). \quad (7)$$

(6), (5) ва (7) ифодалар H дан келтириб чиқарыладиган формулалардир. Уларга мураккаб хulosса қоидасини қўллаб, $H \vdash C \rightarrow B_k$ ни ҳосил қиласиз.

Энди умумий, яъни $H, C \vdash A$ бўлган ҳолни кўрайлик. Бу ҳолда H, C нинг $B_1, B_2, \dots, B_{k-1}, A$ келтириб чиқариши мавжуд бўлади. Демак, юқорида исбот қилганимизга асосан $H \vdash C \rightarrow A$ тасдиқ тўғридир.

Дедукция теоремасидан муҳим аҳамиятта эга бўлган қўйидаги натижа келиб чиқади.

Умумлашган дедукция теоремаси:

$$\frac{\{C_1, C_2, \dots, C_k\} \vdash A}{\vdash C_1 \rightarrow (C_2 \rightarrow (\dots (C_k \rightarrow A) \dots))}.$$

Исбот. $H_k = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ бўлсин. Теорема шартига асосан $H_k \vdash A$ ёки $H_{k-1}, C_k \vdash A$ нинг тўғрилиги, $H_{k-1} = H_{k-2}, C_{k-1}$ бўлганлиги учун эса

$$H_{k-2}, C_{k-1} \vdash C_k \rightarrow A$$

тасдиқнинг тўғрилиги келиб чиқади. Бу ифодага нисбатан яна дедукция теоремасини қўллаб,

$$H_{k-2} \vdash C_{k-1} \rightarrow (C_k \rightarrow A)$$

ни ҳосил қиласиз. Бу процедурани k марта тақрорлаб, ушбу тасдиқка келамиш:

$$H_0 = \emptyset \vdash C_1 \rightarrow (C_2 \rightarrow (C_3 \rightarrow \dots (C_k \rightarrow A) \dots)).$$

Аммо бўш тўпламдан фақатгина исботланувчи формулалар келтириб чиқариш мумкин, яъни

$$\vdash C_1 \rightarrow (C_2 \rightarrow (C_3 \rightarrow \dots (C_k \rightarrow A) \dots)).$$

$k = 1$ бўлган хусусий ҳолда

$$\frac{C \vdash A}{\vdash C \rightarrow A}$$

га эга бўламиш.

VI. Конъюнкцияни киритиш қоидаси:

$$\frac{H \vdash A, H \vdash B}{H \vdash A \wedge B}.$$

Исбот. Берилганига кўра

$$H \vdash A, \quad (8)$$

$$H \vdash B. \quad (9)$$

$\{A, B\}$ формулалар мажмуасидан $A \wedge B$ формулани келтириб чиқариш мумкинлиги, яъни

$$\{A, B\} \vdash A \wedge B \quad (10)$$

эканлигини кўрсатган эдик. Келтириб чиқаришнинг I қоидасига асосан

$$H, A, B \vdash A \wedge B, \quad (11)$$

$$H, A \vdash B. \quad (12)$$

Келтириб чиқаришнинг II қоидасидан фойдаланиб, (11) ва (12) муносабатлардан

$$H, A \vdash A \wedge B \quad (13)$$

ҳамда (8) ва (13) дан

$$H \vdash A \wedge B$$

ларни ҳосил қиласиз.

VII. Дизъюнкцияни киритиш қоидаси:

$$\frac{H, A \vdash C; H, B \vdash C}{H, A \vee B \vdash C}.$$

Исбот. $H, A \vdash C; H, B \vdash C$ шартлардан дедукция теоремасига асосан

$$H \vdash A \rightarrow C, \quad (14)$$

$$H \vdash B \rightarrow C \quad (15)$$

формулалар келиб чиқади.

III аксиома H формулалар мажмуасидан исботланувчи формула сифатида келтириб чиқарилади, яъни

$$H \vdash (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C)). \quad (16)$$

(14), (15) ва (16) формулаларга мураккаб хулоса қоидасини қўллаб

$$H \vdash A \vee B \rightarrow C \quad (17)$$

формулани ҳосил қиласиз.

Энди келтириб чиқаришнинг IV қоидасини қўллаб

$$H, A \vee B \vdash C$$

формулага эга бўламиз.

6- §. Айрим мантиқ қонунларининг исботи

- Мантиқ қонунлари. Шартларни ўрин алмаштириши қонуни.
Шартларни қўшиши қонуни. Шартларни ажратилиши қонуни.

Дедукция теоремаси бир қатор мантиқ қонунларини исботлашга ёрдам беради.

I. Асосларни (шартларни) ўрин алмаштириш қонуни:

$$\vdash (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (y \rightarrow (x \rightarrow z)). \quad (1)$$

Исбот. $H = \{x \rightarrow (y \rightarrow z), y, x\}$ формулалар мажмусидан $x \rightarrow (y \rightarrow z)$, y , x , $y \rightarrow z$, z келтириб чиқариш келиб чиқади. Демак, H дан z формула келиб чиқади. У ҳолда умумлашган дедукция теоремасига асоссан (1) формула исботланувчи эканлигини ҳосил қиласиз.

Асосларни ўрин алмаштириш қонунидан исботланувчи формулалар учун ушбу асосларни ўрин алмаштириш қоидаси

$$\frac{\vdash (x \rightarrow (y \rightarrow z))}{\vdash (y \rightarrow (x \rightarrow z))}$$

келиб чиқади.

Ҳақиқатан ҳам, агар

$$\vdash x \rightarrow (y \rightarrow z) \quad (2)$$

бўлса, у ҳолда (1) ва (2) формулалардан хулоса қоидасига асоссан

$$\vdash y \rightarrow (x \rightarrow z)$$

формула ҳосил қилинади.

II. Асосларни қўшиш қонуни:

$$\vdash (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (x \wedge y \rightarrow z). \quad (3)$$

Исбот. $H = \{x \rightarrow (y \rightarrow z), x \wedge y\}$ формулалар мажмуасидан $x \rightarrow (y \rightarrow z)$, $x \wedge y$, $x \wedge y \rightarrow x$, $x \wedge y \rightarrow y$, x , y , $y \rightarrow z$, z келтириб чиқариш олинади. Бу эса H дан z формула келиб чиқади демакдир. Бу ўз навбатида умумлашган дедукция теоремасига асосан (3) формуланинг исботланувчи эканлигини кўрсатади.

Асосларни қўшиш қонунидан исботланувчи формулалар учун асосларни қўшиш қоидаси

$$\frac{\vdash (x \rightarrow (y \rightarrow z))}{\vdash x \wedge y \rightarrow z}$$

келиб чиқади.

Ҳақиқатан ҳам, агар

$$\vdash x \rightarrow (y \rightarrow z) \quad (4)$$

бўлса, у ҳолда (3) ва (4) формулалардан хulosса қоидаларига асосан $\vdash x \wedge y \rightarrow z$ эканлигини ҳосил қиласиз.

III. Асосларни ажратиш қонуни:

$$\vdash (x \wedge y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow (y \rightarrow z)). \quad (5)$$

Исбот. $H = \{x, y, x \wedge y \rightarrow z\}$ формулалар мажмуасидан келиб чиқадиган x , y , $x \wedge y \rightarrow z$, $x \wedge y$, z келтириб чиқаришни қараймиз. Бунда H формулалар мажмуасидан z формуланинг келиб чиқиши кўриниб турибди. У ҳолда умумлашган дедукция теоремасига асосан (5) формула исботланувчи эканлигига ишонч ҳосил қиласиз.

Асосларни ажратиш қонунидан исботланувчи формулалар учун асосларни ажратиш қоидаси

$$\frac{\vdash x \wedge y \rightarrow z}{\vdash x \rightarrow (y \rightarrow z)}$$

ҳосил бўлади. Ҳақиқатан ҳам, агар

$$\vdash x \wedge y \rightarrow z \quad (6)$$

бўлса, у ҳолда (5) ва (6) формулалардан хulosса қоидасига асосан $\vdash x \rightarrow (y \rightarrow z)$ эканлиги келиб чиқади.

IV. $\vdash x \rightarrow (\bar{x} \rightarrow y)$.

Исбот. I₁ ва IV₁ аксиомаларда қыйидаги

$$\int\limits_y^{\bar{y}} (I_1) \text{ ва } \int\limits_{x, y}^{\bar{y}, x} (IV_1)$$

үрнига қўйишларни бажариш натижасида

$$\vdash x \rightarrow (\bar{y} \rightarrow x), \quad (7)$$

$$\vdash (\bar{y} \rightarrow x) \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{\bar{y}}) \quad (8)$$

исботланувчи формулаларни ҳосил қиласиз. (7) ва (8) формулалардан силлогизм қоидасига асосан

$$\vdash x \rightarrow (\bar{x} \rightarrow \bar{y})$$

формула келиб чиқади. Асосларни бирлаштириш қонунидан фойдаланиб,

$$\vdash x \wedge \bar{x} \rightarrow \bar{\bar{y}}$$

формулани ҳосил қиласиз. Икки карралик инкорни тушириш қоидасидан фойдаланиб,

$$\vdash x \wedge \bar{x} \rightarrow y$$

формулага эга бўламиз. Бу ердан асосларни ажратиш қонунини қўллаб, исботланиши керак бўлган (5) формулани келтириб чиқарамиз.

V. $\vdash \bar{x} \wedge \bar{y} \rightarrow \overline{x \vee y}$.

Исбот. III₃ аксиомада z нинг ўрнига $\overline{\bar{x} \wedge \bar{y}}$ ни қўямиз:

$$\vdash (x \rightarrow \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}}) \rightarrow ((y \rightarrow \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}}) \rightarrow (x \vee y \rightarrow \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}})). \quad (9)$$

I₁ ва II₂ аксиомалардан

$$\vdash \bar{x} \wedge \bar{y} \rightarrow \bar{x}, \quad (10)$$

$$\vdash \bar{x} \wedge \bar{y} \rightarrow \bar{y} \quad (11)$$

формулалар келиб чиқади. (10) ва (11) формулаларга контрапозиция қоидасини қўллаб, ушбу формулаларни ҳосил қиласиз:

$$\vdash \bar{\bar{x}} \rightarrow \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}}, \quad (12)$$

$$\vdash \bar{y} \rightarrow \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}}. \quad (13)$$

Бу формулаларга икки қарралы инкорни тушириш қоидасини қўллаб, қўйидаги формулаларни келтириб чиқарамиз:

$$\vdash x \rightarrow \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}}, \quad (14)$$

$$\vdash y \rightarrow \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}}. \quad (15)$$

Энди (9), (14) ва (15) формулаларга мураккаб хулоса қоидасини қўллаб,

$$\vdash x \vee y \rightarrow \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}} \quad (16)$$

формулага эга бўламиз.

Ниҳоят, (16) формулага аввал контрпозиция қоидасини ва сўнгра икки мартали инкорни тушириш қоидасини қўллаб, исботланиши лозим бўлган

$$\vdash \bar{x} \wedge \bar{y} \rightarrow \overline{x \vee y}$$

формулани ҳосил қиласмиз.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. *H* формулалар мажмуасидан кўрсатилган формулаларни келтириб чиқариш мумкинлигини кўрсатинг:

- 1) $H = \{A\} \vdash B \rightarrow A;$ 2) $H = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\} \vdash A \rightarrow C;$
- 3) $H = \{A \rightarrow C\} \vdash \bar{C} \rightarrow \bar{A};$ 4) $H = \{A \rightarrow B, \bar{B}\} \vdash A;$
- 5) $H = \{A, \bar{\bar{A}} \rightarrow B\} \vdash B;$ 6) $H = \{A \rightarrow B\} \vdash A \wedge C \rightarrow B \wedge C;$
- 7) $H = \{A \rightarrow B\} \vdash (C \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow B);$
- 8) $H = \{A \rightarrow B\} \vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C);$
- 9) $H = \{A \rightarrow (B \rightarrow C)\} \vdash B \rightarrow (A \rightarrow C);$
- 10) $H = \{A \rightarrow B\} \vdash A \vee C \rightarrow B \vee C.$

2. Умумлашган дедукция теоремасидан фойдаланиб, формулаларнинг исботланувчи эканлигини исботланг:

- 1) $(x \rightarrow y) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z));$
- 2) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \vee C \rightarrow B \vee C);$
- 3) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((C \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow B)).$

3. Мантиқ қонунларининг тўғрилигини қўрсатинг:
1) $x \rightarrow (\bar{x} \rightarrow y)$; 2) $x \vee \bar{x}$; 3) $\bar{x} \wedge \bar{y} \rightarrow x \vee y$.
4. Шартларни ўрин алмаштириш, шартларни қўшиш ва шартларни ажратиш қоидаларидан фойдаланиб, берилганларнинг тўғрилигини исботланг:
1) $\vdash x \rightarrow (y \rightarrow x \wedge y)$; 2) $\vdash (A \rightarrow B) \wedge \bar{B} \rightarrow \bar{A}$; 3) $\vdash \bar{A} \rightarrow (A \rightarrow B)$.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Келтириб чиқариладиган ва исботланувчи формуласалар синфи.
2. Формулалар мажмуасидан формулани келтириб чиқариш қоидаси. Келтириб чиқаришнинг хоссалари ва асосий қоидалари.
4. Дедукция теоремаси ва умумлашган дедукция теоремаси.
5. Конъюнкцияни ва дизъюнкцияни киритиш қоидалари.
6. Мантиқ қонунлари. Шартларни ўрин алмаштириш, қўшиш ва ажратиш қонунлари.

7- §. Мулоҳазалар алгебраси ва мулоҳазалар ҳисоби орасидаги муносабатлар

Мулоҳазалар ҳисоби формуласининг қиймати. Мулоҳазалар ҳисобидаги формулалар билан мулоҳазалар алгебрасидаги формулалар орасидаги муносабатлар. Умумқийматли формула. Айнан чин формула. Келтириб чиқариш ҳақидаги теорема.

Мулоҳазалар ҳисоби формулаларини худди мулоҳазалар алгебраси формулалари сифатида қараш мумкин. Бунинг учун мулоҳазалар ҳисоби ўзгарувчиларига мулоҳазалар алгебраси ўзгарувчилари сингари қараймиз, яъни ўзгарувчилар чин ёки ёлғон (1 ёки 0) қиймат олади деб ҳисоблаймиз.

\wedge , \vee , \rightarrow ва – амалларини мулоҳазалар алгебрасидагидек аниқлаймиз.

Мулоҳазалар ҳисобининг ҳар бир формуласи, ўзгарувчилар унинг ифодасига қандай киришидан қатъи назар, 1 ёки 0 қиймат қабул қиласи. Унинг қиймати мулоҳазалар алгебрасидаги қоидалар бўйича ҳисобланади.

Мулоҳазалар ҳисоби формуласининг қиймати тушунчасини аниқлайлик.

A – мулоҳазалар ҳисоби формуласи, x_1, x_2, \dots, x_n лар эса A формула ифодасига кирувчи ўзгарувчилар ($x_i \neq x_j$) бўлсин. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ лар орқали мос равишда x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларнинг қийматларини белгилаймиз, $\alpha_i \in E_2 = \{0, 1\}$. $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ вектор 2^n та қийматлар сатрига эга.

Ўзгарувчиларнинг битта қийматлар сатри учун A формуланинг қиймати $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A)$ ни куйидагича аниқлаймиз:

1. A формуланинг энг катта узунликдаги қисмий формуласи x_i бўлганда, $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(x_i) = \alpha_i$ бўлади.

2. Агар $k + 1$ узунликдаги ҳамма қисмий формулалар аниқланган бўлса, у ҳолда $A_i \wedge A_j, A_i \vee A_j, A_i \rightarrow A_j, \bar{A}_i$ амалларнинг бажарилиши натижасида олинган k узунликдаги қисмий формулалар қуйидаги қийматларга эга бўлади:

$$R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_i \wedge A_j) = R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_i) \wedge R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_j),$$

$$R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_i \vee A_j) = R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_i) \vee R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_j),$$

$$R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_i \rightarrow A_j) = R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_i) \rightarrow R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_j),$$

$$R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(\bar{A}_i) = \overline{R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A_i)}.$$

Масалан, $x_1 \vee \bar{x}_4 \rightarrow \overline{x_2 \wedge \bar{x}_3}$ формула x_1, x_2, x_3, x_4 ўзгарувчиларнинг $(0, 1, 1, 0)$ қийматлар сатрида $R_{0110}(x_1 \vee \bar{x}_4 \rightarrow \overline{x_2 \wedge \bar{x}_3}) = 1$ қийматга эга.

Ҳақиқатан ҳам, бу формула куйидаги қисмий формулаларга эга:

$x_1 \vee \bar{x}_4, \overline{x_2 \wedge \bar{x}_3}$ – биринчи узунликдаги қисмий формулалар;

$x_1 \vee \bar{x}_4, x_2 \wedge \bar{x}_3$ – иккинчи узунликдаги қисмий формулалар;

x_4, x_2, \bar{x}_3 – учинчи узунликдаги қисмий формулалар;

x_3 – тўртинчи узунликдаги қисмий формула.

$$\begin{aligned}
 \text{Бу ердан } R_{0110}(x_3) &= 1, \quad R_{0110}(\bar{x}_3) = \overline{R_{0110}(x_3)} = 0, \\
 R_{0110}(x_2) &= 1, \quad R_{0110}(x_4) = 0, \\
 R_{0110}(x_2 \wedge \bar{x}_3) &= R_{0110}(x_2) \wedge R_{0110}(\bar{x}_3) = 0, \\
 R_{0110}(\bar{x}_4) &= \overline{R_{0110}(x_4)} = 1, \quad R_{0110}(x_1) = 0, \\
 R_{0110}(x_1 \vee \bar{x}_4) &= R_{0110}(x_1) \vee R_{0110}(\bar{x}_4) = 1, \\
 R_{0110}(\overline{x_2 \wedge \bar{x}_3}) &= \overline{R_{0110}(x_2 \wedge \bar{x}_3)} = 1, \\
 R_{0110}(x_1 \vee \bar{x}_4 \rightarrow \overline{x_2 \wedge \bar{x}_3}) &= \\
 &= R_{0110}(x_1 \vee \bar{x}_4) \rightarrow R_{0110}(\overline{x_2 \wedge \bar{x}_3}) = 1
 \end{aligned}$$

Эканлигини топамиз.

Энди мулоҳазалар ҳисоби билан мулоҳазалар алгебраси орасидаги муносабатларни аниқловчи теоремаларга тұхтадиб үтайлик.

1-теорема. *Мулоҳазалар ҳисобидаги ҳар бир исботла-нувчи формула мулоҳазалар алгебрасида айнан чин (тавтоло-гия, умумқиymатли) формула бўлади.*

Исбот. Теоремани исбот қилиш учун куйидаги учта ҳолни кўриб чиқишига тўғри келади:

1) мулоҳазалар ҳисобидаги ҳар бир аксиома мулоҳазалар алгебрасидаги айнан чин формуладир;

2) айнан чин формулаларга ўрнига қўйиш қоидасини кўллаш натижасида ҳосил қилинган формулалар яна айнан чин формулалар бўлади;

3) айнан чин формулаларга хулоса қоидасини кўллаш натижасида ҳосил қилинган формулалар яна айнан чин формулалар бўлади.

1-ҳолниг исботи. Мулоҳазалар ҳисоби аксиомаларининг айнан чинлигини исботлаш учун чинлик жадвалидан фойдаланамиз:

а) ифодасида битта ўзгарувчиси бор аксиомалар:

x	IV_2	IV_3
1	1	1
0	1	1

б) ифодасида иккита ўзгарувчиси бор аксиомалар:

x	y	I_1	II_1	II_2	III_1	III_2	IV_1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1

в) ифодасида учта ўзгарувчиси бор аксиомалар:

x	y	z	I_2	II_3	III_3
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1

2-ҳолнинг исботи. Аввал қуйидаги леммани исбот қиласиз.

Лемма. *A ва B формулаларнинг ифодасига кирувчи ҳамма ўзгарувчилар x_1, x_2, \dots, x_n, x ва бу ўзгарувчиларнинг ихтиёрий қийматлар сатри эса $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha$ бўлсин. Агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha}(B) = \beta$ бўлса, у ҳолда $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \left(\int_x^{\beta}(A) \right) = R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n} \beta(A)$ бўлади.*

Исбот. Лемманинг исботини, формуланинг тузилишини ҳисобга олган ҳолда, индукция методи билан амалга оширамиз.

а) A формула x дан фарқ қилувчи x_i ўзгарувчи бўлсин. У ҳолда

$$R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha}(x_i) \alpha_i, \underset{x}{\overset{B}{\int}}(x_i) = x_i;$$

$$R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \left(\underset{x}{\overset{B}{\int}}(A) \right) = \alpha_i, R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \beta(A) = \alpha_i,$$

яъни лемманинг тасдиғи тўғри бўлади.

б) A формула, x ўзгарувчи бўлсин. У ҳолда $\underset{x}{\overset{B}{\int}}(A)$ ўрнига кўйиш B ни беради ва

$$R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \left(\underset{x}{\overset{B}{\int}}(A) \right) = \alpha_i, R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha}(B) = \beta$$

ни оламиз, яъни лемманинг тасдиғи яна тўғри бўлади.

в) $A = A_1 * A_2$ ҳамда A_1 ва A_2 формулалар учун лемманинг шартлари бажарилсин. У ҳолда A формула учун лемма тасдиғининг тўғрилиги кўйидаги тенгликлардан келиб чиқади:

$$\begin{aligned} R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \left(\underset{x}{\overset{B}{\int}}(A) \right) &= R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \left(\underset{x}{\overset{B}{\int}}(A_1 * A_2) \right) = \\ &= R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \left(\underset{x}{\overset{B}{\int}}(A_1) * \underset{x}{\overset{B}{\int}}(A_2) \right) = R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \underset{x}{\overset{B}{\int}}(A_1) * R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \underset{x}{\overset{B}{\int}}(A_2) = \\ &= R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \beta(A_1) * R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \beta(A_2) = R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \beta(A_1 * A_2) = R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \alpha} \beta(A). \end{aligned}$$

$A = \bar{A}_1$ бўлган ҳол учун ҳам лемманинг тасдиғи юқоридагидек исботланади. Энди 2- ҳолнинг исботига ўтамиз.

Лемма. A – берилган формула, x – ўзгарувчи, B – мулоҳазалар ҳисобининг исталган формуласи бўлсин. Агар A айнан чин формула бўлса, у ҳолда $\underset{x}{\overset{B}{\int}}(A)$ формула ҳам айнан чин формула бўлади.

Исбот. x_1, x_2, \dots, x_n, x лар A ва B формулалар ифодасига кирувчи ўзгарувчилар бўлсин. Ўзгарувчиларнинг ҳамма 2^{n+1} та $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha)$ қийматлар сатрида $\int_x^B(A)$ формула чин қиймат қабул қилишини кўрсатиш лозим. $\int_x^B(A)$ формула айнан чин формула эмас деб фараз қиласиз. У ҳолда шундай $(\alpha_1^0, \alpha_2^0, \dots, \alpha_n^0, \alpha^0)$ қийматлар сатри топилиб,

$$R_{\alpha_1^0 \alpha_2^0 \dots \alpha_n^0 \alpha^0} \left(\int_x^B(A) \right) = 0$$

бўлади. Бундан ўз навбатида лемма шартига асосан $R_{\alpha_1^0 \alpha_2^0 \dots \alpha_n^0 \alpha^0} \beta(A) = 0$ эканлигини топамиз. Аммо бу A нинг айнан чин формула эканлигига зиддир. Демак, ҳамма қийматлар сатрида $\int_x^B(A)$ формула чин қиймат қабул қиласиз ва у айнан чиндир.

3-ҳолниңг исботи. Агар C ва $C \rightarrow A$ формулалар айнан чин бўлса, у ҳолда A ҳам айнан чин формула бўлади.

Исбот. x_1, x_2, \dots, x_n лар C ва A формулалар ифодасига кирувчи ўзгарувчилар бўлсин. A – айнан чин бўлмаган формула деб фараз қиласиз. У ҳолда ўзгарувчиларнинг шундай $(\alpha_1^0, \alpha_2^0, \dots, \alpha_n^0)$ қийматлар сатри мавжуд бўладики, $R_{\alpha_1^0 \alpha_2^0 \dots \alpha_n^0}(A) = 0$ бўлади. Бу ердан $R_{\alpha_1^0 \alpha_2^0 \dots \alpha_n^0}(C \rightarrow A) = R_{\alpha_1^0 \alpha_2^0 \dots \alpha_n^0}(C) \rightarrow R_{\alpha_1^0 \alpha_2^0 \dots \alpha_n^0}(A) = 1 \rightarrow 0 = 0$ эканлиги келиб чиқади. Бу натижа $C \rightarrow A$ формуланинг айнан чин эканлигига зиддир. Бу қарама-қаршилик A айнан чин формула эканлигини исботлайди.

2-төрима (келтириб чиқариш ҳақида). A – мулоҳазалар ҳисобининг бирор формуласи; x_1, x_2, \dots, x_n – шу A формула ифодасига кирувчи ўзгарувчилар ва $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ – ўзгарувчиларнинг ихтиёрий қийматлар сатри бўлсин. Н орқали чекли формулалар мажмуасини белгилаймиз. Агар

$$x_i^{\alpha_i} = \begin{cases} x_i, & \text{агар } \alpha_i = 1 \text{ бўлса,} \\ \bar{x}_i, & \text{агар } \alpha_i = 0 \text{ бўлса,} \end{cases}$$

У ҳолда $H = \{x_1^{\alpha_1}, x_2^{\alpha_2}, \dots, x_n^{\alpha_n}\}$ формулалар мажмуаси үчүн:

- 1) $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A) = 1$ бўлган ҳолда $H \vdash A$;
- 2) $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A) = 0$ бўлган ҳолда $H \vdash \bar{A}$ бўлади.

Исбот. Теореманинг исботини формула тузилишига қараб индукция методи билан олиб борамиз.

1. A формула x_i ўзгарувчи бўлсин:

- a) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(x_i) = \alpha_i = 1$ бўлса, у ҳолда $x_i \vdash x_i$ ёки $x_i^{\alpha_i} \vdash x_i$, яъни $x_i^{\alpha_i} \vdash A$. Демак, $H \vdash A$;
- б) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(x_i) = \alpha_i = 0$ бўлса, у ҳолда $\bar{x}_i \vdash \bar{x}_i$ ёки $x_i^{\alpha_i} \vdash \bar{x}_i$, яъни $x_i^{\alpha_i} \vdash \bar{A}$. Демак, $H \vdash \bar{A}$.

2. Энди фараз қиламизки, B_1 ва B_2 формулалар учун теорема тўғри деб қаралган ҳолда A формула қўйидаги тўрт қўринишнинг бири бўлсин:

$$\text{I. } B_1 \wedge B_2; \quad \text{II. } B_1 \vee B_2; \quad \text{III. } B_1 \rightarrow B_2; \quad \text{IV. } \bar{B}_1.$$

Ҳар бир ҳолни алоҳида кўриб ўтамиш.

I. A формула $B_1 \wedge B_2$ қўринишга эга:

а) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1 \wedge B_2) = 1$ бўлса, у ҳолда $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 1$ ва $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_2) = 1$ келиб чиқади. Бундан қилинган фаразимизга кўра $H \vdash B_1$ ва $H \vdash B_2$. Бу ердан ўз навбатида конъюнкцияни киритиш қоидасига асосан $H \vdash B_1 \wedge B_2$, яъни $H \vdash A$ ҳосил бўлади;

б) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1 \wedge B_2) = 0$ бўлса, у ҳолда $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 0$ ёки $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_2) = 0$ бўлади. Масалан, $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 0$ дейлик, у ҳолда фаразимизга кўра

$$H \vdash \bar{B}_1. \tag{1}$$

II₁ аксиомага кўра $\vdash B_1 \wedge B_2 \rightarrow B_1$. Бу ердан контрпозиция қоидасига асосан

$$\vdash \overline{B_1} \rightarrow \overline{B_1 \wedge B_2} \quad (2)$$

келиб чиқади. (1) ва (2) формулалардан хulosса қоидасига биноан $H \vdash \overline{B_1 \wedge B_2}$ ни ҳосил қиласиз, яъни $H \vdash \overline{A}$.

II. A формула $B_1 \vee B_2$ кўринишга эга бўлсин:

а) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1 \vee B_2) = 1$ бўлса, у ҳолда ҳеч бўлмагандা $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 1$ ёки $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_2) = 1$ бўлади. $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 1$ бўлсин, у ҳолда фаразимизга кўра

$$H \vdash B_1. \quad (3)$$

III₃ аксиомага асосан эса

$$\vdash B_1 \rightarrow B_1 \vee B_2 \quad (4)$$

келиб чиқади. (3) ва (4) формулалардан хulosса қоидасига асосан $H \vdash B_1 \vee B_2$ ни ҳосил қиласиз, яъни $H \vdash A$;

б) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1 \vee B_2) = 0$ бўлса, у ҳолда $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 0$ ва $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_2) = 0$ бўлади. Бу ердан $H \vdash \overline{B_1}$ ва $H \vdash \overline{B_2}$ келиб чиқади. Ўз навбатида конъюнкцияни киритиш қоидасига асосан

$$H \vdash \overline{B_1 \wedge B_2} \quad (5)$$

га келинади. Исботланувчи формуладан фойдаланиб,

$$\vdash \overline{B_1 \wedge B_2} \rightarrow \overline{B_1 \vee B_2} \quad (6)$$

ни оламиз. (5) ва (6) формулалардан хulosса қоидасига асосан $H \vdash \overline{B_1 \vee B_2}$ ни ҳосил қиласиз, яъни $H \vdash \overline{A}$.

III. A формула $B_1 \rightarrow B_2$ кўринишда бўлсин.

а) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1 \rightarrow B_2) = 1$ бўлса, ёки $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 0$, ёки $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_2) = 1$ бўлади. Масалан, $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 0$ бўлса, у ҳолда

$$H \vdash \overline{B_1} \quad (7)$$

ни ҳосил қиласиз.

Исботланувчи формуладан фойдаланиб $\vdash B_1 \rightarrow (\bar{B}_1 \rightarrow B_2)$ формулани топамиз. Бу формуладан асосларнинг ўрин алмаштириш қоидасига асосан

$$\vdash \bar{B}_1 \rightarrow (B_1 \rightarrow B_2) \quad (8)$$

формулани ҳосил қиласиз. (7) ва (8) формулалардан хulosса қоидасига биноан $H \vdash B_1 \rightarrow B_2$ формулани ёзамиз, яъни $H \rightarrow A$.

Агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_2) = 1$ бўлса, у ҳолда

$$H \vdash B_2. \quad (9)$$

I_1 аксиомадан фойдаланиб,

$$\vdash B_2 \rightarrow (B_1 \rightarrow B_2) \quad (10)$$

формулани келтириб чиқарамиз. (9) ва (10) формулалардан хulosса қоидасига кўра $H \vdash B_1 \rightarrow B_2$ келиб чиқади, яъни $H \vdash A$;

б) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1 \rightarrow B_2) = 0$ бўлса, у ҳолда $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 1$ ва $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_2) = 0$ бўлади. Бу ердан

$$H \vdash B_1, \quad (11)$$

$$H \vdash \bar{B}_2 \quad (12)$$

эканлиги келиб чиқади. Исботланувчи формула таърифига асосан

$$\vdash (B_1 \rightarrow B_2) \rightarrow (B_1 \rightarrow B_2).$$

Бу формуладан асосларнинг ўрин алмаштириш қоидасига кўра

$$\vdash B_1 \rightarrow ((B_1 \rightarrow B_2) \rightarrow B_2) \quad (13)$$

формулани келтириб чиқарамиз. (11) ва (13) формулалардан хulosса қоидасига биноан

$$H \vdash ((B_1 \rightarrow B_2) \rightarrow B_2) \quad (14)$$

ни ҳосил қиласиз, ўз навбатида ундан контрапозиция қоидасини қўллаб

$$H \vdash \bar{B}_2 \rightarrow (\bar{B}_1 \rightarrow \bar{B}_2) \quad (15)$$

формулани келтириб чиқарамиз. (12) ва (15) формулалардан хулоса қоидасига асосан $H \vdash (\bar{B}_1 \rightarrow \bar{B}_2)$ формулагаты эга бўламиз, яъни $H \vdash \bar{A}$.

IV. A формула \bar{B}_1 кўринишга эга бўлсин:

- а) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(\bar{B}_1) = 1$ бўлса, у ҳолда $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 0$ бўлади. Демак, $H \vdash \bar{B}_1$, яъни $H \vdash A$;
- б) агар $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(\bar{B}_1) = 0$ бўлса, у ҳолда $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(B_1) = 1$ бўлади ва бундан

$$H \vdash B_1 \quad (16)$$

келиб чиқади. IV₂ аксиомадан фойдаланиб

$$H \vdash B_1 \rightarrow \bar{\bar{B}}_1 \quad (17)$$

формулани ёзамиз. (16) ва (17) формулалардан хулоса қоидасига асосан $H \vdash \bar{\bar{B}}_1$ ни, яъни $H \vdash \bar{A}_1$ ни ҳосил қиласиз.

З-төрима. *Мулоҳазалар алгебрасининг ҳар бир айнан чин формуласи мулоҳазалар ҳисобида исботланувчи формула бўлади.*

Исбот. A формула теорема шартига асосан айнан чин формула бўлганлиги учун $R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}(A) = 1$. Бундан 2-төримага асосан

$$H_n \vdash A \quad (18)$$

келиб чиқади, бу ерда $H_n = \{x_1^{\alpha_1}, \dots, x_n^{\alpha_n}\}$.

$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ қийматлар сатрларининг сони 2^n тага тенг. Шунинг учун (18) формула ҳамма 2^n та қийматлар сатрида бажарилади.

Агар $H_{n-1} = \{x_1^{\alpha_1}, x_2^{\alpha_2}, \dots, x_{n-1}^{\alpha_{n-1}}\}$ бўлса, у ҳолда, равшанини, $H_{n-1}, x_n \vdash A$ ва $H_{n-1}, \bar{x}_n \vdash A$ бўлади. Дизъюнкцияни киритиши қоидасига асосан бу ҳолда $H_{n-1}, x_n \vee \bar{x}_n \vdash A$ бўлади. Аммо

$x_n \vee \bar{x}_n$ формула исботланувчи формула бўлганлиги учун уни H_{n-1} , $x_n \vee \bar{x}_n$ формулалар мажмуасидан олиб ташлаш мумкин. Демак, $H_{n-1} \vdash A$.

Худди шу каби $H_{n-2} = \{x_1^{\alpha_1}, x_2^{\alpha_2}, \dots, x_{n-2}^{\alpha_{n-2}}\}$, ..., $H_2 = \{x_1^{\alpha_1}, x_2^{\alpha_2}\}$, $H_1 = \{x_1^{\alpha_1}\}$ формулалар мажмуалари учун кетма-кет $H_{n-1} \vdash A$, $H_{n-2} \vdash A$, ..., $H_2 \vdash A$, $H_1 \vdash A$ эканлигини исботлаш мумкин. Маълумки, $H_1 = \{x_1^{\alpha_1}\} \vdash A$ муносабат $\alpha_1 = 1$ ва $\alpha_1 = 0$ ҳоллар учун тўғридир, яъни $x_1 \vdash A$ ва $\bar{x}_1 \vdash A$. Бу ердан дизъюнкцияни киритиш қоидасига асосан $x_1 \vee \bar{x}_1 \vdash A$ га эга бўламиз. Аммо $x_1 \vee \bar{x}_1$ исботланувчи формула бўлганлиги учун уни ташлаб юбориш мумкин. Шундай қилиб, $\emptyset \vdash A$. Демак, A исботланувчи формула экан.



Муаммоли масала ва топшириқлар

- Куйидаги формула $A = x_1 \vee x_2 \rightarrow x_3$ ва ўзгарувчиларнинг:
1) (0, 0, 1); 2) (1, 0, 0) қийматлар сатри берилган. A формула ва унинг инкори \bar{A} ни мос формулалар мажмуасидан келтириб чиқаринг.
- Куйидаги формула $A = \bar{x}_1 \vee x_2 \rightarrow \bar{x}_3$ ва ўзгарувчиларнинг:
1) (1, 1, 1); 2) (1, 0, 1); 3) (0, 1, 0) қийматлар сатри берилган. A формула ва унинг инкори \bar{A} ни мос формулалар мажмуасидан келтириб чиқаринг.
- Куйидаги формула $A = (x \vee \bar{y}) \rightarrow \bar{x} \wedge \bar{z}$ ва ўзгарувчиларнинг: 1) (1, 0, 0); 2) (0, 1, 1); 3) (0, 1, 0) қийматлар сатри берилган. A формула ва унинг инкори \bar{A} ни мос формулалар мажмуасидан келтириб чиқаринг.
- Умумлашган дедукция теоремасидан фойдаланиб, қуйидаги формулаларнинг исботланувчи эканлигини ва улар мулоҳазалар алгебрасида айнан чин(тавтология) формулалар эканлигини исботланг:

$$(x \rightarrow y) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z));$$

$$(x \rightarrow y) \rightarrow (x \vee z \rightarrow y \vee z);$$

$$(x \rightarrow y) \rightarrow ((z \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow y)).$$

5. $x_1 \vee \bar{x}_4 \rightarrow \overline{x_2 \wedge \bar{x}_3}$ формула x_1, x_2, x_3, x_4 ўзгарувчиларнинг $(0, 1, 1, 0)$ қийматлар сатрида $R_{0110}(x_1 \vee \bar{x}_4 \rightarrow \overline{x_2 \wedge \bar{x}_3}) = 1$ қийматга эта эканлигини исботланг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Мулоҳазалар ҳисоби формуласининг қиймати.
2. Мулоҳазалар алгебраси ва мулоҳазалар ҳисоби орасидаги муносабатлар.
3. Умумқийматли ва айнан чин формулалар.
4. Келтириб чиқариш ҳақидаги теорема.
5. Мулоҳазалар ҳисобидаги формулалар билан мулоҳазалар алгебрасидаги формулалар орасидаги муносабатлар.

8- §. Мулоҳазалар ҳисобида ечилиш, зидсизлик, тўлиқлилик ва эркинлик муаммолари



Ечилиш муаммоси. Зидсизлик муаммоси. Тўлиқлилик муаммоси. Эркинлик муаммоси. Аксиоматик назария. Тор маънода тўлиқ. Кенг маънода тўлиқ. Эркин аксиома. Эркин аксиомалар системаси. Тенг кучли формулалар.

Ҳар қандай аксиоматик назарияни асослаш учун қуйидаги тўртта муаммони ҳал қилишга тўғри келади:

- 1) ечилиш;
- 2) зидсизлик;
- 3) тўлиқлилик;
- 4) эркинлик.

8.1. Мулоҳазалар ҳисобининг ечилиш муаммоси. Мулоҳазалар ҳисобидаги ихтиёрий формулани исботланувчи ёки исботланувчи эмаслигини аниқлаб берувчи алгоритмнинг мавжудлигини исботлаш муаммоси мулоҳазалар ҳисобининг ечилиш муаммоси деб аталади.

1-теорема. *Мулоҳазалар ҳисоби учун ечилиш муаммоси ҳал қилинувчидир (ечилувчидир).*

Исбот. Олдинги параграфда айтилғандек, мулоҳазалар ҳисобининг исталған формуласини мулоҳазалар алгебрасининг формуласи сифатида қараш мүмкін. Демак, бу формуланинг мантиқий қыйматини ўзгарувларнинг исталған қыйматлар сатрида аниқлаш мүмкін.

A – мулоҳазалар ҳисобининг ихтиёрий формуласи, x_1, x_2, \dots, x_n эса A формуланинг ифодасига киругучи ўзгарувлар бўлсин.

$R_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(A)$ қыйматини ҳамма 2^n та $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ қыйматлар сатрида ҳисоблаб чиқамиз. Агар ҳамма қыйматлар сатрида $R_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(A) = 1$ бўлса, у ҳолда A формула айнан чин бўлади. Демак, 8- § даги 3-теоремага асосан A мулоҳазалар ҳисобининг исботланувчи формуласи бўлади.

Агар шундай $(\alpha_1^0, \alpha_2^0, \dots, \alpha_n^0)$ қыйматлар сатри топилиб, $R_{\alpha_1^0 \dots \alpha_n^0}(A) = 0$ бўлса, у ҳолда A айнан чин формула бўлмайди. У ҳолда 8- § даги 1-теоремага асосан A исботланувчи эмас формуладир.

Шундай қилиб, мулоҳазалар ҳисобининг исталған формуласини исботланувчи ёки исботланувчи эмаслигини кўрсатувчи юқорида баён этилган алгоритм мавжуд экан. Демак, мулоҳазалар ҳисоби алгоритмик ечилювчи назариядир.

8.2. Мулоҳазалар ҳисобининг зидсизлик муаммоси.

1-таъриф. *Агар мулоҳазалар ҳисобининг ихтиёрий A ва \bar{A} формулалари бир пайтда исботланувчи формуналар бўломаса, у ҳолда бундай мулоҳазалар ҳисоби зиддиятсиз аксиоматик назария, акс ҳолда эса зиддиятга эга бўлган аксиоматик назария деб аталади.*

Демак, зиддиятсиз мулоҳазалар ҳисобида A ва унинг инкори бўлган \bar{A} биргаликда исботланувчи формуналар бўла олмайди.

Мулоҳазалар ҳисобида зиддизлик муаммоси қўйидагича қўйилади: берилган мулоҳазалар ҳисоби зиддиятлиликми ёки зиддиятсизликми?

2-төрима. Агар мулоҳазалар ҳисобида исботланувчи A ва \bar{A} формулалар мавжудлиги аниқланса, у ҳолда бу мулоҳазалар ҳисобида исталган B формула ҳам исботланувчи формула бўлади.

Исбот. Бундан кейин ҳар қандай исботланувчи формулани R ва $\bar{R} = F$ билан белгилаймиз.

1. Аввал ҳар қандай B учун

$$\vdash B \rightarrow R \quad (1)$$

формуланинг исботланувчи эканлигини кўрсатамиз.

Ҳақиқатан ҳам, I₁ аксиомадан ўрнига қўйиш натижасида

$$\vdash R \rightarrow (B \rightarrow R) \quad (2)$$

ни ҳосил қиласиз. Аммо шартта кўра R исботланувчи формула, яъни

$$\vdash R. \quad (3)$$

У ҳолда (2) ва (3) формулалардан хulosса қоидасига асосан (1) формуланинг тўғрилиги келиб чиқади.

2. Энди ҳар қандай B учун

$$\vdash F \rightarrow B \quad (4)$$

формуланинг исботланувчи эканлигини тасдиқлаймиз.

Ҳақиқатан ҳам, IV₁ аксиомадан ўрнига қўйиш натижасида

$$\vdash (\bar{B} \rightarrow R) \rightarrow (\bar{R} \rightarrow \bar{\bar{B}}) \quad (5)$$

формула келиб чиқади. Аммо исботлаганимизга асосан

$$\vdash (\bar{B} \rightarrow R). \quad (6)$$

Ўз навбатида (6) ва (5) дан хulosса қоидасига биноан

$$\vdash \bar{R} \rightarrow \bar{\bar{B}} \quad (7)$$

формулани ҳосил қиласиз. Иккия карралик инкор амалини түнириш қоидасидан фойдаланиб ва \bar{R} ни F билан алмаштирилса,

$$\vdash F \rightarrow B$$

формулага эга бўламиз, яъни (4) исботланувчи формула дир.

3. Ҳар қандай A учун

$$\vdash A \wedge \bar{A} \rightarrow F \quad (8)$$

формула исботланувчи эканлигини кўрсатамиз.

Ҳақиқатан ҳам, I, ва IV, аксиомаларга асосан куйидаги лар исботланувчи формуласалар бўлади:

$$\vdash A \rightarrow (R \rightarrow A), \quad (9)$$

$$\vdash (R \rightarrow A) \rightarrow (\bar{A} \rightarrow F). \quad (10)$$

(9) ва (10) дан силлогизм қоидасига биноан

$$\vdash A \rightarrow (\bar{A} \rightarrow F)$$

формулани келтириб чиқарамиз. Бу формуладан асосларни бирлаштириш қоидасини қўллаш натижасида $\vdash A \wedge \bar{A} \rightarrow F$ формулага келамиз, яъни (8) га эга бўламиз.

(4) ва (8) дан силлогизм қоидасига асосан

$$\vdash A \wedge \bar{A} \rightarrow B \quad (11)$$

формулани ҳосил қиласиз. Аммо теореманинг шартига кўра $\vdash A$ ва $\vdash \bar{A}$, у ҳолда $\vdash A \wedge \bar{A}$. Демак, B исботланувчи формула бўлади.

З-төрима. *Мулоҳазалар ҳисоби зиддиятликсиз назариядир.*

Исбот. Мулоҳазалар ҳисобида A ва \bar{A} бир вақтнинг ўзида исботланувчи бўладиган ҳеч қандай A формула мавжуд эмаслигини кўрсатамиз.

A мулоҳазалар ҳисобининг ихтиёрий формуласи бўлсин. Агар A исботланувчи формула бўлса, у ҳолда 7- § даги 1-төро-

ремага асосан A айнан чин формуладир ва, демак \bar{A} айнан ёлғон формула бўлади. Шунинг учун ҳам \bar{A} исботланувчи формула бўлмайди.

Демак, A ва \bar{A} бир вақтда исботланувчи формуладар бўла олмайди. Шунинг учун ҳам мулоҳазалар ҳисоби зиддиятга эга эмас.

8.3. Мулоҳазалар ҳисобининг тўлиқлилик муаммоси.

2-таъриф. *Мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалар системасига шу ҳисобининг бирор ихтиёрий исботланмайдиган формуласини янги аксиома сифатида қўшишдан ҳосил бўладиган аксиомалар системаси зиддиятга эга бўлган мулоҳазалар ҳисобига олиб келса, бундай мулоҳазалар ҳисоби **тор маънодаги тўлиқ аксиоматик назария** деб аталади.*

3-таъриф. *Ҳар қандай айнан чин формуласи исботланувчи формула бўладиган мулоҳазалар ҳисоби **кенг маънодаги тўлиқ аксиоматик назария** деб аталади.*

Демак, мулоҳазалар ҳисобининг тўлиқлилик муаммоси иккита масалани ҳал қилиши керак:

1) янги аксиома сифатида бирор исботланмайдиган формуласини аксиомалар системасига қўшиш натижасида мулоҳазалар ҳисобини кентгайтириш мумкинми ёки йўқми?

2) мулоҳазалар алгебрасининг ҳар қандай айнан чин формуласи мулоҳазалар ҳисобида исботланувчи бўладими ёки йўқми?

Бу масалаларнинг ечими қўйидаги теоремаларнинг мазмунидан иборат.

4-теорема. *Мулоҳазалар ҳисоби тор маънода тўлиқдир.*

Исбот. A мулоҳазалар ҳисобидаги ихтиёрий исботланмайдиган (исботланувчи эмас) формула, x_1, x_2, \dots, x_n эса A формула таркибиغا кирувчи ўзгарувчилар бўлсин. A исботланмайдиган формула эканлигидан у айнан чин формула эмас. Демак, x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларнинг шундай $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ қийматлар сатри мавжудки,

$$R_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n} (A(x_1, x_2, \dots, x_n)) = 0 \quad (12)$$

бўлади.

B_1, B_2, \dots, B_n лар x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларга боғлиқ ихтиёрий айнан чин формулалар бўлсин. $B_1^{\alpha_1}, B_2^{\alpha_2}, \dots, B_n^{\alpha_n}$ мажмумани (наборни) қараймиз. Бу ерда

$$B_i^{\alpha_i} = \begin{cases} B_i, & \text{агар } \alpha_i = 1 \text{ бўлса,} \\ \overline{B}_i, & \text{агар } \alpha_i = 0 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

A формулада $\int(A)_{x_1, x_2, \dots, x_n}^{B_1^{\alpha_1}, B_2^{\alpha_2}, \dots, B_n^{\alpha_n}}$ ўрнига қўйишни бажариб, ушбу

формулага эга бўламиш:

$$A(B_1^{\alpha_1}, B_2^{\alpha_2}, \dots, B_n^{\alpha_n}). \quad (13)$$

(12) формуланинг айнан ёлғон формула эканлигини кўрсатамиз. x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларнинг ихтиёрий $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ қийматлар сатрини оламиш. B_1, B_2, \dots, B_n формулалар айнан чин формулалар эканлигидан $R_{\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n}(B_i) = 1$ бўлади. У ҳолда $R_{\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n}(B_i^{\alpha_i}) = \alpha_i$ ўринли. Демак,

$$R_{\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n} A(B_1^{\alpha_1}, B_2^{\alpha_2}, \dots, B_n^{\alpha_n}) = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0.$$

Бу ердан $\overline{A(B_1^{\alpha_1}, B_2^{\alpha_2}, \dots, B_n^{\alpha_n})}$ нинг айнан чин формула эканлиги келиб чиқади ва у 7- § даги 3- теоремага асосан исботланувчи формула бўлади.

Иккинчи томондан, агар мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалари қаторига $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ формулани янги аксиома сифатида қўшиб қўйсак, у ҳолда янги ҳосил бўлган мулоҳазалар ҳисобида бу формула аксиома бўлганлиги учун исботланувчи формула бўлади. Шу вақтнинг ўзида янги мулоҳазалар ҳисобида $A(B_1^{\alpha_1}, B_2^{\alpha_2}, \dots, B_n^{\alpha_n})$ формула ҳам исботланувчи формула бўлади, чунки у исботланувчи формуладан ўрнига қўйиш қоидаси орқали ҳосил қилинган.

Шундай қилиб, янги мулоҳазалар ҳисобида иккита $A(B_1^{\alpha_1}, B_2^{\alpha_2}, \dots, B_n^{\alpha_n})$ ва $A(B_1^{\alpha_1}, B_2^{\alpha_2}, \dots, B_n^{\alpha_n})$ исботланувчи формулага эга бўламиз. Демак, янги мулоҳазалар ҳисоби зиддиятга эга бўлган аксиоматик назария экан. Бу ердан унинг тор маънода тўлиқлиги келиб чиқади.

5-теорема. *Мулоҳазалар ҳисоби кенг маънода тўлиқдир.*

Исбот. Биз 7- параграфда (3- теорема) мулоҳазалар алгебрасининг ҳар бир айнан чин формуласи мулоҳазалар ҳисобида исботланувчи формула эканлигини исбот қилган эдик. Демак, мулоҳазалар ҳисоби кенг маънода тўлиқдир.

8.4. Мулоҳазалар ҳисоби аксиомаларининг эркинлик муаммоси. Ҳар қандай аксиоматик ҳисобда аксиомаларининг эркинлик масаласи, яъни бирорта аксиомани системанинг қолган аксиомаларидан келтириб чиқариш қоидаси орқали хосил этиш мумкинми ёки йўқми деган муаммо мавжуд бўлади. Агар бирор аксиома учун бу масала ижобий ҳал этилса, у ҳолда бу аксиома система аксиомалари рўйхатидан чиқариб ташланади ва мантиқий ҳисоб бу билан ўзгармайди, яъни исботланувчи формулалар синфи ўзгармасдан қолади.

4-таъриф. *Агар A аксиомани мулоҳазалар ҳисобининг қолган аксиомаларидан келтириб чиқариш мумкин бўлmasa, у шу мулоҳазалар ҳисобининг бошқа аксиомаларидан эркин аксиома деб аталади.*

5-таъриф. *Агар мулоҳазалар ҳисоби аксиомалар системанинг ҳар бир аксиомаси эркин бўлса, у ҳолда мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалар системаси эркин деб аталади.*

6-теорема. *Мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалар системаси эркиндир.*

Исбот. A мулоҳазалар ҳисобининг ихтиёрий аксиомаси бўлсин. Бу аксиоманинг эркинлигини исботлаш учун мулоҳазалар ҳисобига нисбатан қўйидаги усулни қўллаймиз: мулоҳазалар ҳисоби ўзгарувчиларини α ёки β қиймат қабул қилувчи ўзгарувчилар сифатида қараймиз. Бу ерда α чин ролини ва β ёлғон ролини ўйнайди.

\wedge , \vee , \rightarrow , \neg амалларни шундай аниқлаймизки, қуйидаги шартлар ўринли бўлсин:

1) A аксиомадан ташқари системаниң ҳамма аксиомалари таркибидаги ўзгарувчиларниң барча қийматларида фақат α қийматни қабул қиласин;

2) A аксиомадан бошқа, аксиомалар мажмуасидан келтириб чиқарилган ҳар қандай формула ҳам таркибидаги ўзгарувчиларниң барча қийматларида фақат α қийматни қабул қиласин;

3) A аксиома таркибидаги ўзгарувчиларниң айрим қийматларида β қийматни қабул қиласин.

Агар A аксиомага нисбатан юқорида келтирилган интерпретация (изоҳдаш) ўринли бўлса, у ҳолда A аксиома бошқа аксиомалардан эркин эканлиги келиб чиқади. Ҳақиқатан ҳам, агар A аксиомани мулоҳазалар ҳисобининг бошқа аксиомаларидан келтириб чиқариш мумкин бўлганда эди, у шартларниң иккинчисига асосан таркибидаги ўзгарувчиларниң барча қийматларида фақат α қийматни қабул қилиб, бу эса 3- шартга зид бўлар эди. Демак, A аксиомани мулоҳазалар ҳисобининг бошқа аксиомаларидан келтириб чиқариш мумкин эмас ва у системадаги эркин аксиомадир.

Ўзгарувчиларининг ўрнига уларниң айрим қийматлари қўйилганда ҳам формулалар маънога эга деб келишамиз. Масалан, $\alpha \wedge \beta$, $\alpha \rightarrow A$, $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$ ва бошқалар.

6-таъриф. Таркибидаги ўзгарувчиларни α ва β билан алмаштирганда бир хил қиймат қабул қилувчи A ва B формуласлар тенг кучли формулалар деб аталади ҳамда бу $A = B$ кўришида ёзилади.

Тенглик белгиси \wedge , \vee , \rightarrow мантиқий боғловчиларга нисбатан сурʼоқ боғлайди деб ҳисоблаймиз.

Энди II, аксиоманиң эркинлигини исбот қиласилик. Бунинг учун конъюнкциядан ташқари қолган ҳамма мантиқий амалларни худди мантиқ алгебрасидагидек ва конъюнкция амалини $x \wedge y = y$ тенглик орқали аниқлаймиз:

x	x
α	β
β	α

x	y	$x \vee y$	$x \rightarrow y$	$x \wedge y$
α	α	α	α	α
α	β	α	β	β
β	α	α	α	α
β	β	β	α	β

Ушбу интерпретация учун юқорида көлтирилған учта шартнинг бажарилишини күрсатамиз.

Π_1 аксиомадан ташқари мулоҳазалар ҳисобининг қолған ҳамма аксиомалари ўзгарувчиларнинг барча қийматла-рида α қиймат қабул қиласы (бу ҳолни чинлик жадвали ор-қали күрсатиш мүмкін).

Ҳақиқатан ҳам I, III ва IV гурұх аксиомаларида конъ-юнкция амали қатнашмайды. Қолған мантиқий амаллар худди мулоҳазалар алгебрасидагидек аникданған.

Мулоҳазалар алгебрасида бу формулалар айнан чин формулашар бўлғанилигидан, ушбу интерпретацияда ўзгарувчи-ларнинг барча қийматларида улар α қиймат қабул қиласы.

Π_1 , Π_2 ва Π_3 аксиомаларни кўрайлик.

Π_2 ва Π_3 аксиомалар қабул қилинган интерпретацияда $y \rightarrow y$ формулага тенг бўлади ва $x = \beta$, $x = \alpha$ қийматларда β қий-мат қабул қиласы, яъни ҳеч қачон α қиймат қабул қilmайди.

Энди айнан α га тент формулалардан көлтириб чиқа-риш қоидасига асосан ҳосил қилинган формулалар ҳам α га тентлигини күрсатиш қолди, яъни 2- шартнинг бажарили-шини күрсатиш керак.

Олдинги параграфларда айнан чин формулаларга ўрни-га қўйиш ва хулоса қоидаларини қўллаш натижасида чиқа-рилган формулалар айнан чин формулалар бўлишини күрсат-ган эдик. Демак, 2- шарт ҳам бажарилади. Шундай қилиб, мулоҳазалар ҳисобининг Π_1 аксиомаси эркин аксиома экан.

Худди шу схемадан фойдаланиб, мулоҳазалар ҳисоби-нинг I, II, III ва IV гурӯҳларидаги ҳар бир аксиоманинг эркинлигини күрсатиш мүмкін. Демак, мулоҳазалар ҳисо-бининг аксиомалар системаси эркиндир.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Ҳар қандай аксиоматик назарияни асослаш учун нечта муаммоларни кўриб чиқишига тўғри келади?
2. $A(x)$ ва $B(x)$ ихтиёрий предикатлар бўлсин. Куйидаги формулаларнинг қайси бири $A(x) \rightarrow \overline{B(x)}$ формулага тенг кучли формула бўлади:
 - 1) $A(x) \vee B(x);$
 - 2) $\overline{A(x)} \vee \overline{B(x)};$
 - 3) $\overline{A(x)} \rightarrow B(x);$
 - 4) $\overline{B(x)} \rightarrow A(x);$
 - 5) $\overline{\overline{A(x)} \wedge B(x)};$
 - 6) $\overline{A(x) \wedge \overline{B(x)}};$
 - 7) $B(x) \rightarrow \overline{A(x)}.$
3. Куйидаги тасдиқлар(теоремалар)нинг нотўғрилигини исбот қилинг:
 - 1) агар функция x_n нуқтада узлуксиз бўлса, у ҳолда у шу нуқтада дифференциалланувчи бўлади;
 - 2) агар сонли қаторнинг n -ҳади нолга тенг бўлса, у ҳолда бу қатор яқинлашувчи бўлади;
 - 3) агар тўртбурчакнинг диагоналлари тент бўлса, у ҳолда бу тўртбурчак тўғри бурчакли бўлади;
 - 4) агар $[a, b]$ ёпиқ интервалда интегралланувчи бўлса, у ҳолда у шу интервалда узлуксиз бўлади.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Мулоҳазалар ҳисобининг ечилиш муаммоси.
2. Мулоҳазалар ҳисобининг зидсизлик муаммоси.
3. Мулоҳазалар ҳисобининг тўлиқлилик муаммоси.
4. Мулоҳазалар ҳисоби аксиомаларининг эркинлик муаммоси.
5. Аксиоматик назария ҳақида тушунча.
6. Тор маънода тўлиқ. Кеңг маънода тўлиқ.
7. Эркин аксиомалар системаси. Тенг кучли формулалар.

Күйидаги бобда предикатлар мантиқи баён этилған. Бу ерда предикат түшунчаси, предикатлар устида мантиқий амаллар, умумийлик ва мавжудлық кванторлари, предикатлар мантиқининг формуласи ва унинг қиймати, предикатлар мантиқининг тенг күчли формулалари, предикатлар мантиқи формуласининг нормал шакли, бажарилувчи ва умум-қийматли формулалар, ечилиш муаммоси, хусусий ҳолларда формуланинг умумқийматлилигини топиш алгоритмлари, предикатлар мантиқининг математикага табиқи, аксиоматик предикатлар ҳисоби ҳақида маълумотлар келтирілади.

1- §. Предикат түшунчаси. Предикатлар устида мантиқий амаллар

- Предикат. Предикатлар мантиқи. Бир жойлы предикат. Күп жойлы предикат. Предикатнинг чинлик түплами. Айнан чин предикат. Айнан ёлғон предикат. Предикатлар устида мантиқий амаллар.*

1.1. Предикат түшунчаси. Мантиқ алгебрасыда мұлоҳазалар фақат чин ёки ёлғон қиймат олиши нүқтai назаридан қаралади. Мұлоҳазаларнинг на структураси ва ҳатто на мазмуни қаралмайды. Аммо фанда ва амалиётда мұлоҳазаларнинг структураси ва мазмунидан келиб чиқадиган хуласалардан (натижалардан) фойдаланылади. Масалан, «Хар қандай ромб параллелограммдир; $ABCD$ – ромб; демек, $ABCD$ – параллелограмм».

Асос (шарт) ва хуласа мұлоҳазалар мантиқининг элементар мұлоҳазалари бўлади ва уларни бу мантиқ нүқтai назаридан бўлинмас, бир бутун деб ва уларнинг ички структурасини ҳисобга олмасдан қаралади. Шундай қилиб, мантиқ алгебраси мантиқининг муҳим қисми бўлишига қара-

масдан, күпгина фикрларни таҳлил қилишга қодир (етарли) эмас. Шунинг учун ҳам мuloҳазалар мантиқини көнтайтириш масаласи вужудга келди, яъни элементар мuloҳазаларнинг ички структурасини ҳам тадқиқ эта оладиган мантикий системани яратиш муаммоси пайдо бўлди. Бундай система мuloҳазалар мантиқини ўзининг бир қисми сифатида бутунлайига ўз ичига оладиган предикатлар мантиқидир.

Предикатлар мантиқи анъанавий формал мантиқ сингари элементар мuloҳазани *субъект* ва *предикат* қисмларга бўлади.

Субъект – бу мuloҳазада бирор нарса ҳақида нимадир тасдиқлайди; *предикат* – бу субъектни тасдиқлаш. Масалан, «5 – туб сон» мuloҳазасида «5» – субъект, «туб сон» – предикат. Бу мuloҳазада «5» «туб сон бўлиш» хусусиятига эга эканлиги тасдиқланади.

Агар келтирилган мuloҳазада маълум 5 сонини натурал сонлар тўпламидаги x ўзгарувчи билан алмаштирасак, у ҳолда « x – туб сон» кўринишидаги мuloҳаза формасига (шаклига) эга бўламиз. x ўзгарувчининг бир хил қийматлари (масалан, $x = 13, x = 3, x = 19$) учун бу форма чин мuloҳазалар ва x ўзгарувчининг бошқа қийматлари (масалан, $x = 10, x = 20$) учун бу форма ёлғон мuloҳазалар беради.

Аниқки, бу форма бир x аргументли функцияни аниқлайди. Бу функцияning аниқланиши соҳаси натурал сонлар тўплами N ва қийматлар соҳаси $\{1, 0\}$ тўплам бўлади.

1-таъриф. *M* тўпламда аниқланган ва $\{1, 0\}$ тўпламдан қиймат қабул қилувчи бир аргументли $P(x)$ функция бир жойли (бир ўринли) предикат деб аталади.

M тўпламни $P(x)$ предикатнинг аниқланиши соҳаси деб айтамиз.

$P(x)$ предикат чин қиймат қабул қилувчи ҳамма $x \in M$ элементлар тўплами $P(x)$ предикатнинг чинлик тўплами деб аталади, яъни $P(x)$ предикатнинг чинлик тўплами $I_p = \{x : x \in M, P(x) = 1\}$ тўпламдир.

Масалан, « x – туб сон» – $P(x)$ предикати N натурал сонлар түпламида аниқланган ва унинг I_p чинлик түплами ҳамма туб сонлар түпламидан иборат. $\{\sin x = 0\} = Q(x)$ предикати R ҳақиқий сонлар түпламида аниқланган ва унинг I_q чинлик түплами $I_q = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. «Параллелограмм диагоналлари x бир-бирига перпендикулярдир» – $\Phi(x)$ предикатнинг аниқланиш соҳаси ҳамма параллелограммлар түплами ва чинлик түплами ҳамма ромблар түплами бўлади.

Бир жойли предикатларга юқорида келтирилган мисоллар предметларнинг хусусиятларини ифодалайди.

2-таъриф. Агар M түпламда аниқланган $P(x)$ предикат учун $I_p = M (I_p = \emptyset)$ бўлса, у айнан чин (айнан ёғон) деб аталаади.

Энди кўп жойли предикат тушунчасини аниқлаймиз. Кўп жойли предикат предметлар орасидаги муносабатни аниқлайди.

«Кичик» муносабати икки предмет орасидаги бинар муносабатни ифодалайди. $\{x < y\}$ (бу ерда $x, y \in Z$) бинар муносабати икки аргументли $P(x, y)$ функцияни ифодалайди. Бу функция $Z \times Z$ түпламда аниқланган ва қийматлар соҳаси $\{1, 0\}$ түплам бўлади.

3-таъриф. $M = M_1 \times M_2$ түпламда аниқланган ва $\{1, 0\}$ түпламдан қиймат олувчи икки аргументли $P(x, y)$ функцияга икки жойли предикат деб аталаади.

Масалан, $\{x = y\} = Q(x, y)$ икки жойли предикат $R^2 = R \times R$ түпламда аниқланган; $\{x \perp y\} = x$ тўғри чизиқ у тўғри чизиқга перпендикуляр – $F(x, y)$ икки жойли предикат бир текисликда ётувчи тўғри чизиқлар түпламида аниқланган.

n -жойли предикат ҳам худди шундай аниқланади.

1-мисол. Қуйида берилган мулоҳазаларнинг қайси бири предикат бўлишини ва уларнинг чинлик түпламини аниқланг. Бир жойли предикатларнинг аниқланиш соҳаси $M = R$ ва икки жойли предикатлар учун аниқланиш соҳаси $M = R \times R$ бўлсин:

- 1) $x + 5 = 1$; 2) $x^2 - 2x + 1 = 0$; 3) $x + 2 < 3x - 4$;
 4) $(x + 2) - (3x - 4)$; 5) $x^2 + y^2 > 0$.

Е ч и м. 1) Бу берилган ифода бир жойли предикат $A(x)$ бўлади ва $I_A = \{-4\}$;

2) ифода билан берилган мулоҳаза бир жойли предикат $A(x)$ бўлади ва $I_A = \{1\}$;

3) ифода билан берилган мулоҳаза бир жойли предикат $A(x)$ бўлади ва $I_A = \{3, +\infty\}$;

4) ифода билан берилган мулоҳаза предикат бўлмайди;

5) берилган ифода икки жойли предикат $A(x, y)$ бўлади ва $I_A = R \times R \setminus \{0, 0\}$.

2- м и с о л. Куйидаги предикатларнинг қайси бири айнан чин бўлишини аниқланг:

- 1) $x^2 + y^2 \geq 0$; 2) $x^2 + y^2 > 0$; 3) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$;
 4) $(x + 1)^2 > x - 1$; 5) $x^2 + 1 \geq (x + 1)^2$.

Е ч и м. Равшанки, 1, 3 ва 4- предикатлар айнан чин бўлади. 2- предикатда $x = 0, y = 0$ қийматларида тенгсизлик бузилади. 5- предикатда бўлса, x нинг ҳамма мусбат қийматларида тенгсизлик ишораси бузилади. Демак, 2 ва 5- предикатлар айнан чин предикатлар бўла олмайди.


3- м и с о л. $M = M_1 \times M_2 \subset R \times R$ тўпламда $A(x, y)$ ва $B(x, y)$ предикатлар берилган бўлсин. $A(x, y) \leftrightarrow B(x, y)$ предикатнинг чинлик тўпламини топинг ва уни Эйлер доиралари орқали ифодаланг.

Е ч и м.

$A(x, y) \leftrightarrow B(x, y) = (A(x, y) \rightarrow B(x, y)) \wedge (B(x, y) \rightarrow A(x, y))$
 бўлганлиги учун

$$\begin{aligned} I_{A \leftrightarrow B} &= (I_{A \rightarrow B}) \cap (I_{B \rightarrow A}) = ((CI_A \cup I_B) \cap (CI_B \cup I_A)) = \\ &= (I_A \cap I_B) \cup (CI_A \cap CI_B). \end{aligned}$$

$I_A \leftrightarrow I_B$ чинлик тўплами IV.1- шаклда штрихланган соҳа сифатида кўрсатилган.



IV.1- шакл.

1.2. Предикатлар устида мантиқий амаллар. Предикатлар ҳам мuloҳазалар сингари фақатгина чин ва ёлғон ($1, 0$) қийматлар қабул қылғанлыктари туфайли улар устида мuloҳазалар мантиқидаги ҳамма мантиқий амалларни бажариш мүмкін.

Бир жойли предикатлар мисолида мuloҳазалар мантиқидаги мантиқий амалларнинг предикатларга татбиқ этилишини күраймын.

M түпламда $P(x)$ ва $Q(x)$ предикатлар аниқланган бўлсин.

4-тәъриф. *Берилган M түпламда аниқланган $P(x)$ ва $Q(x)$ предикатларнинг конъюнкцияси деб, фақат ва фақат $x \in M$ қийматларда аниқланган ҳамда $P(x)$ ва $Q(x)$ лар бир вақтда чин қиймат қабул қылғандагина чин қиймат қабул қилиб, қолган барча ҳолларда ёлғон қиймат қабул қилувчи янги предикатга айтилади ва у $P(x) \wedge Q(x)$ каби белгиланади.*

$P(x) \wedge Q(x)$ предикатнинг чинлик соҳаси $I_P \cap I_Q$ түпламдан, яъни $P(x)$ ва $Q(x)$ предикатлар чинлик соҳаларининг умумий қисмидан иборат бўлади.

Масалан, $P(x)$: « x – жуфт сон» ва $Q(x)$: « x – тоқ сон» предикатлар учун « x – жуфт сон ва x – тоқ сон» : $P(x) \wedge Q(x)$ предикатлар конъюнкцияси мос келади ва унинг чинлик соҳаси \emptyset бўш түпламдан иборат бўлади.

5- таъриф. *Берилган M түпламда аниқланган $P(x)$ ва $Q(x)$ предикатларнинг дизъюнкцияси деб, фақат ва фақатгина $x \in M$ қийматларда аниқланган ҳамда $P(x)$ ва $Q(x)$ предикатлар*

Әлғон қиймат қабул қылғанда әлғон қиймат қабул қилиб, қолған барча ҳолларда чин қиймат қабул қылувчи янги предикатта шытлади ва у $P(x) \vee Q(x)$ каби белгиланади.

$P(x) \vee Q(x)$ предикаттің чинлик соңаси $I_p \cup I_q$ түплемдан иборат бўлади.

6 - таъриф. Агар ҳамма $x \in M$ қийматларда $P(x)$ предикат чин қиймат қабул қылғанда әлғон қиймат ва $x \in M$ нинг барча қийматларида $P(x)$ предикат әлғон қиймат қабул қылғанда чин қиймат қабул қылувчи предикат $P(x)$ предикаттің инкори деб аталади ва у $\bar{P}(x)$ каби белгиланади.

Бу таърифдан $I_{\bar{P}} = M \setminus I_p = CI_p$ келиб чиқади.

7- таъриф. Фақат ва фақатгина $x \in M$ лар учун бир ақтда $P(x)$ чин қиймат ва $Q(x)$ әлғон қиймат қабул қылғанда әлғон қиймат қабул қилиб, қолған ҳамма ҳолларда чин қиймат қабул қыладиган $P(x) \rightarrow Q(x)$ предикат $P(x)$ ва $Q(x)$ предикаттарнинг импликацияси деб аталади.

Ҳар бир тайинланган $x \in M$ учун

$$P(x) \rightarrow Q(x) \equiv \bar{P}(x) \vee Q(x)$$

тенг кучлилик тўғри бўлганлигидан $I_{P \rightarrow Q} = I_{\bar{P}} \cup I_Q = CI_p \cup I_Q$ ўринлидир.

2- §. Умумийлик ва мавжудлик кванторлари

Умумийлик квантори. Мавжудлик квантори. Кванторли амаллар билан конъюнкция ва дизъюнкция амаллари орасидаги муносабат.

M тўпламда аниқланган $P(x)$ предикат берилган бўлсин. Агар $a \in M$ ни $P(x)$ предикаттің x аргументи ўрнига кўйсак, у ҳолда бу предикат $P(a)$ мулоҳазага айланади.

Предикатлар мантиқида яна иккита амал мавжудки, улар бир жойли предикатни мулоҳазага айлантиради.

2.1. Умумийлик квантори. M тўпламда аниқланган $P(x)$ предикат берилган бўлсин. Ҳар қандай $x \in M$ учун $P(x)$ чин

ва акс ҳолда ёлғон қиймат қабул қилувчи муроҳаза ифодасини $\forall xP(x)$ формада ёзамиз. Бу муроҳаза энди x га боғлиқ бўлмай қолади ва у қуйидагича ўқилади: «Ҳар қандай x учун $P(x)$ чин». \forall символи *умумийлик квантори* деб айтилади. Айтилган фикрларни математик тилда қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\forall xP(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар ҳамма } x \in M \text{ учун } P(x) = 1 \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда.} \end{cases}$$

$P(x)$ предикатда x ни эркин (*озод*) ўзгарувчи ва $\forall xP(x)$ муроҳазада x ни умумийлик квантори \forall билан боғланган ўзгарувчи деб аталади.

2.2. Мавжудлик квантори. $P(x)$ предикат M тўпламда аниқланган бўлсин. Ҳеч бўлмаганда бирорта $x \in M$ учун $P(x)$ предикат чин ва акс ҳолда ёлғон қиймат қабул қилувчи муроҳаза ифодасини $\exists xP(x)$ шаклда ёзамиз. Бу муроҳаза x га боғлиқ эмас ва уни қуйидагича ўқиш мумкин: «Шундай x мавжудки, $P(x) = 1$ », яъни

$$\exists xP(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар бирор } x \in M \text{ учун } P(x) = 1 \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда.} \end{cases}$$

\exists символи *мавжудлик квантори* деб аталади. $\exists xP(x)$ муроҳазада x ўзгарувчи \exists квантори билан боғланган бўлади.

Масалан, N натурал сонлар тўпламида $P(x)$ предикат берилган бўлсин: « x – туб сон». Кванторлардан фойдаланиб ушбу предикатдан қуйидаги муроҳазаларни ҳосил қилиш мумкин: $\forall xP(x)$ – «Ҳамма натурал сонлар туб сонлар бўлади»; $\exists xP(x)$ – «Шундай натурал сон мавжудки, у туб сон бўлади». Равшанки, биринчи муроҳаза ёлғон ва иккинчи муроҳаза чин бўлади.

Маълумки, $\forall xP(x)$ муроҳаза фақат $P(x)$ айнан чин предикат бўлгандагина чин қиймат қабул қиласи. $\exists xP(x)$ муроҳаза бўлса, $P(x)$ айнан ёлғон предикат бўлгандагина ёлғон қиймат қабул қиласи.

Кванторлы амаллар күп жойли предикатларга ҳам құлланылади. Масалан, M түпнамда икки жойли $P(x, y)$ предикат берилген бўлсинг. Агар $P(x, y)$ предикатга x ўзгарувчи бўйича кванторлы амалларни қўлласак, у ҳолда икки жойли $P(x, y)$ предикатга бир жойли $\forall xP(x, y)$ (ёки бир жойли $\exists xP(x, y)$) предикатни мос қилиб қўяди.

Бир жойли $\forall xP(x, y)$ ($\exists xP(x, y)$) предикат факат у ўзгарувчига боғлиқ ва x ўзгарувчига боғлиқ эмас бўлади. Уларга y бўйича кванторлы амалларни қўллаганимизда қўйидаги мулоҳазаларга эга бўламиш:

$$\forall y \forall xP(x, y), \exists y \forall xP(x, y), \forall y \exists xP(x, y), \exists y \exists xP(x, y).$$

Масалан, тўғри чизиқлар түпламида аниқланган $P(x, y)$: « $x \perp y$ » предикатни кўрайлик. Агар $P(x, y)$ предикаттага нисбатан кванторлы амалларни татбиқ этсак, у ҳолда қўйидаги саккизта мулоҳазага эга бўламиш:

1. $\forall x \forall yP(x, y)$ – «Ҳар қандай x тўғри чизиқ ҳар қандай y тўғри чизиққа перпендикуляр».

2. $\exists y \forall xP(x, y)$ – «Шундай y тўғри чизиқ мавжудки, у ҳар қандай x тўғри чизиққа перпендикуляр».

3. $\forall y \exists xP(x, y)$ – «Ҳар қандай y тўғри чизиқ учун шундай x тўғри чизиқ мавжудки, x тўғри чизиқ y тўғри чизиққа перпендикуляр».

4. $\exists y \exists xP(x, y)$ – «Шундай y тўғри чизиқ ва шундай x тўғри чизиқ мавжудки, x тўғри чизиқ y тўғри чизиққа перпендикуляр».

5. $\forall y \forall xP(x, y)$ – «Ҳар қандай y тўғри чизиқ ҳар қандай x тўғри чизиққа перпендикуляр».

6. $\forall x \exists yP(x, y)$ – «Ҳар қандай x тўғри чизиқ учун шундай y тўғри чизиқ мавжудки, x тўғри чизиқ y тўғри чизиққа перпендикуляр».

7. $\exists x \exists yP(x, y)$ – «Шундай x тўғри чизиқ ва шундай y тўғри чизиқ мавжудки, x тўғри чизиқ y тўғри чизиққа перпендикуляр».

8. $\exists x \forall yP(x, y)$ – «Шундай x тўғри чизиқ мавжудки, у ҳар қандай y тўғри чизиққа перпендикуляр».

Бу мисоллардан күриниб турибдики, умумий ҳолда кванторлар тартиби ўзгариши билан мулоҳазанинг мазмуни ва, демак, унинг мантиқий қиймати ҳам ўзгаради.

Чекли сондаги элементлари бўлган $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ тўпламда аниқланган $P(x)$ предикат берилган бўлсин. Агар $P(x)$ предикат айнан чин бўлса, у ҳолда $P(a_1), P(a_2), \dots, P(a_n)$, мулоҳазалар ҳам чин бўлади. Шу ҳолда $\forall x P(x)$ мулоҳаза ва $P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n)$ конъюнкция ҳам чин бўлади.

Агар ҳеч бўлмагандага бирорта $a_k \in M$ элемент учун $P(a_k)$ ёлғон бўлса, у ҳолда $\forall x P(x)$ мулоҳаза ва $P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n)$ конъюнкция ҳам ёлғон бўлади. Демак,

$$\forall x P(x) = P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n)$$

тент кучли ифода тўғри бўлади.

Юқоридагидек фикр юритиш йўли билан

$$\exists x P(x) = P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n)$$

тент кучли ифоданинг мавжудлигини кўрсатиши мумкин. Бу ердан кванторли амалларни чексиз соҳаларда конъюнкция ва дизъюнкция амалларининг умумлашмаси сифатида қараш мумкинлиги келиб чиқади.



Муаммоли масала ва топшириқлар

- $M = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ тўпламда иккита $A(x)$: « x – туб сон» ва $B(x)$: « x – тоқ сон» предикати берилган. Бу предикатларнинг чинлик жадвалини тузинг.
- $M = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ тўпламда қўйидаги предикатлар берилган: $A(x)$: « x сон 5 га бўлишимайди»; $B(x)$: « x – жуфт сон»; $C(x)$: « x – туб сон»; $D(x)$: « x сон 3 га каррага». Қўйидаги предикатларнинг чинлик тўпламини топинг:
 - 1) $A(x) \wedge B(x);$ 2) $C(x) \wedge B(x);$ 3) $C(x) \wedge D(x);$
 - 4) $B(x) \wedge D(x);$ 5) $\overline{B(x)} \wedge D(x);$ 6) $A(x) \wedge \overline{D(x)}$;
 - 7) $\overline{B(x)} \wedge \overline{D(x)};$ 8) $A(x) \wedge B(x) \wedge D(x);$ 9) $A(x) \vee B(x);$
 - 10) $B(x) \vee C(x);$ 11) $C(x) \vee D(x);$ 12) $B(x) \vee D(x);$

- 13) $\overline{B(x)} \vee D(x)$; 14) $B(x) \wedge \overline{D(x)}$; 15) $A(x) \vee B(x) \vee D(x)$;
- 16) $C(x) \rightarrow A(x)$; 17) $D(x) \rightarrow \overline{C(x)}$; 18) $A(x) \rightarrow B(x)$;
- 19) $(A(x) \wedge C(x)) \rightarrow \overline{D(x)}$; 20) $(A(x) \wedge D(x)) \rightarrow \overline{C(x)}$.
3. Р тўпламда $P(x) : x^2 + x + 1 > 0$ ва $Q(x) : x^2 - 4x + 3 = 0$ предикатлар берилган. Қийидаги мулоҳазаларнинг қайси бири чин ва қайси бири ёлғон эканлигини аниқланг:
- 1) $\forall x P(x)$; 2) $\exists x P(x)$; 3) $\forall x Q(x)$; 4) $\exists x Q(x)$.
4. Қийидаги предикатларнинг қайси бири айнан чин қийматга эга бўлади:
- 1) $x^2 + y^2 \geq 0$; 2) $x^2 + y^2 > 0$; 3) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$;
 - 4) $(x+1)^2 > x - 1$; 5) $x^2 + 1 \geq (x+1)^2$.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Предикат тушунчаси. Предикатлар устида мантиқий амаллар.
2. Умумийлик ва мавжудлик кванторлари.
3. Бир жойли ва кўп жойли предикатлар.
4. Предикатнинг чинлик тўплами.
5. Айнан чин ва айнан ёлғон предикатлар.

3- §. Предикатлар мантиқининг формуласи.

**Предикатлар мантиқи формуласининг
қиймати. Предикатлар мантиқининг
тeng кучли формулалари**

- Предикатлар мантиқининг символлари. Формуланинг таърифи. Формуланинг қиймати тушунчаси. Тенг кучли формулалар. Асосий тенг кучли формулалар. Тенг кучли формулаларнинг исботлари.**

Предикатлар мантиқида қийидаги символлардан фойдаланамиз:

1. p, q, r, \dots символлар – 1 (чин) ва 0 (ёлғон) қийматлар қабул қилувчи ўзгарувчи мулоҳазалар.

2. x, y, z, \dots – бирор M түпламдан қиймат олуучи предмет ўзгарувчилар; x_0, y_0, z_0, \dots – предмет константалар, яъни предмет ўзгарувчиларнинг қийматлари.

3. $P(\cdot), F(\cdot)$ – бир жойли ўзгарувчи предикатлар; $Q(\cdot, \cdot, \dots, \cdot), R(\cdot, \cdot, \dots, \cdot)$ – n жойли ўзгарувчи предикатлар.

4. $P^0(\cdot), Q^0(\cdot, \cdot, \dots, \cdot)$ – ўзгармас предикатлар символи.

5. $\wedge, \vee, \rightarrow, -$ – мантиқий амаллар символлари.

6. $\forall x, \exists x$ – кванторли амаллар символлари.

7. $(\ ,)$ (қавс, вергул) – қўшимча символлар.

3.1. Предикатлар мантиқи формуласининг таърифи.

1. Ҳар қандай ўзгарувчи ёки ўзгармас муроҳаза формула (элементар) бўлади.

2. Агар $F(\cdot, \cdot, \dots, \cdot)$ n жойли ўзгарувчи предикат ёки ўзгармас предикат ва x_1, x_2, \dots, x_n предмет ўзгарувчилар ёки предмет константалар бўлса, у ҳолда $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ формула бўлади. Бундай формулани элементар формула деб атаемиз. Бу формулада предмет ўзгарувчилар эркин бўлади, яъни кванторлар билан боғланган бўлмайди.

3. Агар A ва B шундай формулаларки, бирорта предмет ўзгарувчи бирида эркин ва иккинчисида боғланган ўзгарувчи бўлмаса, у ҳолда $A \vee B, A \wedge B, A \rightarrow B$ ҳам формула бўлади. Бу формулаларда дастлабки формулаларда эркин бўлган ўзгарувчилар эркин ва боғланган бўлган ўзгарувчилар боғланган ўзгарувчилар бўлади.

4. Агар A формула бўлса, у ҳолда \bar{A} ҳам формула бўлади. A формуладан \bar{A} формулагага ўтишда ўзгарувчиларнинг характеристи ўзгармайди.

5. Агар $A(x)$ формула бўлса ва унинг ифодасига x предмет ўзгарувчи эркин ҳолда кирса, у ҳолда $\forall x A(x)$ ва $\exists x A(x)$ муроҳазалар формула бўлади ва x предмет ўзгарувчи уларга боғланган ҳолда киради.

6. 1–5- бандларда формулалар деб айтилган муроҳазалардан фарқ қилувчи ҳар қандай муроҳаза формула бўлмайди.

Масалан, агар $P(x)$ ва $Q(x, y)$ – бир жойли ва иккى жойли предикатлар, q, r – ўзгарувчи муроҳазалар бўлса, у ҳолда куйидаги муроҳазалар формуналар бўлади:

$$q, P(x), P(x) \wedge Q(x^0, y), \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x, y),$$

$$(\overline{Q(x, y)} \vee q) \rightarrow r.$$

$\forall x Q(x, y) \rightarrow P(x)$ мулоҳаза формула бўла олмайди, чунки таърифнинг 3- банддаги шарти бузилган: x предмет ўзгарувчи $\forall x Q(x, y)$ формулага боғланган ҳолда кирган, $P(x)$ га эса эркин ҳолда кирган.

Предикатлар мантиқи формуласининг таърифидан кўришиб турибдики, мулоҳазалар алгебрасининг ҳар қандай формуласи предикатлар мантиқининг ҳам формуласи бўлади.

1- мисол. Куйидаги ифодаларнинг қайси бири предикатлар мантиқининг формуласи бўлади? Ҳар бир формулаги боғланган ва эркин ўзгарувчиларни аниқланг:

- 1) $\exists x \forall z (P(x, y) \rightarrow P(y, z));$
- 2) $(p \rightarrow q) \wedge (\bar{r} \vee \bar{p});$
- 3) $P(x) \wedge \forall x Q(x);$
- 4) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \leftrightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \forall x R(x, y));$
- 5) $(P(x) \leftrightarrow Q(x) \vee \exists y (\forall y R(y));$
- 6) $\exists x \forall z (P(x, y) \rightarrow P(y, z)).$

Ечим. 1, 2, 4, 6- ифодалар формула бўлади, чунки улар предикатлар мантиқи формуласининг таърифи асосида ҳосил қилинган. 3 ва 5- ифодалар формула эмас. 3- ифодада \wedge амали $P(x)$ ва $\forall x Q(x)$ формулаларга нисбатан қўлланилган. $P(x)$ да x предмет ўзгарувчи эркин ва $\forall x Q(x)$ да бўлса, умумийлик квантори билан боғланган. Бу ҳолат формула таърифининг 3- бандига зиддир. Шунинг учун 3- ифода формула бўла олмайди. 5- ифодада бўлса, мавжудлик квантори Эу умумийлик квантори тарқалган $\forall y R(y)$ формулага (бу ерда у ўзгарувчи боғланган) тарқалган. Бу ҳам таърифга зиддир. 1- формулада у эркин ўзгарувчи, x ва z ўзгарувчилар бўлса, боғланган. 2- формулада предмет ўзгарувчилар мавжуд эмас. 4- формулада x боғланган ўзгарувчи, у эса эркин ўзгарувчидир.

3.2. Предикатлар мантиқи формуласининг қиймати тушунчаси. Энди предикатлар мантиқи формуласининг қиймати тушунчасини аниқлайлик. Предикатлар мантиқи формуласининг ифодасига кирувчи предикатларнинг аниқлаши соҳаси M тўплам берилгандагина бу формуланинг мантиқий қиймати ҳақида сўз юритиш мумкин. Предикатлар мантиқи формуласининг мантиқий қиймати уч хил ўзгарувчилар: 1) формулага кирувчи ўзгарувчи муроҳазаларнинг; 2) M тўпламдаги эркин предмет ўзгарувчиларнинг; 3) предикат ўзгарувчиларнинг қийматларига боғлиқ бўлади.

Уч хил ўзгарувчилардан ҳар бирининг маълум қийматларида предикатлар мантиқининг формуласи чин ёки ёлғон қиймат қабул қилувчи муроҳазага айланади. Мисол сифатида қуйидаги формулани кўрайлик:

$$\exists y \forall z (P(x, y) \rightarrow P(y, z)). \quad (1)$$

(1) формулада $P(x, y)$ икки жойли предикат $M \times M$ тўпламда аниқланган, бу ерда $M = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$. (1) формула ифодасига ўзгарувчи предикат $P(x, y)$ ва предмет ўзгарувчилар x, y, z кирган. Бу ерда y ва z – кванторлар билан боғланган ўзгарувчилар, x – эркин ўзгарувчи.

$P(x, y)$ предикатнинг маълум қиймати сифатида тайинланган $P^0(x, y)$: « $x < y$ » предикатни оламиз, эркин ўзгарувчи x га $x^0 = 5 \in M$ қиймат берамиз. У ҳолда y нинг $x^0 = 5$ дан кичик қийматлари учун $P^0(x^0, y)$ предикат ёлғон қиймат қабул қиласи, $P(x, y) \rightarrow P(y, z)$ импликация эса z нинг ҳамма $z \in M$ қийматлари учун чин бўлади, яъни $\exists y \forall z (P^0(x, y) \rightarrow P^0(y, z))$ муроҳаза «чин» қийматга эга бўлади.

2-мисол. Натуранал сонлар тўплами N да $P(x)$, $Q(x)$ ва $R(x)$ предикатлар берилган бўлсин. $\forall x (P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x))$ формуланинг қиймати қуйидаги ҳолларда топилсин:

- 1) $P(x)$: « x сон 3 га бўлинади», $Q(x)$: « x сон 4 га бўлинади», $R(x)$: « x сон 2 га бўлинади»;
- 2) $P(x)$: « x сон 3 га бўлинади», $Q(x)$: « x сон 4 га бўлинади», $R(x)$: « x сон 5 га бўлинади».

Е ч и м . Иккала ҳолда ҳам $P(x) \wedge Q(x)$ формула x сон 12 га бўлинади деган тасдиқни ифодалайди. Ўз навбатида, ҳамма x лар учун x сон 12 га бўлинса, у ҳолда x сон 2 га ҳам бўлинади. Демак, 1- ҳолда формуланинг қиймати чин бўлади.

x соннинг 12 га бўлинишидан айрим x лар учун x нинг 2 га бўлиниши, бундан эса 2- ҳолда формуланинг ёлғон ишлариги келиб чиқади.

3- мисол . $P(x, y)$ предикат $M = N \times N$ тўпламда аниқтаган ва $P^c(x, y)$: « x сони y сонидан кичик» бўлганда $\forall x \exists y P(x, y) \rightarrow \exists x \forall y P(x, y)$ формуланинг мантиқий қийматини топинг.

Е ч и м . $P(x, y)$ предикатнинг кўрсатилган қиймати учун $\forall x \exists y P(x, y)$: «ҳар қандай x натурал сон учун шундай y натурал сон топиладики, у x дан катта бўлади» деган чин мулоҳазани билдиради. Шу вақтнинг ўзида $\exists x \forall y P(x, y)$: «Шундай x натурал сон мавжудки, у ҳар қандай натурал сон y дан кичик бўлали» деган тасдиқни билдиради. Бу тасдиқ ёлғондир. Демак, берилган формуланинг мантиқий қиймати ёлғон бўлади.

3.3. Предикатлар мантиқининг тенг кучли формулалари. Предикатлар мантиқида ҳам тент тенг кучли формулалар тушиунчалиси мавжуд.

1- таъриф . Предикатлар мантиқининг иккита A ва B формуласи ўз таркибига кирувчи M соҳага оид ҳамма ўзгарувчиларнинг қийматларида бир хил мантиқий қиймат қабул қиласа, улар M соҳада тенг кучли формулалар деб аталади.

2- таъриф . Агар ихтиёрий соҳада A ва B формулалар тенг кучли бўлса, у ҳолда улар тенг кучли формулалар деб аталади ва $A \equiv B$ кўринишда ёзилади.

Агар мулоҳазалар алгебрасидаги ҳамма тент кучли формулалар ифодасидаги ўзгарувчи мулоҳазалар ўрнига предикатлар мантиқидаги формулалар қўйилса, у ҳолда улар предикатлар мантиқининг тенг кучли формулаларига айланади. Аммо предикатлар мантиқи ҳам ўзига хос асосий тенг куч-

ли формулаларга эга. Бу тенг кучли формулаларнинг асосийларини кўриб ўтайлик. $A(x)$ ва $B(x)$ – ўзгарувчи предикатлар ва C – ўзгарувчи муроҳаза бўлсин. У ҳолда предикатлар мантиқида қўйидаги асосий тенг кучли формулалар мавжуд:

1. $\overline{\forall x A(x)} \equiv \exists x \overline{A(x)}$.
2. $\exists x \overline{A(x)} \equiv \forall x \overline{A(x)}$.
3. $\forall x A(x) \equiv \underline{\exists x \overline{A(x)}}$.
4. $\exists x A(x) \equiv \forall x \overline{A(x)}$.
5. $\forall x A(x) \wedge \forall x B(x) \equiv \forall x [A(x) \wedge B(x)]$.
6. $C \wedge \forall x B(x) \equiv \forall x [C \wedge B(x)]$.
7. $C \vee \forall x B(x) \equiv \forall x [C \vee B(x)]$.
8. $C \rightarrow \forall x B(x) \equiv \forall x [C \rightarrow B(x)]$.
9. $\forall x [B(x) \rightarrow C] \equiv \exists x B(x) \rightarrow C$.
10. $\exists x [A(x) \vee B(x)] \equiv \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$.
11. $\exists x [C \vee B(x)] \equiv C \vee \exists x B(x)$.
12. $\exists x [C \wedge B(x)] \equiv C \wedge \exists x B(x)$.
13. $\exists x A(x) \wedge \exists y B(y) \equiv \exists x \exists y [A(x) \wedge B(y)]$.
14. $\exists x [C \rightarrow B(x)] \equiv C \rightarrow \exists x B(x)$.
15. $\exists x [B(x) \rightarrow C] \equiv \forall x B(x) \rightarrow C$.
16. $\forall x A(x) \equiv \forall y A(y)$.
17. $\exists x A(x) \equiv \exists y A(y)$.

Бу тенг кучли формулаларнинг айримларини исбот қиласилик.

Биринчи тенг кучли формула қўйидаги оддий тасдиқни (далилни) билдиради: агар ҳамма x лар учун $A(x)$ чин бўймаса, у ҳолда шундай x топиладики, $\overline{A(x)}$ чин бўлади.

2- тенг кучлилик: агар $A(x)$ чин бўладиган x мавжуд бўймаса, у ҳолда ҳамма x лар учун $\overline{A(x)}$ чин бўлади деган муроҳазани билдиради.

3 ва 4- тенг кучлиликлар 1 ва 2- тенг кучлиликларнинг иккала тарафидан мос равишда инкор олиб ва икки марта инкор қонунини фойдаланиш натижасида ҳосил бўлади.

5- тенг кучлиликни исбот қиласлий. Агар $A(x)$ ва $B(x)$ предикатлар бир вақтда айнан чин бўлса, у ҳолда $A(x) \wedge B(x)$ предикат ҳам айнан чин бўлади ва, демак,

$$\forall x A(x), \forall x B(x), \forall x [A(x) \wedge B(x)]$$

мулоҳазалар ҳам чин қиймат қабул қиласли.

Шундай қилиб, бу ҳолда 5- тенг кучлиликнинг иккала тарафи ҳам «чин» қиймат қабул қиласли.

Энди ҳеч бўлмагандан икки предикатдан бироргаси, масалан, $A(x)$ айнан чин бўлмасин. У ҳолда $A(x) \wedge B(x)$ предикат ҳам айнан чин бўлмайди ва, демак, $\forall x A(x)$, $\forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$, $\forall x [A(x) \wedge B(x)]$ мулоҳазалар ёлғон қиймат қабул қиласли, яъни бу ҳолда ҳам 5- тенг кучлиликнинг икки тарафи бир хил (ёлғон) қиймат қабул қиласли. Демак, 5- тенг кучлиликнинг тўғри эканлиги исботланди.

Энди 8- тенг кучлиликнинг тўғри эканлигини исбот қиласлий. Ўзгарувчи мулоҳаза $C \rightarrow B(x)$ қиймат қабул қилсин. У ҳолда $C \rightarrow B(x)$ предикат айнан чин бўлади ва $C \rightarrow \forall x B(x)$, $\forall x [C \rightarrow B(x)]$ мулоҳазалар чин бўлади. Демак, бу ҳолда 8- тенг кучлиликнинг иккала тарафи ҳам бир хил (чин) қиймат қабул қиласлилар.

Энди ўзгарувчи мулоҳаза C «чин» қиймат қабул қилсин. Агар бу ҳолда ўзгарувчи предикат $B(x)$ айнан чин бўлса, у ҳолда $C \rightarrow B(x)$ предикат ҳам айнан чин бўлади ва, демак,

$$\forall x B(x), C \rightarrow \forall x B(x), \forall x [C \rightarrow B(x)]$$

мулоҳазалар ҳам чин қиймат қабул қиласли, яъни бу ҳолда 8- тенг кучлиликнинг иккала тарафи ҳам бир хил (чин) қиймат қабул қиласли.

Агар $B(x)$ предикат айнан чин бўлмаса, у ҳолда $C \rightarrow B(x)$ предикат ҳам айнан чин бўлмайди ва, демак,

$$\forall x B(x), C \rightarrow \forall x B(x), \forall x [C \rightarrow B(x)]$$

мулоҳазалар ёлғон қиймат қабул қиласли.

Шундай қилиб, бу ҳолда ҳам 8-тeng күчлиликнинг иккала тарафи бир хил (ёлғон) қиймат қабул қиласи. Демак, 8-тeng күчлилик ўринлидири.

Шуни таъкидлаб ўтамизки, $\forall x[A(x) \vee B(x)]$ формула $\forall xA(x) \vee \forall xB(x)$ формулага ва $\exists x[A(x) \wedge B(x)]$ формула $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ формулага teng кучли эмас.

Аммо, қуйидаги teng күчлиликлар ўринлидири:

$$\begin{aligned} \forall xA(x) \vee \forall xB(x) &\equiv \forall xA(x) \vee \forall yB(y) \equiv \\ &\equiv \forall x[A(x) \vee \forall yB(y)] \equiv \forall x\forall y[A(x) \vee B(y)], \\ \exists xA(x) \wedge \exists xB(x) &\equiv \exists xA(x) \wedge \exists yB(y) \equiv \\ &\equiv \exists x[A(x) \wedge \exists yB(y)] \equiv \exists x\exists y[A(x) \wedge B(y)]. \end{aligned}$$

Бу teng күчлиликлардан биринчисини исбот қилайлик. Бунинг учун $\forall x$ квантор \vee дизьюнкция амалига нисбатан дистрибутив эмаслигини мисолда күрсатайлик.

$$\begin{aligned} M = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad A(x) : «(x - 1)(x - 2) = 0», \\ B(x) : «(x - 3)(x - 4)(x - 5) = 0» \end{aligned}$$

бўлсин. Аниқки, M соҳада $\forall xA(x)$ ва $\forall xB(x)$ мулоҳазалар ёлғон ва, демак, бу teng күчлиликнинг чап томонидаги $\forall xA(x) \vee \forall xB(x)$ мулоҳаза ҳам ёлғондир. Агар $\forall x$ квантор \vee га нисбатан дистрибутив, яъни

$$\forall x[A(x) \vee B(x)] = \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$$

бўлганда эди, $\forall x[A(x) \vee B(x)]$ чин мулоҳаза бўлғанлиги учун қарама-қаршилик ҳосил бўлар эди. Демак,

$$\forall x[A(x) \vee B(x)] \neq \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$$

бўлади.

Энди бу teng күчлиликларнинг ўнг томони ҳар доим чап томонидаги мулоҳаза билан бир хил қиймат қабул қилишини кўрсатамиз. Агар $\forall xA(x) \equiv 1$ ёки $\forall xB(x) \equiv 1$ бўлса, у ҳолда бу teng күчлилик тўғри эканлиги аниқ, чунки бу ҳолда teng күчлиликнинг иккала томони ҳам бир вақтда чин қиймат қабул қиласи. Бу ҳолда фақат $\forall xB(x) \equiv \forall yB(y)$ эканлигини кўрсатиш кифоя. Аммо бу охирги teng күчли-

ник табиийдир, чунки x предмет ўзгарувчи ҳам, y предмет ўзгарувчи ҳам M соҳанинг ҳар бир элементини қиймат сифтида қабул қиласди.

Энди $\forall x A(x) \equiv 0$ ва $\forall x B(x) \equiv 0$ бўлсин. У ҳолда тенг кучлиликнинг чап тарафи 0 (ёлғон) қиймат қабул қиласди. Ўнг томонида $\forall x$ кванторининг таъсир соҳаси $A(x) \vee B(y)$ формула бўлса-да, $B(y)$ предикатда x предмет ўзгарувчи қатнашмаганлиги сабабли, $\forall x$ нинг таъсири фақат $A(x)$ га тарқалади. Худди шу каби, $\forall y$ квантор фақат $B(y)$ га таъсир этади. Демак, $\forall x \forall y [A(x) \vee B(y)]$ формула ҳам ёлғон қийматга эга бўлади.

Келтирилган иккинчи тенг кучлиликни ҳам худди шу каби исбот қилиш мумкин ва буни ўқувчига ҳавола этамиш.

4- мисол. $\exists x \forall y (A(x) \wedge B(y)) \equiv \forall y \exists x (A(x) \wedge B(y))$ тенг кучлилик ўринли эканлигини кўрсатинг.

Ечим.

$$\begin{aligned} \exists x \forall y (A(x) \wedge B(y)) &\equiv \exists x (A(x) \wedge \forall y B(y)) \equiv \exists x A(x) \wedge \forall y B(y), \\ \forall y \exists x (A(x) \wedge B(y)) &\equiv \forall y (\exists x A(x) \wedge B(y)) = \exists x A(x) \wedge \forall y B(y). \end{aligned}$$

Демак, келтирилган тенг кучлилик ўринли экан.

4- §. Предикатлар мантиқи формуласининг нормал шакли. Бажарилувчи ва умумқийматли формулалар

- Формуланинг деярли нормал шакли. Формуланинг нормал шакли. Ҳар қандай формулани нормал шаклга келтириши. Бажарилувчи формулалар. Умумқийматли формулалар. Айнан чин формула. Айнан ёлғон формула. Мантиқ қонуни. Умумқийматли ва бажарилувчи формулалар ҳақидаги теоремалар.

4.1. Предикатлар мантиқи формуласининг нормал шакли.

1-таъриф. Агар предикатлар мантиғи формуласи ифодасида фақат инкор, конъюнкция, дизъюнкция ($-$, \wedge , \vee) амаллари ва кванторли амаллар (\forall , \exists) қатнашиб, инкор амали

элементар формулаларга (предмет ўзгарувчилар ва ўзгарувчи предикатларга) тегишили бўлса, бундай формула деярли нормал шаклда дейилади.

Равшанки, предикатлар мантиқи ва мулоҳазалар алгебрасидаги асосий тенг кучлиликлардан фойдаланиб, предикатлар мантиқининг ҳар бир формуласини деярли нормал шаклга келтириш мумкин. Масалан,

$$(\exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)) \rightarrow R(z)$$

формулани деярли нормал шаклга келтирайлик.

$$\begin{aligned} (\exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)) \rightarrow R(z) &\equiv (\overline{\exists x P(x)} \vee \forall y Q(y)) \rightarrow R(z) \equiv \\ &\equiv (\overline{\exists x P(x)} \vee \forall y Q(y) \vee R(z) = \overline{\exists x P(x)} \wedge \overline{\forall y Q(y)} \vee R(z) \equiv \\ &\equiv \exists x P(x) \wedge \exists y \overline{Q(y)} \vee R(z). \end{aligned}$$

Демак,

$$(\exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)) \rightarrow R(z) \equiv \exists x P(x) \wedge \exists y \overline{Q(y)} \vee R(z).$$

Предикатлар мантиқининг деярли нормал шаклдаги формулалари орасида нормал шаклдаги формулалари муҳим роль ўйнайди.

Бу формулаларда кванторли амаллар ёки бутунлай қатнашмайди, ёки улар мулоҳазалар алгебрасининг ҳамма амалларидан кейин бажарилади, яъни нормал шаклдаги формула қўйидаги қўринишида бўлади:

$$(\sigma x_1)(\sigma x_2) \dots (\sigma x_n) A(x_1, x_2, \dots, x_m), \quad n \leq m,$$

бунда (σx_i) символи ўрнида $\forall x_i$, ёки $\exists x_i$ кванторларнинг бири тушунилди ва A формула ифодасида кванторлар бўлмайди.

1-төрима. Предикатлар мантиқининг ҳар қандай формуласини нормал шаклга келтириш мумкин.

Исбот. Формула деярли нормал шаклга келтирилган деб ҳисоблаймиз ва уни нормал шаклга келтириш мумкинлигини кўрсатамиз.

Агар бу формула элементар формула бўлса, у ҳолда унинг ифодасида кванторлар бўлмайди ва, демак, у нормал шакл қўринишида бўлади.

Энди фараз қиласызки, теорема күпі білан k амални қамраган формула учун түғри бўлсин ва уни шу фараз асосида $k+1$ амални қамраган формула учун исбот қиласыз.

A ифода $k+1$ амални ўз ичига олган формула ва унинг кўриниши $\sigma x L(x)$ шаклда бўлсин, бу ерда σx кванторларнинг бирини ифодалайди. $L(x)$ формула k амални ўз ичига олганлиги туфайли уни нормал шаклга келтирилган деб ҳисоблаймиз. У ҳолда $\sigma x L(x)$ формула таърифга асосан нормал шаклда бўлади.

A формула \bar{L} кўринишда бўлсин, бунда L формула нормал шаклга келтирилган ва k амални ўз ичига олган деб ҳисобланади. У ҳолда

$$\overline{\forall x A(x)} \equiv \exists x \overline{A(x)} \text{ ва } \overline{\exists x A(x)} = \forall x \overline{A(x)}$$

тeng кучлиликлардан фойдаланиб, инкор амалини предикатлар устига туширамиз. Натижада A формулани нормал шаклга келтирган бўламиз.

Энди A формула $L_1 \vee L_2$ кўринишда бўлсин, бу ерда L_1 ва L_2 нормал шаклга келтирилган формулалар деб қаралади. L_1 формулада боғланган предмет ўзгарувчиларни шундай қайта номлаймизки, L_1 ва L_2 формулалардаги ҳамма боғланган предмет ўзгарувчилар ҳар хил бўлсин. У ҳолда L_1 ва L_2 формулаларни куйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$L_1 \equiv (\sigma x_1)(\sigma x_2) \dots (\sigma x_m) \alpha_1(x_1, x_2, \dots, x_n), m \leq n,$$

$$L_2 \equiv (\sigma y_1)(\sigma y_2) \dots (\sigma y_p) \alpha_2(y_1, y_2, \dots, y_q), p \leq q.$$

$C \vee \forall x B(x) = \forall x [C \vee B(x)]$ ва $\overline{\forall x A(x)} \equiv \exists x \overline{A(x)}$ teng кучлиликлардан фойдаланиб, L_2 формулани (σx_1) , (σx_2) , ..., (σx_m) квантор амаллари остига киритамиз, яъни A формулани ушбу кўринишга келтирамиз:

$$A \equiv (\sigma x_1)(\sigma x_2) \dots (\sigma x_m) (\alpha_1(x_1, x_2, \dots, x_n)) \vee \\ \vee (\sigma y_1)(\sigma y_2) \dots (\sigma y_p) \alpha_2(y_1, y_2, \dots, y_q)).$$

Сўнгра $\alpha_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ формулани

$$(\sigma y_1), (\sigma y_2), \dots, (\sigma y_p)$$

квантор амаллари остига киритамиз. Натижада A формула-нинг нормал шаклини ҳосил қиласиз:

$$A \equiv (\sigma x_1)(\sigma x_2) \dots (\sigma x_m)(\sigma y_1)(\sigma y_2) \dots (\sigma y_p) \times \\ \times (\alpha_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee \alpha_2(y_1, y_2, \dots, y_q)).$$

$L_1 \wedge L_2$ кўринишидаги A формулани нормал шаклга келтиришнинг исботи худди юқорида қаби бўлади.

Агар формулани нормал шаклга келтириш жараёнида $\exists x A(x) \vee \exists x B(x)$ ёки $\forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$ кўринишидаги ифодаларни кўришга тўғри келса, у ҳолда

$$\forall x A(x) \wedge \forall x B(x) = \forall x [A(x) \wedge B(x)]$$

ва

$$\exists x A(x) \vee \exists x B(x) = \exists x [A(x) \vee B(x)]$$

тeng кучлиликлардан фойдаланиш керак бўлади.

1- мисол. $A \equiv \forall x \exists y P(x, y) \wedge \exists x \forall y Q(x, y)$ формулани нормал шаклга келтириш талаб этилсин.

A формулада teng кучли алмаштиришларни ўtkазиб, уни нормал шаклга келтирамиз:

$$A \equiv \forall x \exists y P(x, y) \wedge \forall x \exists y \overline{Q(x, y)} \equiv \forall x (\exists y P(x, y) \wedge \exists z \overline{Q(x, z)}) \equiv \\ \equiv \forall x \exists y (P(x, y) \wedge \exists z \overline{Q(x, z)}) \equiv \forall x \exists y \exists z (P(x, y) \wedge \overline{Q(x, z)}).$$

4.2. Бажарилувчи ва умумқийматли формулалар.

2- таъриф. Агар A формула ифодасига кирувчи ва M соҳага оид ўзгарувчиларнинг ўндаи қийматлари мавжуд бўлиб, бу қийматларда A формула чин қиймат қабул қиласа, у ҳолда предикатлар мантиқининг A формуласи M соҳада бажарилувчи формула деб аталади.

3- таъриф. Агар ўндаи соҳа мавжуд бўлиб, унда A формула бажариладиган бўлса, у ҳолда A бажарилувчи формула деб аталади.

Демак, агар бирор формула бажарилувчи бўлса, бу ҳали унинг исталган соҳада бажарилувчанлигини билдиrmайди.

4-таъриф. Агар A нинг ифодасига кирувчи ва M соҳага оид ҳамма ўзгарувчиларнинг қийматларида A формула чин қиймат қабул қиласа, у ҳолда A формула M соҳада **айнан чин формула** деб аталади.

5-таъриф. Агар A формула ҳар қандай соҳада **айнан чин бўлса**, у ҳолда **A умумқийматли формула** деб аталади.

6-таъриф. Агар A формула ифодасига кирувчи ва M соҳага оид ҳамма ўзгарувчиларнинг қийматларида A формула ёлғон қиймат қабул қиласа, у ҳолда A формула M соҳада **айнан ёлғон формула** деб аталади.

Келтирилган таърифлардан ушбу тасдиқлар келиб чиқади:

1. Агар A умумқийматли формула бўлса, у ҳолда у ҳар қандай соҳада ҳам бажарилувчи формула бўлади.

2. Агар A формула M соҳада айнан чин формула бўлса, у ҳолда у шу соҳада бажарилувчи формула бўлади.

3. Агар M соҳада A айнан ёлғон формула бўлса, у ҳолда у бу соҳада бажарилмайдиган формула бўлади.

4. Агар A бажарилмайдиган формула бўлса, у ҳолда у ҳар қандай соҳада ҳам айнан ёлғон формула бўлади.

Демак, предикатлар мантиқи формулаларини икки синфа ажратиш мумкин: **бажарилувчи** синфлар ва **бажарилмас** (бажарилмайдиган) синфлар формулалари.

7-таъриф. Умумқийматли формула **мантиқ қонуни** деб аталади.

Энди бир нечта мисоллар келтирайлик.

1-мисол. $\forall x \exists y P(x, y)$ формула бажарилувчилир. Ҳақиқатан ҳам, агар $P(x, y)$: « $x < y$ » предикат $M = E \times E$ соҳада аниқланган ($E = \{0, 1, 2, \dots, n\}$) бўлса, у ҳолда $\forall x \exists y P(x, y)$ формула M соҳада айнан чин формула бўлади, демак, бу соҳада бажарилувчи формуладир. Аммо, агар $E_1 = \{0, 1, 2, \dots, k\}$ учун « $x < y$ » предикат чекли $M_1 = E_1 \times E_1$ соҳада аниқланган бўлса, у ҳолда $\forall x \exists y P(x, y)$ формула M_1 соҳада айнан ёлғон формула бўлади ва, демак, M_1 соҳада бажарилмасдир. Равшанки, $\forall x \exists y P(x, y)$ умумқийматли формула бўлмайди.

2- мисол. $\exists x \exists y [P(x) \wedge \overline{P(y)}]$ формула бажарилувчиdir.

Ҳақиқатан ҳам, агар $P(x)$: « x – жуфт сон» предикат $E = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ учун $M = E \times E$ соҳада аниқланган бўлса, у ҳолда бу формула M соҳада айнан чин бўлади, демак, M соҳада бажарилувчи формуладир.

Аммо, агар $P(x)$: « x – жуфт сон» предикат $E_1 = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ учун $M_1 = E_1 \times E_1$ соҳада аниқланган бўлса, у ҳолда $\exists x \exists y [P(x) \wedge \overline{P(y)}]$ формула M_1 соҳада айнан ёлғон формула бўлади, демак, бу соҳада бажарилмас формуладир.

3- мисол. $\forall x [P(x) \vee \overline{P(x)}]$ формула исталган M соҳада айнан чин бўлади.

Демак, у умумқийматли формула, яъни мантиқий қонундир.

4- мисол. $\forall x [P(x) \wedge \overline{P(x)}]$ формула исталган соҳада айнан ёлғон ва шунинг учун ҳам у бажарилмас формула бўлади.

Энди предикатлар мантиқидаги формулаларнинг умумқийматлиги ва бажарилувчанилиги орасидаги муносабатни кўриб ўтайлик.

2-теорема. *A* умумқийматли формула бўлиши учун унинг инкори \bar{A} бажарилувчи формула бўлмаслиги зарур ва етарлидир.

Исбот. *Зарурлиги.* *A* умумқийматли формула бўлсин. У ҳолда, равшанки, \bar{A} исталган соҳада айнан ёлғон формула бўлади ва шунинг учун ҳам у бажарилмас формуладир.

Етарлигиги. \bar{A} исталган соҳада бажарилувчи формула бўлмасин. У ҳолда бажарилмас формуланинг таърифига асосан \bar{A} исталган соҳада айнан ёлғон формуладир. Демак, *A* исталган соҳада айнан чин формула бўлади ва у умумқийматлидир.

3-теорема. *A* бажарилувчи формула бўлиши учун \bar{A} нинг умумқийматли формула бўлмаслиги зарур ва етарлидир.

Исбот. *Зарурлиги.* *A* бажарилувчи формула бўлсин. У ҳолда шундай *M* соҳа ва *A* формула таркибига кирувчи ўзгарувчиларнинг шундай қийматлар мажмуи (сатри) мав-

жудки, A формула бу қийматлар сатрида чин қиймат қабул қиласди. Аниқки, ўзгарувчиларнинг бу қийматлар сатрида A формула ёлғон қиймат қабул қиласди ва, демак, \bar{A} умум-қийматли формула бўла олмайди.

Етарлилиги. \bar{A} умумқийматли формула бўлмасин. У ҳолла шундай M соҳа ва A формула таркибига кирувчи ўзгарувчиларнинг шундай қийматлар сатри мавжудки, \bar{A} формула бу қийматлар сатрида ёлғон қиймат қабул қиласди. Бу қийматлар сатрида A формула чин қиймат қабул қилганлиги учун у бажарилувчи формула бўлади.

5- мисол. $A \equiv (P(x) \rightarrow \overline{Q(x)}) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \forall x \overline{Q(x)}$ формуласининг умумқийматлигини исботланг.

Е ч и м . A формула исталган M соҳада аниқланган деб ҳисоблаб, тенг кучли алмаштиришларни ўтказамиз:

$$\begin{aligned} A &\equiv \forall x(P(x) \rightarrow \overline{Q(x)}) \rightarrow \\ &\rightarrow \overline{\exists x P(x) \wedge \forall x \overline{Q(x)}} \equiv \overline{\forall x(P(x) \rightarrow \overline{Q(x)})} \vee \\ &\vee \overline{\exists x P(x) \wedge \forall x \overline{Q(x)}} \equiv \exists x(\overline{P(x)} \vee \overline{Q(x)}) \vee \exists x P(x) \vee \forall x \overline{Q(x)} \equiv \\ &\equiv \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee \overline{\exists x P(x)} \vee \exists x \overline{Q(x)} \equiv \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee \\ &\vee \exists x \overline{Q(x)} \vee \overline{\exists x P(x)} \equiv \exists x(P(x) \wedge Q(x) \vee \overline{Q(x)}) \vee \overline{\exists x P(x)} \equiv \\ &\equiv \exists x(P(x) \vee \overline{Q(x)}) \vee \overline{\exists x P(x)} \equiv (\exists x P(x) \vee \overline{\exists x P(x)}) \vee \exists x \overline{Q(x)} \equiv \\ &\equiv 1 \vee \exists x \overline{Q(x)} \equiv 1, \end{aligned}$$

яъни A формула исталган соҳада ҳар қандай $P(x)$ ва $Q(x)$ бир жойли предикатлар учун айнан чин, демак, у умум-қийматли формуладир.

6- мисол. $A \equiv \exists x[(F(x) \rightarrow \overline{F(x)}) \wedge (\overline{F(x)} \rightarrow F(x))]$ нинг айнан ёлғон формула эканлигини кўрсатинг.

Е ч и м . $(F(x) \rightarrow \overline{F(x)}) \wedge (\overline{F(x)} \rightarrow F(x)) \equiv F(x) \leftrightarrow \overline{F(x)}$ га эгамиз. $F(x) \leftrightarrow \overline{F(x)}$ айнан ёлғон формула эканлигидан, $A \equiv \exists x(F(x) \leftrightarrow \overline{F(x)})$ ҳам айнан ёлғон формула бўлади.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Күйидаги ифодаларнинг қайси бири предикатлар мантиқининг формуласи бўлишини аниқланг. Ҳар бир формуладаги эркин ва боғланган ўзгарувчиларни кўрсатинг:
 - 1) $\exists x \exists y P(x, y)$;
 - 2) $\forall x P(x) \vee \forall y Q(x, y)$;
 - 3) $\forall x \exists y P(x, y)$;
 - 4) $p \rightarrow \forall x P(x, y)$;
 - 5) $\exists x P(x, y) \wedge Q(y, x)$.
2. $P(x, y)$ предикат $M = N \times N$ тўпламда аниқланган ва $P(x, y)$: « $x < y$ » бўлсин.
 - 1) Кўйида берилган предикатларнинг қайси бири айнан чин ва қайси бири айнан ёлғон эканлитини аниқланг:
 - а) $\exists x P(x, y)$;
 - б) $\forall x P(x, y)$;
 - в) $\exists y P(x, y)$;
 - г) $\forall y P(x, y)$.
 - 2) Кўйидаги мулоҳазаларнинг қайси бири чин ва қайси бири ёлғон эканлитини аниқланг:
 - а) $\exists x \forall y P(x, y)$;
 - б) $\forall x \exists y P(x, y)$;
 - в) $\forall y \exists x P(x, y)$;
 - г) $\forall x \forall y P(x, y)$;
 - д) $\forall y \forall x P(x, y)$;
 - е) $\forall y \forall x P(x, y)$;
 - ж) $\exists x \exists y P(x, y)$;
 - з) $\exists y \exists x P(x, y)$.
3. Кўйидаги тенг кучлиликларнинг тўғри эканлитини исбот қилинг:
 - 1) $\forall x A(x) \equiv \underline{\exists x} \underline{A(x)}$;
 - 2) $\exists x A(x) \equiv \forall x \underline{A(x)}$;
 - 3) $C \wedge \forall x A(x) \equiv \forall x (C \wedge A(x))$;
 - 4) $C \vee \forall x A(x) \equiv \forall x (C \vee A(x))$;
 - 5) $\exists x (A(x) \vee B(x)) \equiv \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$;
 - 6) $\exists x (C \vee A(x)) \equiv C \vee \exists x A(x)$;
 - 7) $\exists x (C \wedge A(x)) \equiv C \wedge \exists x A(x)$;
 - 8) $\exists x A(x) \wedge \exists y B(y) \equiv \exists x \exists y (A(x) \wedge B(y))$;
 - 9) $\forall x (A(x) \rightarrow C) \equiv \exists x A(x) \rightarrow C$;
 - 10) $\exists x (C \rightarrow A(x)) \equiv C \rightarrow \exists x A(x)$;
 - 11) $\exists x (A(x) \rightarrow C) \equiv \forall x A(x) \rightarrow C$.

4. $A(x)$ ва $B(x)$ ихтиёрий предикатлар бўлсин. $A(x) \rightarrow \overline{B(x)}$ формулага қўйида берилган формулаларнинг қайси бири тенг кучли бўлади?
- 1) $A(x) \vee B(x)$;
 - 2) $\overline{A(x)} \vee \overline{B(x)}$;
 - 3) $\overline{A(x)} \rightarrow B(x)$;
 - 4) $\overline{B(x)} \rightarrow A(x)$;
 - 5) $\overline{A(x)} \wedge B(x)$;
 - 6) $A(x) \wedge \overline{B(x)}$;
 - 7) $B(x) \rightarrow \overline{A(x)}$.
5. Қўйида келтирилган формулаларнинг қайси бири умум-қийматли:
- 1) $\exists x(P_1(x) \wedge P_2(x)) \rightarrow (\exists xP_1(x) \wedge \exists xP_2(x))$;
 - 2) $\exists x(P_1(x) \wedge P_2(x)) \leftrightarrow (\exists xP_1(x) \wedge \exists xP_2(x))$;
 - 3) $(\forall xP_1(x) \vee \forall xP_2(x)) \rightarrow \forall x(P_1(x) \vee P_2(x))$;
 - 4) $(\forall xP_1(x) \vee \forall xP_2(x)) \leftrightarrow \forall x(P_1(x) \vee P_2(x))$;
 - 5) $\forall x(q \rightarrow P_1(x)) \leftrightarrow (q \rightarrow \forall xP_1(x))$;
 - 6) $\forall x(P(x_1) \rightarrow P_2(x)) \leftrightarrow (\forall xP_1(x) \rightarrow \forall xP_2(x))$;
 - 7) $\exists x(P_1(x) \rightarrow P_2(x)) \rightarrow (\exists xP_1(x) \rightarrow \exists xP_2(x))$;
 - 8) $\forall x(P_1(x) \rightarrow P_2(x)) \leftrightarrow (\exists xP(x_1) \rightarrow \forall xP_2(x))$;
 - 9) $\forall x(A_1(x) \rightarrow A_2(x)) \rightarrow (\forall xA_1(x) \rightarrow \forall xA_2(x))$;
 - 10) $\forall x(A_1(x) \rightarrow A_2(x)) \rightarrow (\exists xA_1(x) \rightarrow \exists xA_2(x))$;
 - 11) $\exists x(A_1(x) \rightarrow A_2(x)) \leftrightarrow (\forall xA_1(x) \rightarrow \forall xA_2(x))$;
 - 12) $\exists xQ(x) \rightarrow \forall xQ(x)$;
 - 13) $\forall xQ(x) \rightarrow \exists xQ(x)$;
 - 14) $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x) \leftrightarrow \forall x(P(x) \wedge Q(x))$;
 - 15) $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x) \leftrightarrow \forall x(P(x) \vee Q(x))$;
 - 16) $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) \leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge Q(x))$;
 - 17) $\exists xP(x) \vee \exists xQ(x) \leftrightarrow \exists x(P(x) \vee Q(x))$?



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Предикатлар мантиқининг символлари ва формуласи.
2. Предикатлар мантиқи формуласининг қиймати. Тенг кучли формулалар. Асосий тенг кучли формулалар.

3. Формуланинг деярли нормал шакли. Формуланинг нормал шакли.
4. Ҳар қандай формулани нормал шаклга келтириш мүмкінлиги.
5. Бажарилувчи ва умумқийматли формулалар. Айнан чин ва айнан ёлғон формулалар.
6. Бажарилувчи ва умумқийматли формулалар ҳақидаги теоремалар.

5- §. Ечилиш муаммоси. Ҳусусий ҳолларда формуланинг умумқийматлизилигини төпиш алгоритмлари

Ечилиш муаммоси. Чекли соҳаларда ечилиш муаммоси. Ёниқ формула. Формуланинг умумий ёпишиши. Формуланинг мавжудлигини ёпиш. Таркибida бир турдаги квантор амали қатнашуви нормал шаклдаги формулалар учун ечилиш муаммоси.

5.1. Ечилиш муаммоси. Предикатлар мантиқида ечилиш муаммоси мулоҳазалар алгебрасида қандай қўйилган бўлса, худди шундай қўйилади: предикатлар мантиқининг исталган формуласи ёки умумқийматли, ёки бажарилувчи, ёки айнан ёлғон (бажарилмас) формула эканлигини аниқлаб берувчи алгоритм мавжудми ёки йўқми? Бу масала **ечилиш муаммоси** деб аталади. Агар бундай алгоритм мавжуд бўлса эди, у (худди мулоҳазалар алгебрасидагидек) предикатлар мантиқидаги исталган формулани айнан чинлигини аниқлаб берувчи критерийга келтирилган бўлар эди.

Агар ушбу муаммо мулоҳазалар алгебраси учун осон ечилиш бўлса, предикатлар мантиқи учун бу муаммони ечиш катта қийинчиликларга дуч келди. XX асрнинг 30- йилларида алгоритм тушунчасига аниқ таъриф берилгандан сўнг мазкур муаммо умумий ҳолда ижобий ҳал этилиши мумкин эмаслиги, яъни изланган алгоритм мавжуд эмаслиги маълум бўлиб қолди.

1936 йилда америкалик олим А.Чёрч предикатлар мантиқининг ечилиш муаммоси умумий ҳолда алгоритмик ечилислигини исботлади, яъни предикатлар мантиқининг ис-

талған формуласи қайси (умумқійматли, бажарилувчи ва бажарилмас) синфға киришини аниқлаб берадиган алгоритм мавжуд әмаслигини күрсатди.

Ечилиш мұаммоси предикатлар мантиқи учун ижобий ечилмаса-да, лекин предикатлар мантиқи формулаларининг баъзи синфлари учун бу мұаммо ижобий ҳал этилишини күрсатайлик.

5.2. Чекли соҳаларда ечилиш мұаммоси. Ечилиш мұаммоси чекли соҳаларда ечилувчиdir, яъни ижобий ҳал бўлади. Ҳақиқатан ҳам, бу ҳолда кванторли амалларни конъюнкция ва дизъюнкция амаллари билан алмаштириш мумкин. Натижада предикатлар мантиқи формуласи мулоҳазалар алгебраси формуласига келтирилади. Маълумки, мулоҳазалар алгебраси учун ечилиш мұаммоси ечиладигандир.

Масалан, $\forall x \exists y [P(x, y) \vee \overline{P(x, x)}]$ формула $M = \{a, b\}$ икки элементли чекли соҳада аниқланган бўлсин. У ҳолда уни ушбу кўринишга келтириш мумкин:

$$\begin{aligned} \forall x \exists y [P(x, y) \vee \overline{P(x, x)}] &\equiv \forall x [P(x, a) \vee \overline{P(x, x)} \vee P(x, b)] \equiv \\ &\equiv [P(a, a) \vee \overline{P(a, a)} \vee P(a, b)] \wedge [P(b, a) \vee \overline{P(b, b)} \vee P(b, b)]. \end{aligned}$$

Хосил этилган конъюнктив нормал шаклдаги формуласининг ҳар бир элементар дизъюнкцияси ифодасида битта мулоҳаза ўзининг инкори билан биргаликда қатнашмоқда. Демак, мулоҳазалар алгебрасининг бу формуласи доимо чин қиймат қабул қиласи, яъни айнан чин бўлади.

5.3. Таркибида бир турдаги квантор амали қатнашувчи нормал шаклдаги формулалар учун ечилиш мұаммоси.

1-таъриф. Агар предикатлар мантиқи формуласи таркибида эркин предмет ўзгарувчилар бўлмаса, у ҳолда бундай формула ёниқ формула деб аталади.

2-таъриф. Агар предикатлар мантиқи формуласи C таркибида x_1, x_2, \dots, x_n эркин ўзгарувчилар мавжуд бўлса, у ҳолда

$$A \equiv \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n C(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

формула C формуланинг умумий ёнилиши ва

$$B = \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n C(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

формула C формуланинг мавжудлигини ёпиш деб аталади.

I-теорема. Агар предикатлар мантиқининг нормал шаклдаги ёпиқ формуласи таркибида (ифодасида) фактап n та мавжудлик квантори қатнашган ҳамда бир элементли исталган соҳада айнан чин бўлса, у ҳолда у умумқийматли формуладир.

Исбот. Предикатлар мантиқининг нормал шаклдаги формуласи

$$B \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n C(q_1, q_2, \dots, P_1, P_2, \dots, Q_1, Q_2, \dots) \quad (1)$$

кўринишда бўлсин, бунда C формула ифодасида кванторлар қатнашмайди, q_i – мантиқий ўзгарувчи, P_i – бир жойли предикатлар, Q_i – икки жойли предикатлар. Бу формуланинг чинлик қиймати унинг таркибида қатнашаётган q_1, q_2, \dots мантиқий ўзгарувчилар ва $P_1, P_2, \dots, Q_1, Q_2, \dots$ предикатларга боғлиқ.

Теореманинг шартига асосан бир a элементли исталган $M = \{a\}$ соҳада бу формула айнан чин, яъни

$$C(q_1, q_2, \dots, P_1(a), P_2(a), \dots, Q_1(a, a), Q_2(a, a), \dots) \quad (2)$$

формула айнан чин бўлади. Аниқки, (2) формула мулоҳазалар алгебрасининг формуласи бўлади.

(1) формула умумқийматли эмас деб фарауз қиласиз. У ҳолда шундай M , соҳа ва ўзгарувчиларнинг шундай қийматлар мажмууси $q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots$ мавжудки, унда (1) формула ёлғон қиймат қабул қиласиз, яъни

$$\exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots) = 0. \quad (3)$$

(3) формуланинг инкорини оламиз:

$$\begin{aligned} & \overline{\exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n (q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots)} \equiv \\ & \equiv \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \overline{C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots)} = 1. \end{aligned}$$

Бу ердан

$$C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots) \quad (4)$$

формуланинг M_1 соҳага оид предмет ўзгарувчиларнинг қандай олинишидан қатын назар айнан чинлиги келиб чиқади. M_1 соҳадан ихтиёрий x_0 элементни олиб, уни (4) формуладаги предмет ўзгарувчилар ўрнига қўйиб чиқамиз. У ҳолда

$$C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0(x_0), P_2^0(x_0), \dots, Q_1^0(x_0, x_0), Q_2^0(x_0, x_0), \dots) = 1.$$

Демак,

$$C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0(x_0), P_2^0(x_0), \dots, Q_1^0(x_0, x_0), Q_2^0(x_0, x_0), \dots) = 0.$$

Бу натижа (2) формуланинг айнан чин эканлигига зиддир ва (1) формула умумқийматли эмас деган фаразимизнинг нотўғрилигини кўрсатади. Шундай қилиб, (1) формула умумқийматлидир.

2-теорема. Агар предикатлар мантиқининг нормал шаклдаги ёпиқ формуласи ифодасида n та умумийлик квантори қатнашса ва бу формула кўни билан n та элементли ҳар қандай тўпламда (соҳада) айнан чин бўлса, у ҳолда у умумқийматли бўлади.

Исбот. Предикатлар мантиқининг нормал шаклдаги формуласи қўйидаги кўринишда бўлсин:

$$A \equiv \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n C(q_1, q_2, \dots, P_1, P_2, \dots, Q_1, Q_2, \dots), \quad (5)$$

бунда q_1, q_2, \dots — мантиқий ўзгарувчилар, P_1, P_2, \dots — бир жойли предикатлар, Q_1, Q_2, \dots — икки жойли предикатлар. (1) формула умумқийматли эмас деб фараз қиласиз. У ҳолда n тадан ортиқ элементтага эга бўлган M_1 соҳа мавжудки, бунда (1) формула айнан чин бўлмайди. Бошқача қилиб айтганда, ўзгарувчиларнинг шундай

$$q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots$$

қийматлар мажмуаси мавжудки,

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots) \equiv 0. \quad (6)$$

Бу ердан

$$\overline{\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots)} = \\ \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \overline{C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots)} = 1.$$

Шундай қилиб, предмет ўзгарувчиларнинг шундай $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0 \in M_1$ қийматлари мавжудки,

$$\overline{C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots)} = 1$$

ва

$$C(q_1^0, q_2^0, \dots, P_1^0, P_2^0, \dots, Q_1^0, Q_2^0, \dots) = 0$$

бўлади.

Демак, M_1 соҳадан кўпи билан n та элементи бўлган шундай M соҳани ажратиш мумкинки, у ерда бу формула айнан чин бўлмайди. Бу натижа теореманинг шартига зиддир ва у (1) формула умумқийматли эмас деган нотўғри фаразимиздан келиб чиқди. Демак, (1) формула умумқийматли формуладир.

Таркибida фақат бир жойли (битта предмет ўзгарувчига боғлиқ бўлган) предикатлар қатнашган формулалар учун ечилиш муаммоси ижобий ҳал этилиши қуйидаги теоремадан кўринади.

3-төрима. Предикатлар мантиқининг таркибига n та бир жойли предикат кирган A формуласи бирор M тўпламда бажарилувчи бўлса, у ҳолда бу формула элементлари сони 2^n дан катта бўлмаган M_1 тўпламда ҳам бажарилувчи бўлади.

Ушбу теоремадан қуйидаги натижа келиб чиқади.

Натижа. Предикатлар мантиқининг таркибига фақат n та бир жойли предикат кирган A формуласи элементлари сони 2^n дан кўп бўлмаган ихтиёрий тўпламда айнан чин бўлса, у ҳолда бу формула ихтиёрий тўпламда ҳам айнан чин бўлади.

Куйидаги теорема ҳам предикатлар мантиқининг катта синфини ташкил қилувчи формулалари учун ечилиш муаммосини ҳал қиласди.

4-теорема. Агар предикатлар мантиқининг A формуласы бирор чексиз соҳада бажарилувчи бўлса, у ҳолда у чекли соҳада ҳам бажарилувчи бўлади.



Мұаммоли масала ва топшириқлар

1. Қуйидаги формуланинг умумқийматли эканлигини исботланг:

$$A \equiv (P(x) \rightarrow \overline{Q(x)}) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \forall x \overline{Q(x)}.$$

2. Агар M тўпламда аниқланган $A(x)$ ва $B(x)$ предикатлар чин қийматли бўлса, у ҳолда уларнинг чинлик тўпламилари қандай шартларни қаноатлантириши керак:

- 1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \exists x(\overline{A(x)} \wedge B(x));$
- 2) $\overline{\exists x(A(x) \wedge B(x))} \wedge (\forall(A(x) \rightarrow B(x)));$
- 3) $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \rightarrow (\forall x(A(x) \rightarrow B(x)))?$

3. $M = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ тўпламда қуйидаги предикатлар берилган:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| $A(x)$: « x 5 та бўлинмайди»; | $B(x)$: « x жуфт сон»; |
| $C(x)$: « x туб сон»; | $D(x)$: « x 3 та каррали». |

Қуйидаги предикатларнинг чинлик тўпламини топинг:

- | | |
|---|---|
| 1) $A(x) \wedge B(x);$ | 2) $C(x) \wedge B(x);$ |
| 3) $C(x) \wedge D(x);$ | 4) $B(x) \wedge D(x);$ |
| 5) $\overline{B}(x) \wedge D(x);$ | 6) $A(x) \wedge \overline{D}(x);$ |
| 7) $\overline{B}(x) \wedge \overline{D}(x);$ | 8) $A(x) \wedge B(x) \wedge D(x);$ |
| 9) $A(x) \vee B(x);$ | 10) $B(x) \vee C(x);$ |
| 11) $C(x) \vee D(x);$ | 12) $B(x) \vee D(x);$ |
| 13) $\overline{B}(x) \vee D(x);$ | 14) $B(x) \vee \overline{D}(x);$ |
| 15) $A(x) \vee B(x) \vee D(x);$ | 16) $C(x) \rightarrow A(x);$ |
| 17) $D(x) \rightarrow \overline{C}(x);$ | 18) $A(x) \rightarrow B(x);$ |
| 19) $(A(x) \wedge C(x)) \rightarrow \overline{D}(x);$ | 20) $(A(x) \wedge D(x)) \rightarrow \overline{C}(x).$ |



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Предикатлар мантиқида ечилиш муаммоси.
2. Чекли соҳаларда ечилиш муаммоси.
3. Ёпик формула. Формуланинг умумий ёпилиши. Формуланинг мавжудлигини ёпиш.
4. Таркибида бир турдаги квантор амали қатнашувчи нормал шаклдаги формулалар учун ечилиш муаммоси.

6-§. Предикатлар мантиқининг математикага татбиқи

- Математик таъриф ва теоремаларни предикатлар мантиқи тили воситаси билан ифодалаш. Сонлар кетма-кетлиги лимитининг таърифини ифодалаш. Функцияning нуқтадаги лимитининг таърифини ифодалаш. Функцияning нуқтадаги узлуксизлиги таърифини ифодалаш. Ўсуви функцияning таърифини ифодалаш. Чегараланган функцияning таърифини ифодалаш. Қарама-қарши тасдиқларни тузиш. Тўғри, тескари ва қарама-қарши теоремаларни ифодалаш. Етарли ва зарурий шартларни ифодалаш.*

6.1. Математик мuloҳазаларни предикатлар мантиқи формуласи кўринишида ёзиш. Куйида асосий математик тушунчалар – таъриф ва теоремаларни предикатлар мантиқи тили воситаси билан қандай ифодалаш мумкинлигини кўриб ўтамиш.

Ҳар қандай математик фан шу фанда қаралаётган объектлар ҳақидаги мuloҳазалар билан иш кўради. Мантиқ ва тўпламлар назариясининг символлари ҳамда берилган фаннинг маҳсус символлари ёрдамида шундай мuloҳазалар предикатлар мантиқининг формуласи кўринишида ифодаланиши мумкин. Предикатлар мантиқининг тили математик тушунчалар ўртасидаги муносабатни ифодалашга, таъриф, теорема ва исботларни ёзишга имконият яратади. Бу ёзишларни мисолларда кўрайлик.

1. Сонлар кетма-кетлиги лимитининг таърифи.
Сонлар кетма-кетлиги лимитининг таърифини қўйидагича ёзиши мумкин:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n \in N (n \geq n_0 \rightarrow |a_n - a| < \varepsilon).$$

Бу ерда уч жойли предикат $A(\varepsilon, n, n_0)$: ($n \geq n_0 \rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$) дан фойдаланилган.

2. Функцияниң нүқтадаги лимитининг таърифи.
Бу таърифни ушбу шаклда ёзиши мумкин:

$$b = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Бу ерда $B(\varepsilon, \delta, x)$: ($0 < |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$) уч жойли предикатдан фойдаланилган.

3. Функцияниң нүқтадаги узлуксизлиги таърифи.
Е тўпламда аниқланган $f(x)$ функция учун $x_0 \in E$ да

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (|x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$$

бўлса, $f(x)$ функция $x_0 \in E$ нүқтада узлуви из деб аталади.

Бу ерда ҳам уч жойли $P(\varepsilon, \delta, x)$ предикатдан фойдаланилди.

4. Ўсуви функцияниң таърифи. Е тўпламда аниқланган $f(x)$ функция учун

$$\forall x_1 \in E \forall x_2 \in E_2 (x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2))$$

бўлса, бу функция шу тўпламда ўсуви деб аталади.

Бу ерда $Q(x_1, x_2)$: ($x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$) икки жойли предикатдан фойдаланилган.

5. Чегараланган функцияниң таърифи. Аниқлаши соҳаси E бўлган $f(x)$ функция учун

$$\exists M \in R_+ \forall x \in E (|f(x)| \leq M)$$

бўлса, у ҳолда бу функция шу соҳада чегараланган деб аталади.

Бу ерда ҳам $F(x, M)$: ($|f(x)| \leq M$) икки жойли предикатдан фойдаланилган.

Маълумки, математикада кўп теоремалар шартли мулоҳазалар шаклида ёзилади, яъни «Агар x бўлса, у ҳолда у бўлади» тарзида ифодаланади. Масалан, «Агар нуқта бурчак биссектрисасида ётган бўлса, у ҳолда у бурчак томонларидан тенг узоқлашган (масофада) бўлади». Бу теореманинг шарти «Нуқта бурчак биссектрисасида ётган» ва холосаси «Нуқта бурчак томонларидан тенг узоқлашган» жумлаларидан иборат. Кўриниб турибдики, теореманинг шарти ҳам, холосаси ҳам $R^2 = R \times R$ тўпламда аниқланган предикатни ифодалайди. Бу предикатларни $x \in R^2$ учун мос равищда $A(x)$ ва $B(x)$ билан белгилаб, теоремани куйидагича ёзиш мумкин:

$$\forall x \in R^2 (A(x) \rightarrow B(x)).$$

Шу сабабли, теореманинг тузилиши (структураси) ҳақида гапирганда, унда учта қисмни ажратиш керак: 1) теорема шарти: R^2 тўпламда аниқланган $P(x)$ предикат; 2) теорема холосаси: R^2 тўпламда аниқланган $Q(x)$ предикат; 3) тушунириш қисми: бу ерда теоремада гап юритилаётган обьектлар тўпламини ифодалаш керак.

6.2. Қарама-қарши тасдиқларни тузиш. Бирор A математик тасдиқ берилган бўлсин. Унга қарама-қарши бўлган тасдиқ \bar{A} бўлади. Предикатлар мантиқи тенг кучли алмаштиришлар воситаси билан A формулага яхши шакл (кўриниш) бера олади. Масалан, чегараланган функциянинг таърифи

$$\exists M \in R, \forall x \in E (|f(x)| \leq M)$$

формула орқали берилшини кўрган эдик. Бу формуланинг инкорини олиб ва тенг кучли алмаштиришларни ўтказиб, чегаралмаган функциянинг таърифини ҳосил қиласиз:

$$\begin{aligned} \exists M \in R, \forall x \in E (|f(x)| \leq M) &\equiv \forall M \in R, \forall x \in E (\overline{|f(x)|} \leq \overline{M}) \equiv \\ &\equiv \forall M \in R, \exists x \in E (\overline{|f(x)|} \leq \overline{M}) \equiv \forall M \in R, \exists x \in E (|f(x)| > M). \end{aligned}$$

Ҳосил бўлган $\forall M \in R, \exists x \in E (|f(x)| > M)$ формула чегаралмаган функциянинг таърифини ифодалайди.

Келтирилган мисолдан кўриниб турибдики, ҳамма кванторлари олдинда турган предикатлар мантиқи формуласи орқали ифодаланган тасдиқка қарама-қарши тасдиқни ясаш учун ҳамма кванторларни қарама-қаршислига (яъни \forall ни \exists га ва \exists ни \forall га) алмаштириш ва кванторлар остида турган предикатнинг инкорини олиш кифоя.

Масалан, $b \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ тасдиқни қўйидаги формула ифодалайди:

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E(0 < |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon) = \\ & = \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in E(0 < |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon) = \\ & = \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in E(0 < |x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - b| \geq \varepsilon). \end{aligned}$$

Энди берилган теореманинг тўғрилигини рад этадиган тасдиқни ясашни мисолда кўрайлик. $\forall x \in E(P(x) \rightarrow Q(x))$ теорема берилган бўлсин. Бу теоремани рад этадиган тасдиқ қўйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} & \forall x \in E(\overline{P(x) \rightarrow Q(x)}) \equiv \exists x \in E(\overline{P(x)} \rightarrow \overline{Q(x)}) = \\ & = \exists x \in E(\overline{P(x)} \wedge \overline{Q(x)}). \end{aligned}$$

Охирги формула фақат $P(x) \equiv 1$ ва $Q(x) \equiv 0$ бўлгандагина чин қийматга эгадир.

Демак, $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ теореманинг нотўғрилигини исботлаш учун шундай $x \in E$ элементни кўрсатиш керакки, бу элемент учун $P(x) =$ чин ва $Q(x) =$ ёлғон қиймат қабул қиласин, яъни контрмисол келтириш керак.

6.3. Тўғри, тескари ва қарама-қарши теоремалар. Қўйидаги тўртта теоремани кўриб чиқайлик:

$$\forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x)), \quad (1)$$

$$\forall x \in E(B(x) \rightarrow A(x)), \quad (2)$$

$$\forall x \in E(\overline{A(x)} \rightarrow \overline{B(x)}), \quad (3)$$

$$\forall x \in E(\overline{B(x)} \rightarrow \overline{A(x)}). \quad (4)$$

1-таъриф. *Бирининг шарти иккинчисининг хulosаси ва иккинчисининг шарти биринчисининг хulosаси бўлган жуфт теоремалар ўзаро тескари теоремалар деб аталади.*

Масалан, (1) ва (2) теоремалар ҳамда (3) ва (4) теоремалар ўзаро тескари теоремалар бўлади. Бу жуфт теоремаларнинг бирини тўғри теорема десак, у ҳолда иккинчисини тескари теорема дейиш керак.

2-таъриф. *Бирининг шарти ва хulosаси иккинчисининг шарти ва хulosаси учун мос равишда инкорлари бўлган жуфт теоремалар ўзаро қарама-қарши теоремалар деб аталади.*

(1) ва (3) теоремалар ҳамда (2) ва (4) теоремалар ўзаро қарама-қарши теоремалар бўлади.

Масалан, (1): «Агар тўртбурчакнинг диагоналлари teng бўлса, у ҳолда бу тўртбурчак тўғри бурчакли бўлади» теоремага (2): «Агар тўртбурчак тўғри бурчакли бўлса, у ҳолда унинг диагоналлари teng бўлади» деган теорема тескари теорема бўлади. (1) теоремага қарама-қарши теорема (3): «Агар тўртбурчакнинг диагоналлари teng бўлмаса, у ҳолда у тўғри бурчакли бўлмайди» ва (2) теоремага қарама-қарши теорема (4): «Агар тўртбурчак тўғри бурчакли бўлмаса, у ҳолда унинг диагоналлари teng бўлмайди» бўлади.

Кўрилган мисолла (1) ва (4) теоремалар бир вақтда чин бўлади. (1) теоремага teng ёнли трапеция контрмисол бўлади.

Равшанки, тўғри ва тескари теоремалар, умуман айтганда, teng кучли бўлмайди, яъни бири чин, иккинчиси ёғон бўлиши мумкин. Аммо, (1) ва (4) теоремалар ҳамда (2) ва (3) теоремаларнинг teng кучли формулалар эканлигини осонгина исботлаш мумкин. Ҳақиқатан ҳам,

$$\begin{aligned} \forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x)) &\equiv \forall x \in E(\overline{A(x)} \vee B(x)) \equiv \\ &\equiv \forall x \in E(\overline{\overline{B(x)}} \vee \overline{\overline{A(x)}}) \equiv \forall x \in E(\overline{B(x)} \rightarrow \overline{A(x)}). \end{aligned}$$

Худти шу каби (2) ва (3) формулаларнинг teng кучлилигини исботлаш мумкин:

$$\forall x \in E(\overline{B(x)} \rightarrow A(x)) \equiv \forall x \in E(\overline{A(x)} \rightarrow \overline{B(x)}).$$

Бу тенг кучлиликлардан қыйидаги холосага келамиз: агар (1) теорема исбот қилингандай болса, у ҳолда (4) теорема ҳам исбот қилингандай болади ва агар (2) теорема исбот қилингандай болса, у ҳолда (3) теорема ҳам исботланған ҳисобланади.

6.4. Етарли ва зарурый шартлар. Қыйидаги теоремани күрайлик:

$$\forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x)). \quad (5)$$

$A(x) \rightarrow B(x)$ предикаттинг чинлик түплами $CI_A \cup I_B$ түпламдан иборат болади. Демак, бу предикаттинг ёлғонлик түплами $C(CI_A \cup I_B) = (I_A \cap CI_B)$ түпламдан иборат. Охирги $I_A \cap CI_B$ түплам фақат $I_A \subset I_B$ болғандагина бўш түплам болади.

Шундай қилиб, $A(x) \rightarrow B(x)$ предикат $x \in E$ нинг ҳамма қийматларида $A(x)$ предикаттинг чинлик түплами $B(x)$ предикат чинлик түпламинынг қисм түплами, яъни $I_A \subset I_B$ болғандагина чин болади. Бу ҳолда $B(x)$ предикат $A(x)$ предикатдан мантиқий келиб чиқади деб айтилади. $B(x)$ предикат $A(x)$ предикат учун зарурый шарт ва $A(x)$ эса $B(x)$ учун етарли шарт деб айтамиз. Масалан, ушбу «Агар x натурал сон болса, у ҳолда у бутун сон болади» теоремасида $B(x)$: « x – бутун сон» предикати $A(x)$: « x – натурал сон» предикатидан мантиқий келиб чиқади ва « x – натурал сон» предикати « x – бутун сон» предикати учун етарли шарт болади.

Шундай ҳоллар мавжудки, буларда

$$\forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x)) \quad (6)$$

ва

$$\forall x \in E(B(x) \rightarrow A(x)) \quad (7)$$

ўзаро тескари теоремалар чин болади. Бу ҳол фақат $I_A = I_B$, яъни $A(x)$ ва $B(x)$ предикатлар тенг кучли предикатлар болғандагина мумкин.

Қаралаётган ҳолда (1) теоремага асосан $A(x)$ предикат $B(x)$ предикат учун етарли шарт ва (2) теоремадан $A(x)$ пре-

дикат $B(x)$ предикат учун зарурий шарт эканлиги келиб чиқади. Демак, агар (1) ва (2) теоремалар чин бўлса, у ҳолда $A(x)$ шарт $B(x)$ учун ҳам етарли, ҳам зарурий шарт бўлади. Худди шу каби бу ҳолатда $B(x)$ шарт $A(x)$ учун етарли ва зарурий шарт бўлади.

Биз айрим вақтларда «зарур ва етарли» мантикий боғловчи ўрнига «шунда ва фақат шунда» мантикий боғловчни ишлатамиз.

Бу ерда (1) ва (2) мулоҳазалар чин бўлганлиги учун қўйидаги мулоҳаза ҳам чин бўлади:

$$\begin{aligned} \forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \forall x \in E(B(x) \rightarrow A(x)) = \\ = \forall x \in E(A(x) \leftrightarrow B(x)). \end{aligned}$$

1- мисол. Ушбу теорема: «Агар x сон 6 га бўлинса, у ҳолда x сон 3 га бўлинади» чиндири. Бу ерда $A(x)$ предикат: « x сон 6 га бўлинади» ва $B(x)$ предикат: « x сон 3 га бўлинади». $B(x)$ предикат $A(x)$ предикатдан мантикий келиб чиқади, яъни $A(x) \rightarrow B(x)$. $A(x)$ предикат (x сон 6 га бўлинади) $B(x)$ предикат (x сон 3 га бўлинади) учун етарли шартдир. $B(x)$ предикат $A(x)$ предикат учун зарурий шартдир. Шу вақтнинг ўзида тескари теорема: «Агар x сон 3 га бўлинса, у ҳолда x сон 6 га бўлинади» нотўғридир (ёлғондир). Шуннинг учун ҳам $B(x)$: « x сон 3 га бўлинади» предикати $A(x)$: « x сон 6 га бўлинади» предикат учун етарли шарт ва $A(x)$: « x сон 6 га бўлинади» предикати $B(x)$: « x сон 3 га бўлинади» предикатига зарурий шарт бўла олмайди.

6.5. Тескарисини (аксини) фараз қилиш усули билан исботлаш. Тескарисини фараз қилиш усули билан исботлашни қўйидаги схема орқали олиб борилади:

$$\forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x)), \quad (8)$$

теорема нотўғри, яъни шундай x ўзгарувчи мавжудки, $A(x)$ шарт – чин ва $B(x)$ хulosा – ёлғон деб фараз қилинади. Агар бу фараздан мантикий фикрлаш натижасида қарама-қарши тасдиқ келиб чиқса, у ҳолда қилинган фараз нотўғри эканлиги ва теореманинг тўғрилиги ҳосил бўлади.

Бу схемадан фойдаланиб (1) теореманинг чинлигини күрсатайлик. Ҳақиқатан ҳам, (1) теореманинг нотўғрилиги (ёлғонлиги) (фараз бўйича) ушбу формуланинг чинлигини күрсатади: $\overline{\forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x))}$.

(1) теоремани нотўғри деб қабул қилган фаразимиздан келиб чиқадиган қарама-қарши тасдиқ $D \wedge \overline{D}$ конъюнкциядан иборат бўлади, бунда D – бирор муроҳаза. Шундай қилиб, тескарисини фараз қилиш усули билан исботлаш схемаси қўйидаги формуланинг чинлигини исботлашга келтирилади: $\overline{\forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x))} \rightarrow D \wedge \overline{D}$.

Бу охирги формула (8) формулагага тенг кучлидир. Ҳақиқатан ҳам,

$$\begin{aligned} & \overline{\forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x))} \rightarrow D \wedge \overline{D} \equiv \\ & \equiv \overline{\forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x))} \vee D \wedge \overline{D} \equiv \forall x \in E(A(x) \rightarrow B(x)). \end{aligned}$$

7- §. Аксиоматик предикатлар ҳисоби ҳақида

- Аксиоматик предикатлар ҳисоби. Предикатлар ҳисобининг аксиомалар системаси. Үмумийлик кванторини киритиши қоидаси. Мавжудлик кванторини киритиш қоидаси. Ечилиш, зидсизлик, тўлиқлилик ва эркинлик муаммолари.

Аксиоматик предикатлар назариясини ҳам худди аксиоматик муроҳазалар назарияси каби яратиш мумкин. Бу ерда қўйидагиларни кўрсатиш зарур:

1. Предикатлар ҳисоби формуласининг таърифи предикатлар мантиқи формуласининг таърифи билан бир хил.

2. Предикатлар ҳисоби аксиомалар системасини танлашни (худди муроҳазалар ҳисобидагидек) ҳар хил амалга ошириш мумкин. Шундай аксиомалар системасидан биттаси қўйидаги: муроҳазалар ҳисобининг ўн бир аксиомаси (4 та гурӯҳ аксиомалар) ва иккита қўшимча аксиома

$$\forall x(F(x) \rightarrow F(x)), \quad F(t) \rightarrow \exists xF(x),$$

аксиомалардан иборат система бўлиши мумкин, бу ерда t ўзгарувчи x ўзгарувчини ўз ичига олмайди.

3. Мулоҳазалар ҳисобидаги келтириб чиқариш қоидасига яна иккита қоида қўшилади:

а) умумийлик кванторини киритиш қоидаси:

$$\frac{F \rightarrow G(x)}{F \rightarrow \forall x G(x)};$$

б) мавжудлик кванторини киритиш қоидаси:

$$\frac{G(x) \rightarrow F}{\exists x G(x) \rightarrow F},$$

агар F x га боғлиқ бўлмаса.

4. Хулоса ва исботланувчи формула тушунчалари худди мулоҳазалар ҳисобидаги каби аниқланади.

. 5. Худди ҳамма аксиоматик назариялардагидек ушбу муаммолар кўрилади:

а) ечилиш; б) зидсизлик; в) тўлиқлик; г) эркинлик.



Муаммоли масала ва топшириқлар

- Предикатлар мантиқи тилида куйидаги таърифларни ёзинг:
 - чизиқли тартибланган тўплам (тартибланган тўплам чизиқли деб айтилади, агар шу тўпламнинг ҳар қандай x ва y элементлари учун ёки $x = y$, ёки $x < y$, ёки $x > y$ бўлса);
 - жуфт функция ($f(x)$) жуфт функция деб айтилади, агар унинг аниқланиш соҳаси координата бошига нисбатан симметрик ва аниқланиш соҳасининг ҳар бир x элементи учун $f(x) = f(-x)$ бўлса).
- Куйида берилган жумлалардаги нуқталар ўрнига «зарур, аммо етарли эмас», ёки «етарли, аммо зарур эмас», ёки «зарур эмас ва етарли эмас» ва қаерда мумкин бўлса, «зарур ва етарли» сўзларини шундай кўйингки, ҳосил бўлган мулоҳазалар чин бўлсин:
 - тўртбурчак тўғри бурчакли бўлиши учун унинг диагоналларининг узунлиги тенг бўлиши ...;

- 2) $x^2 - 5x + 6 = 0$ бўлиши учун $x = 3$ бўлиши ...;
- 3) $f(x)$ функция $[a, b]$ сегментда интегралланувчи бўлиши учун чегараланган бўлиши ...;
- 4) $f(x)$ функция $[a, b]$ сегментда интегралланувчи бўлиши учун $f(x)$ $[a, b]$ сегментда узлуксиз бўлиши ...;
- 5) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сонли қатор яқинлашувчи бўлиши учун $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ бўлиши
3. Ушбу кванторли мулоҳазаларнинг инкорларини топинг:
- 1) $\forall x \exists y F(x, y);$
 - 2) $\forall x \exists y \forall z A(x, y, z);$
 - 3) $\forall x [F(x) \vee \overline{\forall y B(x, y)}];$
 - 4) $\exists x \exists y \forall z [A(x, y) \wedge B(y, z)];$
 - 5) $\exists x A(x, z) \wedge \exists x \forall y B(x, y) \rightarrow \forall x \forall y \overline{C(x, y, z)};$
 - 6) $\exists x (A(x) \wedge B(x) \wedge C(x));$
 - 7) $\forall x (A(x) \rightarrow \forall y B(y));$
 - 8) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \exists x (D(x) \wedge \overline{R(x)});$
 - 9) $\exists x (R(x) \leftrightarrow P(x));$
 - 10) $\forall x \exists y \forall z (P(x, y, z) \rightarrow Q(x, y, z)).$



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириклар

1. Математик таъриф ва теоремаларни предикатлар мантиқи тили воситаси билан ифодалаш.
2. Сонлар кетма-кетлиги лимитининг таърифини ифодалаш.
3. Функцияниң нүқтадаги лимитининг таърифини ифодалаш.
4. Функцияниң нүқтадаги узлуксизлиги таърифини ифодалаш.
5. Ўсуви функцияниң ва чегараланган функцияниң таърифларини ифодалаш.
6. Қарама-қарши тасдиқларни тузиш.
7. Тўғри, тескари ва қарама-қарши теоремалар.
8. Етарли ва зарурий шартлар.
9. Тескарисини (аксини) фараз қилиш усули билан исботлаш.
10. Аксиоматик предикатлар ҳисоби ҳақида.

Мулоҳазалар алгебраси ва мулоҳазалар ҳисобида формуланинг тавтология бўлиши ёки бўлмаслигини аниқлашнинг самарали усулларидан бири чинлик жадвалидир. Аммо предикатлар мантиқида бу ҳолат батамом ўзгаради. Предикатлар мантиқида ҳар бир формуланинг умумқийматли ёки умумқийматли эмаслигини ечадиган самарали усул мавжуд эмас. Шунинг учун ҳам предикат ва у билан боғлиқ квантор тушунчаларидан фойдаланадиган математик назарияларда аксиоматик усуллардан фойдаланиш зарур бўлиб қолади.

Берилган аксиомалар системаси негизида (базасида) курилган **аксиоматик назария** деб, шу аксиомалар система-сига таяниб исботланувчи ҳамма теоремалар мажмуасига айтилади. Аксиоматик назария *формал* ва *формалмас* назарияларга бўлинади.

Формалмас аксиоматик назария назарий-тўпламий мазмун билан тўлдирилган бўлиб, келтириб чиқариш тушунчаси аниқ берилмаган ва бу назария асосан фикр мазмунига суюнади.

Қаралаётган аксиоматик назария учун қуйидаги шартлар бажарилган бўлса, яъни:

1) назариянинг тили берилган;

2) формула тушунчаси аниқланган;

3) аксиомалар деб аталадиган формулалар тўплами берилган;

4) назарияда келтириб чиқариш қоидаси аниқланган бўлса, формал аксиоматик назария аниқланган деб ҳисобланади.

Математик назариялар орасида биринчи тартибли назария алоҳида ўрин тутади. Бу назария юқори тартибли математик назариялардан қуйидаги ҳусусиятлари билан фарқ қиласи:

- предикатлар ва функциялар бўйича квантор амаллари (операциялари) бажарилмайди;
- аргументлари бошқа предикатлар ва функцияларни қўабул қиливчи предикатлар мавжуд эмас.

Биринчи тартибли математик назария бошқа бир қатор магълум математик назарияларни ифодалаш учун етарлидир.

Кўйида биринчи тартибли математик назариянинг тили, терм ва формулалари тушунчаси, мантиқий ва хос (маҳсус) аксиомалари, келтириб чиқариш қоидаси, назарияда исботлаш тушунчаси, тавтология хусусий ҳолларининг исботланувчанлиги, дедукция теоремаси, назария тилининг интерпретацияси (талқини), берилган интерпретацияда формуласарнинг чинлик қийматлари, назариянинг модели, интерпретациянинг изоморфизмлиги, назариянинг қатъийлиги, назариянинг зидсизлик, тўлиқлилик ва ечилиш муаммолари, предикатлар ҳисобининг зидсизлиги, натурал сонлар назарияси, Гёделнинг тўлиқсизлик ҳақидаги теоремаси сингари масалалар ёритилган.

1- §. Биринчи тартибли тил. Терм ва формулалар

- Терм. Формула. Сўз. Бўш сўз. Назариянинг тили. Биринчи тартибли тил. Тилнинг сигнатураси. Функционал ҳарфлар. Предикат ҳарфлар. Биринчи тартибли назариянинг символлари. Предмет ўзгарувчилар. Предмет константалар. Кванторнинг таъсир этувчи соҳаси.*

1-т аъриф . Ҳар қандай символларнинг бўши бўлмаган чекли тўплами алфавит деб, алфавитнинг символлари эса ҳарфлар деб аталади.

2-т аъриф . Карадаётган A алфавит ҳарфларининг чекли кетма-кетлиги A алфавитдаги сўз деб аталади. Ҳарфларнинг бўши кетма-кетлиги бўши сўз деб аталади ва ∧ билан белгиланади.

3-таъриф. Агар A алфавитидаги $a_1, a_2 \dots a_n$ ва $b_1, b_2 \dots b_k$ сўзлар учун $n = k$ ва $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_k$ бўлса, бу сўзлар тенг деб аталади ва $a_1, a_2 \dots a_n = b_1, b_2 \dots b_k$ кўрининида ёзилади. Бу ерда n сон сўзнинг узунлиги деб аталади.

4-таъриф. Агар $A(T)$ бирор назариянинг алфавити бўлса, $A(T)$ даги $E(T)$ сўзлар тўплами T назариянинг ифодалар тўплами деб аталади.

5-таъриф. $\langle A(T), E(T) \rangle$ жуфтлик T назариянинг тили деб аталади.

Биринчи тартибли тиллар биринчи тартибли назарияларда қўлланилади.

Биринчи тартибли назариянинг символлари қуйидаги-лардан иборат:

$\wedge, \vee, \rightarrow, -$ – мантикий амаллар;

\forall, \exists – квантор амаллари;

$(,)$ – қўшимча символлар;

A_j^n ($n, j \geq 1$) – n -жойли предикат ҳарфларнинг саноқли тўплами. Бу ерда юқори индекс жойнинг сонини ва қўйи индекс предикат ҳарфининг рақамини билдиради;

f_j^n ($n, j \geq 1$) – чекли (бўш бўлиши ҳам мумкин) ёки саноқли функционал ҳарфларнинг тўплами. Бу ерда юқори индекс функция таркибига кирувчи ўзгарувчилар сони ва қўйи индекс функционал ҳарфнинг рақамини билдиради;

a_i ($i \geq 1$) – чекли (бўш) ёки саноқли предмет константалар тўплами.

Мантикий амаллар занжири ҳам функционал ҳарфлар сифатида қаралиши мумкин.

6-таъриф. Предикат ҳарфлар тўплами функционал ҳарфлар ва константалар тўпламлари билан биргаликда берилган назария тилининг сигнатураси деб аталади.

Шундай қилиб, биринчи тартибли T назарияда айrim ёки ҳамма функционал ҳарфлар ва предмет константалар ва айrim (аммо ҳаммаси эмас) предикат ҳарфлар мавжуд бўлмаслиги мумкин.

Биринчи тартибли ҳар хил назариялар бир-биридан алфавитдаги ҳарфлар таркиби билан фарқ қилиши мумкин.

Т назарияни түлиқ тавсифлаш учун *терм* ва *формула* түшунчаларини аниклашимиз керак. Терм ва формула – бу $E(T)$ сұзлар түпламининг икки синфицир.

7-таъриф. 1) Предмет ўзгарувчилар ва предмет константалар термдир;

2) агар r_1, r_2, \dots, r_n лар терм, A эса n -жойли амалнинг символи бўлса, у ҳолда $A^n(r_1, r_2, \dots, r_n)$ термдир;

3) T назарияда 1 ва 2-бандларда аникланганлардан ташқари ҳеч қандай терм мавжуд эмас.

Табиий интерпретацияга (талқинга) асосан терм – бу айрим олинган предметнинг исмиидир. Ўзгарувчилар ва предмет константалардан ташқари амалларнинг символлари во-ситасида ўзгарувчилар ва предмет константалардан ҳосил қилинган занжирлар ҳам терм бўлади, чунки интерпретацияга кўра терм бирор функцияning қиймати сифатида аникланяпти.

8-таъриф. 1) Агар A – n -жойли муносабат символи (предикат ёки функция) ва r_1, r_2, \dots, r_n термлар бўлса, у ҳолда $A(r_1, r_2, \dots, r_n)$ формула, хусусан, агар A – предикат ҳарфи A_i^n бўлса, у ҳолда

$$A_i^n(r_1, r_2, \dots, r_n)$$

элементар формула деб аталади;

2) агар A ва B формулалар бўлса, у ҳолда $A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, \bar{A}$ ҳам формуладир;

3) агар A формула ва у ҳарфи A формулага эркин кирувчи ёки A таркибига кирмаган предмет ўзгарувчиси бўлса, у ҳолда $\forall y A, \exists y A$ ифодалар формула бўлади. Бу ҳолда A **кванторнинг таъсири** этувчи соҳаси дейилади;

4) 1-3-бандларда аникланганлардан ташқари бошқа ҳеч қандай формула мавжуд эмас.

2- §. Мантиқий ва хос (максус) аксиомалар. Келтириб чиқариш қоидаси

Мантиқий аксиомалар. *Максус аксиомалар. Келтириб чиқариш қоидаси. Хулоса қоидаси. Үмумлаштириши қоидаси.*

Биринчи тартибли назария аксиомалари икки синфга: мантиқий ва хос аксиомаларга бўлинади.

Мантиқий аксиомалар: A , B ва C лар T назариянинг қандай формулалари бўлишидан қатъи назар қўйидаги формулалар T нинг *мантиқий аксиомалари* бўлади:

$$1) A \rightarrow (B \rightarrow A);$$

$$2) (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C));$$

$$3) (\bar{B} \rightarrow \bar{A}) \rightarrow ((\bar{B} \rightarrow A) \rightarrow B);$$

4) $\forall x_i A(x_i) \rightarrow A(t)$. Бу ерда $A(x_i)$ – берилган T назариянинг формуласи ва t – ўшу $A(x_i)$ формулада эркин бўлган T назариянинг терми. Тъкидлаш керакки, t терм x_i билан ҳам мос келиши мумкин, у ҳолда биз $\forall x_i A(x_i) \rightarrow A(x_i)$ аксиомага эга бўламиз;

5) агар x_i предмет ўзгарувчи A формулада эркин бўлмаса, у ҳолда

$$\forall x_i (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \forall x_i B).$$

Изоҳ. Олдинги бобда XI аксиомали классик мулоҳазалар ҳисобини кўриб ўтган эдик. Аммо кам аксиомали мулоҳазалар ҳисобини ҳам яратиш мумкин (масалан, 1–3- мантиқий аксиомалар асосида).

Хос аксиомалар. Хос аксиомаларни умумий ҳолда тавсифлаш мумкин эмас, чунки улар бир назариядан иккинчи назарияга ўтишда ўзгаради, яъни ҳар бир назариянинг ўзигагина хос аксиомалари бўлади.

Биринчи тартибли назария хос аксиомаларга эга эмас. Бу назария соғ мантиқий назариядир. Адабиётларда бу назария *биринчи тартибли предикатлар ҳисоби* деб айтилади.

Кўп аксиоматик назарияларда тенглик тушунчасидан фойдаланилади. Уни икки жойли предикат $\langle\langle x = y \rangle\rangle$ сифатида киритилади. Шу сабабли аксиомалар қаторига иккита хос аксиома киритилади:

- 1) $\forall x(x = x)$;
- 2) агар x, y, z ҳар хил предмет ўзгарувчилар ва $F(z)$ формула бўлса, у ҳолда $\forall x \forall y (x = y \rightarrow F(x) = F(y))$.

Келтириб чиқариш қоидаси. Худди мулоҳазалар ҳисобидагидек, H формулалар мажмуасидан келтириб чиқариш тушунчасидан фойдаланамиз. H га кирувчи мулоҳазаларни (формулаларни) шартлар деб айтамиз. Агар H дан келтириб чиқарилган ифоданинг охирида A мулоҳаза (формула) турган бўлса, у ҳолда A мулоҳаза H дан келтириб чиқарилган деб айтамиз ва $H \vdash A$ кўринишда ёзамиз. Хусусан, $H = \emptyset$ бўлса, у ҳолда $\vdash A$ кўринишда ёзилади.

Биринчи тартибли назариянинг келтириб чиқариш қоидаси таркибига ушбу иккита қоида киради:

1. Хулоса қоидаси (ёки modus ponens):

$$\frac{\vdash A, \vdash A \rightarrow B}{\vdash B}.$$

2. Умумийлик квантори билан боғлаш қоидаси (ёки умумлаштириш қоидаси):

$$\frac{\vdash A}{\vdash \forall x_i A}.$$



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Қандай шартлар бажарилганда аксиоматик назария формал аксиоматик назария бўлади?
2. Биринчи тартибли назария юқори тартибли математик назариялардан қандай хусусиятлари билан фарқ қиласи?
3. Мантикий амаллар занжири ҳам функционал ҳарфлар сифатида қаралиши мумкинлигини исботланг.
4. Агар $\vdash A_1 \wedge \dots \wedge A_m \rightarrow B$ бўлса, у ҳолда $A_1, \dots, A_m \vdash B$ бўлишини исботланг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Аксиоматик назария түшүнчаси. Формал ва формалмас аксиоматик назариялар.
2. Биринчи тартибли тил. Терм ва формулалар. Функционал ва предикат ҳарфлар. Биринчи тартибли назариянинг символлари.
3. Предмет ўзгарувчилар ва константалар. Кванторнинг таъсир этувчи соҳаси.
4. Мантикий ва хос (максус) аксиомалар. Келтириб чиқариш қоидаси. Хулоса қоидаси. Умумийлик квантори билан боғлаш қоидаси.

3- §. Алгебра, геометрия ва анализда мавжуд бўлган математик назариялар

- Қисман тартиблаш назарияси. Гурӯхлар назарияси. Кесмалар тенглиги назарияси. Натурал сонларнинг аксиоматик назарияси.*

Энди алгебра, анализ ва геометрияда мавжуд бўлган математик назариялардан мисоллар келтирайлик.

3.1. Қисман тартиблаш назарияси. *T* назария битта A_i^2 предикат ҳарфга эга бўлсин. Бу назария функционал ҳарф ва предмет константаларга эга бўлмасин. $A_i^2(x_1, x_2)$ ва $A_i^2(x_1, x_2)$ формулалар ўрнига одатда $x_1 < x_2$ ва $x_1 \neq x_2$ муносабатларни ёзадилар.

T назария яна иккита максус аксиомаларга эга бўлсин:

- a) $\forall x_1 (x_1 < x_1)$ – иррефлексивлик;
- б) $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 ((x_1 < x_2) \wedge (x_2 < x_3) \rightarrow (x_1 < x_3))$ – транзитивлик.

Бу назариянинг ҳар қандай модели қисман тартибланган структура деб аталади.

3.2. Гурӯхлар назарияси. *T* назария битта A_i^2 предикат ҳарфга, битта f_i^2 функционал ҳарфга ва битта a_i предмет константага эга бўлсин. Алгебрада қабул қилинган белгилашлардан фойдаланиб,

$A_1^2(t, s)$ ўрнига $t = s$,

$f_1^2(t, s)$ ўрнига $t + s$,

a_1 ўрнига 0

ни ёзамиз. Бу ерда қуйидаги формулалар T назариянинг маҳсус аксиомалари бўлади:

- $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 (x_1 + (x_2 + x_3)) = ((x_1 + x_2) + x_3)$ – ассоциативлик;
- $\forall x_1 (0 + x_1 = x_1)$ – нолнинг хусусияти;
- $\forall x_1 \exists x_2 (x_1 + x_2 = 0)$ – қарама-қарши элементнинг мавжудлиги;
- $\forall x_1 (x_1 = x_1)$ – тенгликнинг рефлексивлиги;
- $\forall x_1 \forall x_2 ((x_1 = x_2) \rightarrow (x_2 = x_1))$ – тенгликнинг симметриклиги;
- $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 ((x_1 = x_2) \rightarrow ((x_2 = x_3) \rightarrow (x_1 = x_3)))$ – тенгликнинг транзитивлиги;
- $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 ((x_2 = x_3) \rightarrow ((x_1 + x_2 = x_1 + x_3) \wedge (x_2 + x_1 = x_3 + x_1)))$ – тенгликнинг ўрнига қўйиш.

Бу назариянинг ҳар қандай модели гуруҳ деб аталади. Агар гуруҳда $\forall x_1 \forall x_2 (x_1 + x_2 = x_2 + x_1)$ чин формула бўлса, у ҳолда бу гуруҳ *абел гуруҳи ёки коммутатив гуруҳ* деб аталади.

Гуруҳга қуйидагилар мисол бўла олади:

1) M тўпламнинг ўзини ўзига барча ўзаро бир қийматли акслантиришлари тўплами шу акслантиришларнинг суперпозицияси амали билан биргаликда қаралганда;

2) ҳамма бутун сонлар тўплами Z бутун сонларни қўшиш амали билан биргаликда қаралганда;

3) текисликнинг ҳамма V_2 векторлар тўплами векторларни учбурчак ёки параллелограмм қоидаси бўйича қўшиш амали билан биргаликда қаралганда.

Қисман тартиблаш ва гуруҳ назариялари самарали (эфектли) аксиомалаштирилган назариялардир, чунки бу назарияларда исталган формулани мантиқий аксиома бўлиши ёки бўлмаслигини самарали текшириш имконияти мавжуд.

3.3.Геометрия (кесмалар тенглиги назарияси). Бу назарияда S – ҳамма кесмалар түплами бўлсин. Тенглик муносабатини $\langle\langle x = y \rangle\rangle$ шаклда ёзамиш, яъни $\langle\langle x = y \rangle\rangle$ ифодани $\langle\langle x \text{ кесма } y \text{ кесмага тенг} \rangle\rangle$ деб ўқиймиз. Назариянинг маҳсус аксиомалари:

- 1) $\forall x \in S(x = x);$
- 2) $\forall x \forall y \forall z((x = z) \wedge (y = z)) \rightarrow (x = y)).$

4- §. Назарияда исботлаш тушунчаси. Тавтология хусусий ҳолларининг исботланувчанлиги

Исботлаш тушунчаси. Теорема. Исботланувчи мулоҳаза. Тавтология хусусий ҳолларининг исботланувчанлиги.

Алоҳида фикрнинг чинлигини (тўғрилигини) асослаш усулини исботлаш деб айтамиш.

1- таъриф. Кўрилаётган назария мулоҳазаларининг s_1, s_2, \dots, s_k чекли кетма-кетлиги учун бу мулоҳазаларнинг ҳар бири ёки аксиома, ёки шу кетма-кетликнинг бирорта мулоҳазасидан, ёки кетма-кетликда ўзидан олдин турган бирорта мулоҳазадан мантиқнинг келтириб чиқарши қоидаси орқали ҳосил этилган бўлса, бу кетма-кетлик **исбот** (**исботлаш**) дейилади.

2- таъриф. Исботлашнинг охиргиси бўлган мулоҳаза теорема ёки исботланувчи мулоҳаза деб аталади.

Аниқки, ҳар қандай аксиома теорема бўлади. Бу теореманинг исботи бир қадамдан иборат бўлади.

Теорема. Агар биринчи тартибли T назариянинг A формуласи тавтологиянинг хусусий ҳоли бўлса, у ҳолда A формула T назариянинг теоремаси бўлади ва уни (1), (2) ва (3) мантиқий аксиомалар ва холоса қоидасини қўйлаш йўли билан келтириб чиқарши мумкин.

Исбот. x_1, x_2, \dots, x_n лар B формула таркибига кирувчи ўзгарувчилар мажмую ва A формула B тавтологиядан ўрнига қўйиш қоидаси орқали ҳосил қилинган бўлсин. Маълумки,

бу ҳолда B формулани $H = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ мажмудан келтириб чиқариш мумкин. Бунинг учун қуидаги қоида бўйича ўрнига қўйиш амалини бажарамиз:

1) агар бирор x_i ўзгарувчи B формула таркибида бўлса, у ҳолда ҳар бир келтириб чиқариш формуласи таркибидаги x_i ўрнига T назариянинг A формуласини ҳосил қилиш учун B даги ўша x_i ўзгарувчи ўрнини оладиган формула қўйилади;

2) агар бирор x_i ўзгарувчи B таркибида бўлмаса, у ҳолда келтириб чиқариш формулалари таркибидаги шу ўзгарувчнинг ҳар бир жойига T назариянинг ихтиёрий битта формуласи қўйилади.

Шундай қилиб келтириб чиқарилган формулалар кетма-кетлиги назариядаги A формуланинг T назарияда келтирилиб чиқарилиши бўлади.

Теореманинг исботида фақатгина (1), (2), (3) аксиомалар ва холоса қоидасидан фойдаланилди.

5- §. Дедукция теоремаси

Дедукция теоремаси. Формулалар мажмуасидан формулани келтириб чиқариш. Дедукция теоремасининг исботи.

Мулоҳазалар ҳисобида

$$\frac{H, C \vdash A}{H \vdash C \rightarrow A}$$

дедукция теоремаси ўринли эди. Ихтиёрий биринчи тартибли T назарияда бу теорема айрим ўзgartиришларсиз ўринли бўлмай қолади. Масалан, ҳар қандай биринчи тартибли назарияда $A \vdash \forall x A$ ўринлидир, аммо ҳар доим ҳам $A \rightarrow \forall x A$ формула исботланувчи бўлавермайди. Ҳақиқатан ҳам, ҳеч бўлмаганда $M = \{a, b, \dots\}$ нинг икки элементини қамраган соҳа берилган ҳолни қараб бунга ишониш мумкин.

T – предикатлар ҳисоби ва A формула $A_1^1(x)$ кўринишида бўлсин. $A_1^1(x)$ формула фақатгина a элемент эгаллаган хусусиятта эга деб интерпретация берамиз. У ҳолда $A_1^1(x)$ фор-

мұла a элементи бўлган M тўпламда бажарилувчи бўлади, аммо шу вақтнинг ўзида $\forall x A(x)$ формула M тўпламда бажарилувчи формула эмас.

Мулоҳазалар ҳисобидаги дедукция теоремасининг шартларини бироз күчсизлантирганимиздагина у биринчи тартибли назарияда ўринли бўлади. Бунинг учун аввал биринчи тартибли назарияда формулалар мажмуасидан формуласи келтириб чиқариш қоидасини аниқлаб олайлик. Шу мақсадда биринчи навбатда бир ёрдамчи тасдиқни исбот қиласиз.

H, A формуласи мажмуаси ва бу мажмуадан келтириб чиқарилган B_1, B_2, \dots, B_n формуласи кетма-кетлигини кўрайлик. Бу келтириб чиқаришда B_k формула A формула билан кўйидаги икки ҳолда боғлиқ бўлади деб айтамиз:

1) B_k формула A формуланинг ўзиридан ва у келтирилиб чиқарилган формуласи таркибига H, A формуласи мажмуасида мавжуд бўлган формула сифатида киритилган;

2) B_k формула B_1, B_2, \dots, B_n келтирилиб чиқарилган формуласардаги ўзидан олдин турган формуласардан холоса қоидаси ва кванторни боғлаш йўли билан ҳосил қилинган. Ўзидан олдин турган формуласарнинг ҳеч бўлмагандан бирор тасдиқи A формулагага боғлиқ. Масалан, $\{\forall x A \rightarrow C, A\}$ формуласи мажмуасидан

$$A, \forall x A, \forall x A \rightarrow C, C, \forall x C$$

формулаларни келтириб чиқариш мумкин. Бу формуласарнинг ҳар бири A формулагага боғлиқ.

Л е м м а . H, A формуласи мажмуасидан келтириб чиқарилган $B_1, B_2, \dots, B_{n-1}, B$ формуласи кетма-кетлигидаги B формула A формулагага боғлиқ бўлмаса, у ҳолда $H \vdash B$.

И с б о т . Лемманинг исботини математик индукция методи билан ўтказамиз.

1. $n = 1$ ҳол учун лемма тўғридир. Ҳақиқатан ҳам, агар H, A формуласи мажмуасидан B формула келтирилиб чиқарилган бўлса ва у A формулагага боғлиқ бўлмаса, у ҳолда

ёки $B \in H$, ёки B формула исботланувчи формула бўлади. Иккала ҳолда ҳам $H \vdash B$.

2. Энди лемманинг холосаси $k < n$ узунликдаги келтириб чиқариш формулалари учун тўғри деб фараз қиласиз ва унинг n узунликдаги келтириб чиқариш формулалари учун тўғрилигини исбот этамиз. Агар $B \in H$ ёки исботланувчи формула бўлса, у ҳолда $H \vdash B$.

Агарда B формула ўзидан олдин турган битта ёки иккита формулалардан келтириб чиқарилган бўлса, у ҳолда B формула A га боғлиқ бўлмайди, чунки индуктив фаразимизга асосан келтириб чиқариш формулалари таркибидағи A дан олдин турган ҳамма формулалар A га боғлиқ эмас. Демак, $H \vdash B$.

Дедукция теоремаси. $H, A \vdash B$ ва H, A формулалар мажмуасидан келтириб чиқарилган B формула мавжуд бўлсин. A формулага боғлиқ бўлиб келтириб чиқарилган формулаларга квантор билан боғлаш қоидасини қандай қўллашимиздан қатъи назар A формулага кирувчи эркин ўзгарувчиларнинг бирортаси квантор билан боғланмасин. У ҳолда $H, A \rightarrow B$.

Исбот. $B_1, B_2, \dots, B_{n-1}, B_n = B$ лар H, A формулалар мажмуасидан келтириб чиқарилган теореманинг шартларини қаноатлантирувчи формулалар бўлсин. Исботни математик индукция методи билан олиб борамиз.

1. $n = 1$ ҳол учун теорема тўғридир. Ҳақиқатан ҳам, агар B формула H, A мажмуанинг келтириб чиқариш формуласи бўлса, у ҳолда:

- ёки $B \in H$;
- B – исботланувчи формула;
- B формула A нинг ўзиdir.

а) ва б) ҳолларда $H \vdash B$ ва $B \rightarrow (A \rightarrow B)$ формула исботланувчи формула бўлганлиги учун холоса қоидасига асосан $H \vdash A \rightarrow B$ натижага эга бўламиз.

в) ҳолда $A \rightarrow B$ формула $A \rightarrow A$ формулага айланади, яъни исботланувчи формула бўлади. Шунинг учун $H \vdash A \rightarrow B$ бўлади, яъни $A \rightarrow B$ формулани H дан келтириб чиқариш мумкин.

2. Энди $k < n$ узунлукдаги келтириб чиқариш формулалари учун теорема түгри бўлсин ва уни $k = n$ узунлукдаги келтириб чиқариш формулалари учун исбот этамиз. $B_1, B_2, \dots, B_{n-1}, B$ лар H, A формулалар мажмуасининг келтириб чиқариш формулалари бўлса, фақатгина қўйидаги ҳоллар юз бериши мумкин:

- а) $B \in H$;
 - б) B – исботланувчи формула;
 - в) B формула A формуланинг ўзири;
 - г) B формула келтириб чиқариш формулалари таркибидаги ўзидан олдин келадиган B_i ва $B_j (i < j < n)$ формулалардан хulosса қоидасига асосан ҳосил қилинади;
 - д) B формула келтириб чиқариш формулалари таркибидаги $B_i (i < n)$ формуладан кванторни боғлаш қоидасига асосан олинади.
- а), б), в) ҳоллар учун теорема исботи $n = 1$ ҳол учун берилган исбот билан бир хилдир.

Тўртинчи г) ҳолни кўрайлик. Бу ерда B формула иккита B_i ва $B_j (i < j < n)$ формулалардан келтириб чиқарилганини учун B_i формула $B_i \rightarrow B$ кўринишга эга бўлади ва

$$\vdash A \rightarrow B_i, \quad (1)$$

$$H \vdash A \rightarrow (B_i \rightarrow B) \quad (2)$$

тасдиқлар тўғри бўлади.

Иккинчи $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ аксиомадан фойдаланиб, қўйидагини ҳосил қиласиз

$$\neg(A \rightarrow (B_i \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow B_i) \rightarrow (A \rightarrow B)). \quad (3)$$

Мураккаб хulosса қоидасидан фойдаланиб, (3), (2) ва (1) формулалардан $H \vdash A \rightarrow B$ формулати келтириб чиқарамиз.

Охирги бешинчи д) ҳолни кўрамиз. H, A формулалар мажмуасидан келтирилиб чиқарилган формулалар орасида $B_i (i < n)$ шундайки, B формула $\forall x_i B_i$ бўлсин. Фаразимизга кўра $H \vdash A \rightarrow B_i$ ёки B_i формула A формулага боғлиқ эмас, ёки x_i ўзгарувчи A формуланинг эркин ўзгарувчиси бўлмайди.

Агар B_i формула A формулагага боғлиқ бўлмаса, у ҳолда леммага асосан $H \vdash B_i$, $H \vdash B_i$ формулагага кванторни боғлаш қоидасини қўллаб, $H \vdash \forall x_i B_i$ формулани ҳосил қиласиз, яъни $H \vdash B$. Шундан сўнг биринчи $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ аксиомадан фойдаланиб, $H \vdash B \rightarrow (A \rightarrow B)$ формулани келтириб чиқарамиз. Демак, $H \vdash A \rightarrow B$.

Агар x_i ўзгарувчи A формуланинг эркин ўзгарувчиси бўлмаса, у ҳолда бешинчи $\forall x_i (A \rightarrow B_i) \rightarrow (A \rightarrow \forall x_i B_i)$ аксиомадан фойдаланамиз. $H \vdash A \rightarrow B_i$ бўлганлиги учун кванторни боғлаш қоидасидан фойдаланиб, $H \vdash \forall x_i (A \rightarrow B)$ формулани ҳосил қиласиз. Бу формуладан холоса қоидасига асосан $H \vdash A \rightarrow \forall x_i B_i$ формулани келтириб чиқарамиз. Бундан ўз навбатида $H \vdash A \rightarrow B$ формула келиб чиқади.

Шундай қилиб, дедукция теоремаси бешала ҳол учун ҳам тўғридир.

Амалда бу теоремадан келиб чиқадиган куйидаги натижалардан фойдаланиш кулагайроқдир:

1-натижада. Агар $H, A \vdash B$ ва A нинг эркин ўзгарувчисига кванторни боғлаш қоидасини ишлатмасдан келтириб чиқарилган формулалар мавжуд бўлса, у ҳолда $H \vdash A \rightarrow B$.

2-натижада. Агар A формула ёпиқ ва $H, A \vdash B$ бўлса, у ҳолда $H \vdash A \rightarrow B$.

6-§. Назария тилининг интерпретацияси. Берилган интерпретацияда формулаларнинг чинлик қийматлари. Назариянинг модели

- Интерпретация.** Формулагага интерпретация берши. Берилган интерпретацияда формуланинг чинлик қийматлари. Формуланинг бажарилувчалиги тушунчаси. Назариянинг модели.

6.1. Назария тилининг интерпретацияси.

Таъриф. Формула маркибига кирувчи ҳамма константалар, ўзгарувчилар, функционал ва предикат ҳарфларга аниқ

мазмун ва ҳамма эркин ўзгарувчиларга ўзгармас қиймат беришга формула ёки формулалар мажсумига интерпретация бериш деб аталади.

Масалан, $\exists x_1 A_1^2(f_1^2(x_1, a_0), x_2)$ формулага икки хил интерпретация беришни кўрайлик. Биринчи интерпретацияда ҳамма ўзгарувчилар ҳақиқий қиймат олади, $a_0 = 1$, $f_1^2(x, y) = x + y$, $A_1^2(x, y) = x < y$ ва эркин ўзгарувчи $x_2 = 2$ деб ҳисоблаймиз. У ҳолда қуйидаги чин арифметик мулоҳазага эга бўламиз: «Шундай x_1 мавжудки, $x_1 + 1 < 2$ » иккинчи интерпретацияда ҳамма ўзгарувчиларнинг M ўзгариш соҳаси иккита a_0 ва a_1 ҳарфларидан иборат, эркин ўзгарувчи $x_2 = a_1$, f_1^2 функция ва A_1^2 предикат қуйидаги жадваллар билан берилган деб ҳисоблаймиз:

x	y	f_1^2	x	y	$A_1^2(x, y)$
a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	ё
a_0	a_1	a_0	a_0	a_1	ё
a_1	a_0	a_1	a_1	a_0	ч
a_1	a_1	a_0	a_1	a_1	ё

У ҳолда x_1 ўзгарувчига боғлиқ бўлган $A \equiv A_1^2(f_1^2(x_1, a_0), a_1)$ предикатнинг қиймати қуйидаги жадвал билан аниқланади:

x_1	$y = f_1^2(x_1, a_0)$	$A_1^2(y, a_1)$
a_0	a_0	ё
a_1	a_1	ё

A предикат ўзгарувчиларининг ҳамма қийматлар сатрида ёлғон қиймат қабул қилганлиги учун $\exists x_1 A(x_1)$ мулоҳаза ёлғон қиймат қабул қиласди. Демак, исталган интерпретацияда формула мулоҳазага айланади. Бу мулоҳазанинг чинлик қийматини биз аниқлай оламиз.

M тўплам интерпретациянинг предмет соҳаси деб аталади. Бу тўплам чексиз ҳам бўлиши мумкин.

Шундай қилиб, интерпретация сифатида ўз таркибида куйидагилар бўлган системани тушунамиз:

1) интерпретация соҳаси деб аталаған бўш бўлмаган *M* тўплам;

2) *T* назария тилининг ҳар бир элементига *M* тўпламнинг ягона элементини, аникроқ айтганда, $\langle A(T), E(T) \rangle$ аниқланиш соҳаси ва қийматлар соҳаси *M* тўпламнинг қисм тўплами бўлган функцияни мос қилиб қўядиган бирор мослих.

2- бандни куйидагича тушуниш керак: ҳар қайси предикат $A_j'' \in \langle A(T), E(T) \rangle$ ҳарфга *M* тўпламнинг бирор *n*-жойли муносабатини, ҳар қайси функционал $f_j'' \in \langle A(T), E(T) \rangle$ ҳарфга *M* тўпламдаги бирор *n*-жойли амални ва ҳар қайси *a*, предмет константага *M* тўпламнинг қандайдир элементи москўйлади.

Берилган интерпретацияда предмет ўзгарувчилар *M* тўпламдан қиймат олувчи ўзгарувчилар сифатида қаралади, мантикий ва квантор амаллари символларига бўлса одатдаги мазмунни берилади. Бундай интерпретация учун:

1) эркин ўзгарувчиси бўлмаган ҳар қандай формула (ёпиқ формула) чин ёки ёлғон қиймат қабул қилувчи мулоҳазани ифодалайди;

2) эркин ўзгарувчиси бўлган ҳар қандай формула интерпретация соҳасига нисбатан бирор муносабатни ифодалайди. Бу муносабат ўзгарувчиларнинг интерпретация соҳасидаги айрим қийматларида чин ва бошқа қийматларида ёлғон қиймат қабул қилиши мумкин.

Масалан, интерпретация соҳаси сифатида бутун мусбат сонлар тўпламини олайлик ва $A_1^2(x_1, x_2)$ предикатга $x_1 \leq x_2$ деб интерпретация берайлик. У ҳолда $A_1^2(x_1, x_2)$ предикат $a \leq b$ муносабатни қаноатлантирувчи ҳамма тартибланган (*a, b*) бутун мусбат сонлар жуфтлиги учун чин қиймат қабул қиласди.

$\forall x_2 A_i^2(x_1, x_2)$ формула «Хар қандай бутун мусбат x_2 сон учун $x_1 \leq x_2$ » деган муносабатни билдиради. Бу муносабат фақатгина битта 1 сони учун чиндир.

$\exists x_1 \forall x_2 A_i^2(x_1, x_2)$ формула бўлса, энг кичик мусбат сон мавжудлигини билдиради ва у бутун мусбат сонлар тўпламида чин бўлади.

6.2. Берилган интерпретацияда формуланинг чинлик қийматлари. M соҳали бирор интерпретация берилган бўлсин. G – шу M соҳадаги ҳамма саноқли кетма-кет келувчи элементлар тўплами. $S = (b_1, b_2, \dots, b_n, \dots) \in G$ кетма-кетликда A формуланинг **бажарилувчанилиги** тушунчасини аниқлайдайлик.

Қийматлар соҳаси M бўлган ҳамма термлар тўпламида аниқланган бир аргументли (ўзгарувчили) S^* функцияни қуидаги индуктив аниқлаймиз:

- 1) агар t терм x_i предмет ўзгарувчи бўлса, у ҳолда $S^*(t) = b_i$;
- 2) агар t терм константа бўлса, у ҳолда $S^*(t)$ бу константанинг M даги интерпретацияси билан мос тушади;
- 3) агар M соҳада g интерпретацияланувчи f_j'' функционал ҳарф ва t_1, t_2, \dots, t_n термлар бўлса, у ҳолда

$$S^*(f_j''(t_1, t_2, \dots, t_n)) = g(S^*(t_1), \dots, S^*(t_n)).$$

Шундай қилиб, S^* – бу S кетма-кетлик билан аниқланаидиган ва ҳамма термлар тўпламини M соҳага акслантирадиган функциядир. Оддий қилиб айтганда, ҳар қандай $S = (b_1, b_2, \dots, b_n, \dots)$ кетма-кетлик ва ихтиёрий t терм учун $S^*(t)$ функция M тўпламнинг элементидир. Бу элемент t терм ифодасига кирувчи ҳамма x_i ўзгарувчилар ўрнига b_i элементларни қўйиш ва ундан кейин t термнинг функционал ҳарфларига мос келувчи ҳамма интерпретация операцияларини бажариш натижасида ҳосил бўлади.

Масалан, t терм $f_2^2(x_3, f_1^2, (x_1, a_1))$ ва бутун сонлар тўпими интерпретация соҳаси бўлсин, f_2^2 – оддий кўпайтма гида, f_1^2 – қўшиш сифатида, a_1 эса 5 сони сифатида

интерпретацияланади. У ҳолда ихтиёрий $S = (b_1, b_2, \dots, b_n, \dots)$ бутун сонлар кетма-кетлиги учун $S^*(t)$ функция $b_3 \times (b_1 + 5)$ бутун сонни ифода этади.

Энди формуланинг индуктив таърифига ўхшаб, **бажарилган формула** тушунчасини аниқлаймиз:

1) агар A ушбу $A''_j(t_1, t_2, \dots, t_n)$ элементар формула ва B''_j муносабат унга мос бўлган интерпретация бўлса, у ҳолда A формула шунда ва фақат шундагина S кетма-кетлиқда **бажарилган** деб ҳисобланади, қачонки

$$B''_j(S^*(t_1), S^*(t_2), \dots, S^*(t_n))$$

B''_j муносабатга қарашли бўлса;

2) \bar{A} формула шунда ва фақат шундагина S да бажарилган бўлади, қачонки A формула S да бажарилмаган бўлса;

3) $A \rightarrow B$ формула шунда ва фақат шундагина S да бажарилган бўлади, қачонки A формула S да бажарилмаган ёки B формула S да бажарилган бўлса;

4) $\forall x A$ формула фақат ва фақат шундагина S да бажарилган бўлади, қачонки A формула S дан фақатгина i - компоненти билан фарқ қилувчи G тўпламнинг ихтиёрий кетма-кетлигига бажарилган бўлса.

Бу таърифдан кўриниб турибидики, A формула ифодасидаги эркин кирувчи x_i ўзгарувчилар ўрнига b_i ни қўйиш натижасида ҳосил бўладиган мулоҳаза берилган интерпретацияда чин қийматга эга бўлганда ва фақат шундагина $S = (b_1, b_2, \dots, b_n, \dots)$ кетма-кетлиқда A формула бажарилган бўлади.

1-таъриф. *Берилган интерпретацияда A формула G нинг исталган кетма-кетлигига бажарилган бўлса, шунда ва фақат шундагина у чин деб аталади.*

2-таъриф. *Берилган интерпретацияда A формула G нинг ҳар қандай кетма-кетлигига бажарилмаган бўлса, шунда ва фақат шундагина у ёғон деб аталади.*

6.3. Назариянинг модели.

3-тәріф. *Назария тилининг интерпретацияси шу назариянинг модели деб аталади.*

Оддийроқ қилиб айтганда, бирорта назария берилған бўлса, бу назариянинг бошлангич тушунчаларига янги маъно берамиз. Агар айрим предметлар мажмуаси ва интерпретация сифатида олинган улар орасидаги муносабатлар назариянинг ҳамма аксиомаларини қаноатлантируса, у ҳолда у берилған аксиоматик назариянинг модели деб аталади. Масалан, олдинги параграфларда Буль алгебрасини аниқлаган ва унинг иккита моделини кўрсатган эдик: мантиқ алгебраси ва тўпламлар алгебраси.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. 1) M тўпламнинг ўзини ўзига барча ўзаро бир қийматли акслантиришлари тўплами шу акслантиришларнинг суперпозицияси амали билан биргаликда қаралганда;
- 2) ҳамма бутун сонлар тўплами Z бутун сонларни қўшиш амали билан биргаликда қаралганда;
- 3) текисликнинг ҳамма V_1 векторлар тўплами векторларни учбурчак ёки параллелограмм қоидаси бўйича қўшиш амали билан биргаликда қаралганда гуруҳ бўлишини исботланг.
2. Агар $H, A \vdash B$ ва A нинг эркин ўзгарувчисига кванторни боғлаш қоидасини ишлатмасдан келтириб чиқарилган формулалар мавжуд бўлса, у ҳолда $H \vdash A \rightarrow B$ эканлигини исботланг.
3. Агар A формула ёпиқ ва $H, A \vdash B$ бўлса, у ҳолда $H \vdash A \rightarrow B$ бўлишини исботланг.
4. Интерпретация ва интерпретация соҳаси деб нимани тушунасиз? Мисоллар келтиринг.
5. $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$ бўлишини исботланг ([4], 58-бет).
6. Агар $A_1, \dots, A_m \vdash B$ бўлса, у ҳолда $A_1 \wedge \dots \wedge A_m \vdash B$ эканлигини исботланг ([4], 58-бет).



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Қисман тартиблаш назарияси. Гурухлар назарияси.
2. Натурал сонларнинг аксиоматик назарияси. Кесмалар тенглиги назарияси.
3. Назарияда исботлаш тушунчаси. Исботланувчи муроҳаза. Тавтология хусусий ҳолларининг исботланувчанлиги.
4. Дедукция теоремаси. Формулалар мажмуасидан формулани келтириб чиқариш.
5. Назария тилининг интерпретацияси. Берилган интерпретацияда формулаларнинг чинлик қийматлари.
6. Формуланинг бажарилувчанлиги тушунчаси. Назариянинг модели.

7- §. Интерпретациянинг изоморфизмлари. Назариянинг қатъйлиги

Изоморфизм. Назариянинг қатъйлиги. Бажарилувчи формула. Изоморф. μ - қатъий назария.

1-тәріф. Агар биринчи тартибли T назариянинг берилған I_1 интерпретациясини шу назариянинг I_2 интерпретациясига ўтказувчи (изоморфизм деб аталадиган) ўзаро бир қийматлы акслантириш мавжуд бўлиб, шу билан бирга:

1) агар A_j^n предикат ҳарфнинг I_1 ва I_2 интерпретациялари мос равишда $(A_j^n)^1$ ва $(A_j^n)^2$ лар бўлганда, M_1 соҳадаги b_1, b_2, \dots, b_n ларнинг қандай бўлишидан қатъи назар, $(A_j^n)^2(g(b_1), g(b_2), \dots, g(b_n))$ бажарилувчи бўлганда ва фақат шундагина $(A_j^n)^1(b_1, b_2, \dots, b_n)$ бажарилса;

2) агар f_j^n функционал ҳарфнинг I_1 ва I_2 интерпретациялари мос равишда $(f_j^n)^1$ ва $(f_j^n)^2$ бўлганда M_1 соҳадаги ҳар қандай b_1, b_2, \dots, b_n лар учун

$$(f_j^n)^1(b_1, b_2, \dots, b_n) = (f_j^n)^2(g(b_1), g(b_2), \dots, g(b_n))$$

бажарилса;

3) агар предмет константанинг I_1 ва I_2 интерпретациялари мос равишда a_j^1 ва a_j^2 бўлганда, $a_j^2 = g(a_j^1)$ бўлса, у ҳолда I_1 интерпретация I_2 интерпретацияга изоморф дейилади.

Равшанки, агар I_1 ва I_2 интерпретациялар изоморф бўлса, у ҳолда уларнинг соҳалари бир хил қувватга эга бўлади.

Теорема. Агар g берилган I_1 ва I_2 интерпретацияларнинг изоморфизми бўлса, у ҳолда:

(1) T назариянинг A формуласи ва M_1 соҳа элементлари кетма-кетлиги $S = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ нинг қандай бўлишиларидан қатъи назар, A формула мос $g(S) = (g(b_1), g(b_2), \dots, g(b_n))$ кетма-кетликда бажарилувчи бўлганда ва фақат шундагина S да бажарилувчи бўлади ва, демак,

(2) A формула M_2 соҳада чин бўлганда ва фақат шундагига M_1 соҳада чин бўлади.

Исбот. (2) хуносадан келиб чиқади. (1) хуносани A формуладаги кванторлар ва мантикий боғловчилар сонига қараб индукция методи билан исботлашни ўқувчига ҳавола қиласиз.

2-тариф. Агар математик назариянинг ҳамма моделлари изоморф бўлса, у ҳолда у қатъий математик назария деб аталади.

3-тариф. μ – бирор тўпламнинг қуввати бўлсин. Агар биринчи тартибли T назария:

(1) ҳеч бўлмагандага битта μ қувватли моделга эга бўлса ва;

(2) унинг μ қувватли ҳар қандай иккита модели изоморф бўлса, у ҳолда бундай биринчи тартибли T назария μ -қатъий назария деб аталади.

Масалан, гурӯҳлар назарияси қатъий назария эмас, чунки изоморф бўлмаган гурӯҳлар мавжуд. Аммо айрим қувватларда гурӯҳлар назарияси қатъийдир, масалан, $\mu = 3$ қувватда шундай бўлади.

Евклид геометрияси қатъий математик назарияга мисол бўла олади, чунки унинг исталган иккита модели изоморфдир. Ҳақиқатан ҳам, Евклид геометриясининг исталган модели арифметик модел билан изоморф эканлигини осонгина кўрсатиш мумкин.

Евклид геометриясининг ихтиёрий моделида тўғри чизиқни оламиз ва унда O нуқтани белгилаймиз. Бундан кейин ўша чизиқда O нуқтадан фарқ қилувчи m нуқтани танлаб оламиз. Om кесмани бирлик сифатида қабул қиласиз. Тўғри чизиқда мусбат йўналишни танлаб олиш натижасида сонли ўқни ҳосил қиласиз.

Ўзаро перпендикуляр бўлган сонли тўғри чизиқлар *тўғри бурчакли декарт координата системаси* деб аталади. Бу система текисликдаги ҳар бир нуқтага шу нуқтанинг координаталарини ўзаро бир қийматли равишда мос қўяди. Худди шу каби, бу система текисликдаги ҳар бир тўғри чизиқка унинг тенгламасини мос қўяди. Евклид геометриясининг бошқа моделида ҳам текисликда худди шу тарзда иш кўрамиз.

Евклид геометриясининг ҳар хил моделлари ўртасида изоморфизмни ўрнатиш натижасида аналитик геометрияни яратиш мумкин.

8- §. Назариянинг зидсизлик, тўлиқлилик ва ечилиш муаммолари

Зидсиз назария. Зиддиятга эга бўлган назария. Зидсизлик муаммоси. Абсолют тўлиқ назария. Тор маънода тўлиқ назария. Тўлиқлилик муаммоси. Ечилиш муаммоси.

8.1. Зидсизлик муаммоси.

1-таъриф. Агар T назарияда шундай S мулоҳаза топилиб, у ўзининг инкори \bar{S} билан бирга теорема бўлса, у ҳолда T зиддиятга эга бўлган назария деб аталади. Акс ҳолда T зидсиз назария дейилади.

Агар T назарияда S мулоҳаза топилиб, у ўзининг инкори \bar{S} билан бирга теорема бўлмаса, шунда ва фақат шундагина у зидсиз назария бўлади.

T назарияда келтириб чиқариш қоидасининг бири сифатида хулоса қоидаси мавжуд бўлганидан, зиддиятга эга бўлган назариянинг исталган мулоҳазаси теорема бўлади.

Ҳақиқатан ҳам, T назариянинг исталған A муроҳазаси учун $S \rightarrow (\bar{S} \rightarrow A)$ ифода теорема бўлади, чунки бу муроҳаза $S \rightarrow (\bar{S} \rightarrow A)$ тавтологиядир. Бу ерда S ва \bar{S} нинг теорема эканлигини ҳисобга олиб ва икки марта хulosса қоидасидан фойдаланиб, A – теорема деган хulosага келамиз.

Аксиоматик назарияларда зидсизлик муаммосини кўп ҳолларда модель тушунчаси орқали ечиш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, агар T назария зиддиятга эга бўлса, у ҳолда унинг модели ҳам зиддиятга эга бўлади, чунки назариянинг бир-бираига қарама-қарши бўлган жуфт теоремалари модель ҳолида бир-бираига қарама-қарши бўлган муроҳазага айланади. Демак, назария зидсиз бўлиши учун унинг зиддиятдан холи бўлган модели мавжудлигини кўрсатиш керак. Муроҳазалар ҳисобининг зидсизлигини худди шу схема орқали исбот қилган эдик.

Агар T назария учун шундай интерпретацияни топиш мумкин бўлсаки, унинг интерпретацияси чекли тўпламдан иборат бўлса, у ҳолда бу интерпретацияда зиддият мавжуд эмаслиги масаласини ечиш тўғридан-тўғри шу чекли тўпламни кўриш билан ҳал бўлади. Масалан, бир элементли тўплам битта ягона элементга эга бўлсин. Агар бу тўпламда $a \cdot a = a$ амали аниқланган бўлса, у ҳолда у зиддиятга эга бўлмаган гуруҳ назариясининг модели бўлади. Демак, гуруҳ назарияси зидсиздир.

Аммо, кўпинча, модельнинг зидсизлигини исботлаш анча мураккаб фикр юритишни талаб қиласи. Бу, айниқса, T назария фақат чексиз моделларга эга бўлган ҳолларда юз беради. Масалан, агар Евклид геометриясининг тушунчалари Лобачевский геометриясининг интерпретацияси сифатида фойдаланилса, у ҳолда Лобачевский геометриясининг зидсизлиги масаласини Евклид геометриясининг зидсизлиги масаласига келтириш мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, Евклид геометриясининг зидсизлиги ва ҳақиқий сонлар назариясининг зидсизлиги ҳозиргача исбот қилинган эмас.

8.2. Тўлиқлилик муаммоси. Агар бирор назариянинг зидсизлиги исбот этилган бўлса (ёки исбот этилиши мумкин леб ҳисобланса), у ҳолда бу назария учун тўлиқлилик муаммосини қўйиш маънога эга бўлади.

1-таъриф. *Агар T назариянинг исталган S мулоҳазаси учун ёки S , ёки унинг инкори \bar{S} теорема бўлса, у ҳолда бу назария абсолют тўлиқ деб аталади.*

Бу таъриф ушбу ҳолни ҳисобга оляпти: T назариянинг исталган S мулоҳазасининг бирор моделдаги интерпретацияси ёки чин, ёки ёлғон бўлади. У ҳолда T назарияда ёки S , ёки \bar{S} теорема бўлиши керак.

Бир вақтда зидсиз ва тўлиқ бўлган T назария зидсизликка нисбатан шу маънода максимал бўладики, бу назарияга аксиома сифатида шу назарияда мумкин бўлган исталган (аммо унинг теоремаси бўлмаган) мулоҳазани қўшганда, зиддиятга эга бўлган назария ҳосил бўлади.

Кўп математик назариялар бир вақтда зидсиз ва тўлиқлилик хусусиятига эга эмас.

2-таъриф. *Агар аксиомалари қаторига ҳамма келтириб чиқарии қоидаларини сақлаган ҳолда, исталган исботланмайдиган тасдиқни қўшганда, зиддиятга эга бўлган назария ҳосил бўладиган аксиоматик назария тор маънода тўлиқ деб аталади.*

Ҳар қандай абсолют тўлиқ назария тор маънода ҳам тўлиқ бўлади. Ҳақиқатан ҳам, бирор абсолют тўлиқ назария тор маънода тўлиқ бўлмасин. У вақтда бу назарияда исботланмайдиган шундай A тасдиқ топиладики, аввалги аксиомалар ва янги аксиома сифатидаги A тасдиқдан яратилган янги назария зидсиз, демак, A янги назарияга тегишли бўлади. Иккинчидан, дастлабки назариянинг абсолют тўлиқлигидан ва унда A исботланмайдиган тасдиқ бўлганидан A исботланадиган тасдиқ бўлади. Шундай қилиб, янги назарияда A ва \bar{A} исботланувчи бўлди, яъни қарама-қаршиликка келдик. Демак, фаразимиз нотўғри ва ҳар қандай абсолют тўлиқ назария тор маънода ҳам тўлиқ бўлар экан.

8.3. Ечилиш муаммоси. Ечилиш муаммоси алгоритмик муаммо бўлиб, унда берилган A тўплам учун шундай U алгоритм тузиш керакки, бу алгоритм A ни бошқа B тўпламга нисбатан ($A \subset B$) ечувчи (ҳал этувчи) бўлсин, яъни бу U алгоритм B нинг ҳар бир элементига татбиқ этилади ҳамда $x \in A$ лар учун $U(x) = 1$, $x \in B \setminus A$ лар учун эса $U(x) = 0$ деб ҳисобланади.

Ечилиш муаммосига оддий мисол сифатида мулоҳазалар алгебрасидаги ечилиш муаммосини кўрсатиш мумкин, у шундай алгоритмни топишдан иборатки, бу алгоритм воситаси билан мулоҳазалар алгебрасидаги ҳар бир формууланинг ёки айнан чин, ёки айнан ёлғон, ёки бажарилувчи эканлитикини аниқлаш мумкин. Алгоритмик муаммонинг муҳим синфи формал назариялар учун ечилиш муаммосидир, яъни ҳамма исботланувчи формуулалар тўплами учун формуулалар назариясидаги (A тўплам) назариянинг ҳамма формуулалар тўпламига (B тўплам) нисбатан ечилиш муаммосидир. Биз уни мулоҳазалар ҳисобининг аксиоматик назарияси учун кўрган эдик.

9- §. Предикатлар ҳисобининг зидсизлиги (махсус аксиомаларсиз назария)

- Биринчи тартибли предикатлар. Предикатлар ҳисоби. Предикатлар ҳисобининг зидсизлиги. Тавтология.*

Таъриф. *Махсус аксиомаларга эга бўлмаган биринчи тартибли назария биринчи тартибли предикатлар ҳисоби деб аталади.*

Теорема. *Ҳар қандай биринчи тартибли предикатлар ҳисоби T зидсизdir.*

Исбот. Ихтиёрий A формуладан қўйидагича ўзгартиришлар натижасида ҳосил қилинадиган ифодани $H(A)$ билан белгилаймиз. A формуладаги ҳамма квантор ва термлар қавслар ва вергуллари билан биргаликда ташлаб иборилади. Масалан, $\forall x A_1^2(x, y) \rightarrow A_1^1(z)$ формула юқорида кўрсатилган

ўзгартиришлардан кейин $A_1^2 \rightarrow A_1^1$ кўринишни олади, яъни $H(\forall x A_1^2(x, y) \rightarrow A_1^1(z))$ ифода $A_1^2 \rightarrow A_1^1$ кўринишга, худди шу каби $H(\exists t A_2^3(x, y, t) \rightarrow A_3^1(z))$ ифода $\overline{A_2^3} \rightarrow A_3^1$ кўринишга келади.

Равшанки, $H(\bar{A}) = \overline{H(A)}$ ва $H(A \rightarrow B) = H(A) \rightarrow H(B)$. Осонгина кўрсатиш мумкинки, предикатлар ҳисобининг A формуласи учун $H(A)$ формула мулоҳазалар ҳисобининг формуласидир ва қандайдир схема орқали 1–5- аксиомалардан (3- § га қаранг) ҳосил этилган ҳар қандай A аксиома учун $H(A)$ тавтология бўлади. Бу 1–3- аксиомалар шундайгина кўзга ташланиб турибди. $\forall x A(x) \rightarrow A(t)$ аксиома учун $H(\forall x A(x) \rightarrow A(t))$ формула $A \rightarrow A$ кўринишда бўлади, яъни тавтологиядир. $\forall x (A \rightarrow B(x)) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B(x))$ аксиома учун $H(\forall x (A \rightarrow B(x)) \rightarrow (A \rightarrow \forall x B(x)))$ формула $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ муносабатга айланади, яъни бу ҳам тавтологиядир.

Агар мулоҳазалар ҳисобидаги хулоса қоидасини A , $A \rightarrow B$ тавтологияларга қўлласак, у ҳолда B тавтологияга келамиз. Шундай қилиб, агар $H(A)$ ва $H(A \rightarrow B)$ тавтологиялар бўлса, у ҳолда $H(B)$ ҳам тавтология бўлади.

H операциясини A ва $\forall x A$ формулаларга қўллаш натижасида олинган натижалар бир хил бўлганлиги учун, агар $H(A)$ тавтология бўлса, у ҳолда $H(\forall x A)$ ҳам тавтология бўлади.

Демак, агар предикатлар ҳисобида A теорема бўлса, у ҳолда $H(A)$ тавтология бўлади.

Айтилганлардан шу нарса келиб чиқадики, агар предикатлар ҳисобида B ва \bar{B} исботланувчи бўладиган шундай B формула мавжуд бўлса эди, у ҳолда мулоҳазалар ҳисобида $H(B)$ ва $H(\bar{B})$ лар тавтология, яъни исботланувчи формуласлар бўлар эди. Аммо бу мумкин эмас. Демак, предикатлар ҳисоби зидсиздир.

Изоҳ. H операцияси предикатлар ҳисобининг бир элементли соҳага интерпретацияси билан тенг кучлидир. Предикатлар ҳисобининг ҳамма теоремалари бу интерпретацияда тўғридир (чиндир).

10-§. Натурал сонлар назарияси. Гёделнинг тўлиқсизлик ҳақидаги теоремаси

Пеано аксиомалар системаси. Натурал сонлар назариясининг маҳсус аксиомалари. Аксиомалар системасидан келиб чиқадиган натижалар. Гёделнинг тўлиқсизлик ҳақидаги биринчи ва иккинчи теоремалари.

10.1. Натурал сонлар назарияси. Натурал сонлар назариясининг аксиоматик характеристикасини (тавсифномасини) 1888 йилда Дедекинд томонидан берилганига қарамасдан, натурал сонлар арифметикасининг аксиоматик тузилишини кўпинча «Пеано аксиомалар системаси» деб айтадилар.

Аксиоматик натурал сонлар назарияси *тили алфавитининг ҳарфи қўйидаги формал символлардан* иборат: константа 0, сонли ўзгарувчилар, тенглик символи $=$, $+$, \cdot , $'$ (1 ни қўшиш) функционал символлар ва \wedge , \vee , \rightarrow , \neg , \forall , \exists мантиқий боғловчилардан иборат.

1-таъриф. *Формал символларнинг чекли кетма-кетлиги формал ифодалар деб аталади.*

Масалан, $x =$, $= + x y$ ва $x y z =$, $(x)' + y$ формал ифодалар бўлади.

Формал ифодалар иккита синфга бўлинади: *термлар синфи ва формулалар синфи*.

Константа 0 ва сонли ўзгарувчилардан функционал символлар орқали термлар тузилади.

2-таъриф. 1) 0 – терм бўлади; 2) x, y, z, \dots сонли ўзгарувчилар терм бўлади; 3–5) агар r ва s – терм бўлса, у ҳолда (r') , $(r) + (s)$ ва $(r) \cdot (s)$ терм бўлади; 6) 1–5-банларда аниқланган термлардан бошқа ҳеч қандай терм мавжуд эмас.

Бу назарияда элементар формулалар термлар ва уларнинг тенгликларидан иборат бўлади. Бошқа формулалар элементар формулалардан \wedge , \vee , \rightarrow , \neg , \forall , \exists мантиқий боғловчилар орқали ҳосил қилинади.

3-таъриф. 1) Агар r ва s термлар бўлса, у ҳолда $(r) = (s)$ формула бўлади; 2–5) Агар A ва B формулалар бўлса, у ҳолда $A \rightarrow B$, \bar{A} , $A \wedge B$, $A \vee B$ ҳам формуулалар бўлади; 6–7) Агар A – формула ва x – ўзгарувчи бўлса, у ҳолда $\forall x(A)$ ва $\exists x(A)$ формуулалар бўлади; 8) 1–7-бандларда аниқланган формуулалардан бошқа ҳеч қандай формула мавжуд эмас.

Формулалар аксиоматик натурал сонлар назариясида арифметик формуулалар деб аталади.

Изоҳ. 2-таърифдаги « r », « s » формал символлар эмас. Улар метатилда фойдаланиладиган математик ўзгарувчилардир. Шунинг учун « $(r) + (s)$ » формал ифода эмас. Агар « r » ва « s » ўрнига термлар кўйилса, у ҳолда у формал ифода бўлади.

Худди шу каби, 3-таърифдаги « A » ва « B » ҳамда « x » математик ўзгарувчилардир. Уларнинг ўрнига мос равишида маълум қийматлари кўйилгандагина, таърифдаги ифодалар формуулаларга айланади.

Пеано аксиомалар системаси қўйидагилардан иборат:

1) 0 – натурал сон;

2) ҳар қандай x натурал сон учун бошқа x' натурал сон мавжуд ва уни x кетидан келадиган деб айтилади;

3) $0 \neq x'$ – ҳар қандай x натурал сон учун;

4) агар $x' = y'$ бўлса, у ҳолда $x = y$;

5) агар Q хосса бўлиб, айрим натурал сонлар бу хоссага эга бўлиши ва бошқа натурал сонлар бу хоссага эга бўлмаслиги мумкин бўлса ва агар:

(1) 0 натурал сон бу хоссага эга ва;

(2) ҳар қандай x натурал сон учун, агар x натурал сон Q хоссага эга бўлишидан x' натурал сон ҳам Q хоссага эга бўлиши келиб чиқса, у ҳолда ҳамма натурал сонлар Q хоссага эга бўлиши келиб чиқади (индуksия қонуни (принципи)).

Бу аксиомалар тўпламлар назариясининг айрим фрагментлари билан биргаликда, Э.Ландау кўрсатганидек, нафакат натурал сонлар, балки ҳақиқий, рационал ва комплекс сонлар назарияларини яратишга етарлидир.

Аммо бу аксиомаларда интуитив түшүнчалар мавжуд, масалан, хосса түшүнчаси. Бу нарса бутун системани қатъ-ий формаллаштиришга түсқинлик қиласы. Шунинг учун Пеано аксиомалари системасига асосланган янги биринчи тартибли T назария яратамиз. T назария элементтар арифметиканинг ҳамма асосий натижаларини көлтириб чиқаришга естарлады.

Бу биринчи тартибли T назария биттә A_1^2 предикат ҳарф, ягона a_1 предмет константа ва учта f_1^1, f_1^2, f_1^3 функционал ҳарфга эгадыр. Формал әмас арифметика билан алоқаны уз-масликтар үчүн унинг белгиларидан фойдаланиб, A_1^2, a_1 ва f_1^j ($j = 1, 3$) ларни күйидагича ёзамиз:

$$\begin{aligned} a_1 &\text{ ўрнига } 0, \\ A_1^2(t, s) &\text{ ўрнига } t = s, \\ f_1^1(t) &\text{ ўрнига } t, \\ f_1^2(t, s) &\text{ ўрнига } t + s, \\ f_1^3(t, s) &\text{ ўрнига } t \cdot s, \end{aligned}$$

бу ерда t ва s – термлар.

T натурал сонлар назарияси күйидаги маҳсус аксиомаларга эга:

1. $x_1 = x_2 \rightarrow (x_1 = x_3 \rightarrow x_2 = x_3)$.
2. $x_1 = x_2 \rightarrow x'_1 = x'_2$.
3. $0 \neq (x_1)'$.
4. $x'_1 = x'_2 \rightarrow x_1 = x_2$.
5. $x_1 + 0 = x_1$.
6. $x_1 + x'_2 = (x_1 + x_2)'$.
7. $x_1 \cdot 0 = 0$.
8. $x_1 \cdot x'_2 = x_1 \cdot x_2 + x_1$.
9. $A(0) \rightarrow (\forall x(A(x) \rightarrow A(x')) \rightarrow \forall x A(x))$.

бу ерда $A(x)$ – натурал сонлар назариясининг иктиёрий формуласы.

1–8- аксиомалар аниқ формулалардир, аммо 9- аксиома чексиз аксиомалар түпламини туғдирадиган аксиомалар схемасидан иборат.

Бу аксиомалар схемаси *математик индукция принципи* леб аталағы ва у Пеано аксиомалар системасидаги 5- аксиомага умуман мос келмайды, чунки 9- аксиомалар схемаси фәқат T назария формулалари орқали аниқланадиган саноқлы хоссалар түплами билан иш күради.

Назариянинг 3 ва 4- аксиомалари Пеано аксиомалар системасининг 3 ва 4- аксиомаларига мос келади.

Пеано аксиомалар системасидаги 1 ва 2- аксиомалар 0 нинг ва «кетидан келадиган» амалнинг мавжудлигини таъминлайды, T назарияда бўлса, буларга 0 предмет константа ва f_i^1 функционал ҳарф мос келади. T назариядаги 1 ва 2- аксиомалар тенгликнинг айrim зарурый хоссаларини таъминлайды. Дедекинд ва Пеано бу хоссаларни интуитив аниқ деб фараз қилган эдилар. Назариядаги 5–8- аксиомалар рекурсив тенгликларни ифодалайди. Бу аксиомалар қўшиш ва кўпайтириш амалларини аниқлайди.

Дедекинд ва Пеано бу аксиомаларга мос келадиган ҳеч қандай постулатлар формулировкасини бермаган эдилар, чунки улар интуитив түпламлар назариясидан фойдаланган эдилар. Түпламлар назариясида T назариясидаги 5–8- аксиомаларни қаноатлантирувчи $+$, \cdot амаллари чиқарилувчидир.

9- аксиомалар схемасидан қуйидаги индукция қоидасини ҳосил қиласиз: *агар $A(0)$ ва $\forall x(A(x) \rightarrow A(x'))$ бўлса, у ҳолда $\forall xA(x)$.*

T назариянинг аксиомалар системасидан қуйидаги натижалар келиб чиқади. Бу натижалардан формулаларни соддалаштириш ва умуман теоремаларни оддийроқ исботлаш учун фойдаланилади.

1-лемма. *T назариянинг ҳар қандай t , s ва r термлари учун қуйидаги формулалар T да теорема бўлади:*

$$1'. t = r \rightarrow (t = s \rightarrow r = s). \quad 2'. t = r \rightarrow t' = r'.$$

$$3'. 0 \neq t'. \quad 4'. t' = r' \rightarrow t = r.$$

$$5'. t + 0 = t.$$

$$7'. t \cdot 0 = 0.$$

$$6'. t + r' = (t + r)'.$$

$$8'. t \cdot r' = (t \cdot r) + t.$$

2-лемма. Ҳар қандай t , s ва r термлар учун қуийдаги формулалар T назарияда теорема бўлади:

- a) $t = t$;
- b) $t = r \rightarrow r = t$;
- c) $t = r \rightarrow (r = s \rightarrow t = s)$;
- d) $r = t \rightarrow (s = t \rightarrow r = s)$;
- e) $t = r \rightarrow t + s = r + s$;
- f) $t = 0 + t$;
- g) $t' + r = (t + r)'$;
- h) $t + r = r + t$;
- i) $t = r \rightarrow s + t = s + r$;
- j) $(t + r) + s = t + (r + s)$;
- k) $t = r \rightarrow t \cdot s = r \cdot s$;
- l) $0 \cdot t = 0$;
- m) $t' \cdot r = t \cdot r + r$;
- n) $t \cdot r = r \cdot t$;
- o) $t = r \rightarrow s \cdot t = s \cdot r$.

10.2. Гёделнинг тўлиқсизлик ҳақидаги теоремаси. Гёделнинг тўлиқсизлик ҳақидаги теоремаси сифатида Гёделнинг қуийдаги иккита теоремасининг умумий номини тушунадилар.

Гёделнинг биринчи теоремаси (тўлиқсизлик ҳақида). Минимум арифметикани қамраб олган ҳар қандай қарама-қаршиликка эга бўлмаган формал системада ва, демак, натурал сонлар назариясида формал ечилмовчи фикр топилади, яъни шундай ёпиқ A формула топиладики, на A , на \bar{A} ни системада келтириб чиқариш мумкин эмас.

Гёделнинг иккинчи теоремаси (тўлиқсизлик ҳақида) тасдиқлайдики, табиий қўшимча шартлар бажарилганда A ўрнида кўрилаётган системанинг қарама-қаршиликка эга эмаслиги ҳақидаги тасдиқни олиш мумкин.

Гёделнинг биринчи теоремаси қуйидагини билдиради: *арифметикада қандай аксиомалар тизими танлашимиздан қатъи назар, формал назария тилида ифодаланган натурал сонлар ҳақида шундай мулоҳаза топиладики, уни берилган назарияда на исбот қилиб бўлади ва на рад этиб бўлади.*



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Агар I_1 ва I_2 интерпретациялар изоморф бўлса, у ҳолда уларнинг соҳалари бир хил қувватга эга бўлишини исботланг.
2. Евклид геометриясининг қатъий математик назарияга мисол бўла олишини кўрсатинг.
3. Ҳар қандай абсолют тўлиқ назария тор маънода ҳам тўлиқ бўлишини исботланг.
4. Предикатлар ҳисобининг A формуласи учун $H(A)$ формула мулоҳазалар ҳисобининг формуласи бўлишини кўрсатинг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Интерпретациянинг изоморфизмлиги. Назариянинг қатъийлиги.
2. Бажарилувчи формула. μ - қатъий назария.
3. Зидсиз ва зиддиятга эга бўлган назариялар. Зидсизлик муаммоси.
4. Абсолют тўлиқ назария. Тор маънода тўлиқ назария. Тўлиқлилик муаммоси.
5. Назариянинг ечилиш муаммоси.
6. Биринчи тартибли предикатлар ҳисоби ва унинг зидсизлиги.
7. Пеано аксиомалар системаси. Натурал сонлар назариясининг маҳсус аксиомалари.
8. Аксиомалар системасидан келиб чиқадиган натижалар. Гёделнинг тўлиқсизлик ҳақидаги биринчи ва иккинчи теоремалари.

Бу бобда алгоритмлар назариясининг элементлари атрофлича баён этилган. Бу ерда алгоритм тушунчаси ва унинг характерли хусусиятлари, ечишувчи ва саналувчи тўпламлар, Пост теоремаси, алгоритм тушунчасини аниқлаш, ҳисобланувчи функциялар, қисмий рекурсив ва умумрекурсив функциялар, А.Чёрч ва С.Клини тезислари, Тьюринг машиналари, Тьюринг машинасида алгоритмни реализация қилиш, натурал сонларни қўшиш алгоритми, Евклид алгоритми, алгоритмлар назариясининг асосий гипотезаси, Марковнинг нормал алгоритмлари, Марков бўйича қисман ҳисобланувчи ва ҳисобланувчи функциялар, қисмий рекурсив (умумрекурсив) функция билан Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи (ҳисобланувчи) функция орасидаги муносабат, нормаллаштириш принципи, алгоритмик ечишувчи муаммолар, математик мантиқда келтириб чиқарувчанликни таниш муаммоси, ўз-ўзига татбиқ этувчанликни таниш муаммоси каби масалалар кўрилган.

1- §. Алгоритм тушунчаси ва унинг характерли хусусиятлари

- Алгоритм тушунчаси. Ечуви процедура. Ечилиш муаммоси. Алгоритмнинг интиутив таърифи. Алгоритмнинг характерли хусусиятлари. Алгоритмнинг дискретлиги. Алгоритмнинг аниқланувчанлиги. Алгоритм қадамларининг элементарлиги. Алгоритмнинг оммавийлиги. Алгоритмнинг натижавийлиги.

Математиканинг асосий тушунчаларидан бири алгоритм (алгорифм) тушунчасидир. «Алгоритм» сўзи IX асрда ижод этган буюк математик ватандошимиз Абу Абдулло Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий номининг лотинча *Algoritmi* тарзида ёзилишидан келиб чиқсан.

Хар бири «ҳа» ёки «йўқ» деган жавоб талаб этувчи алгоритм саноқли-чексиз математик ёки мантикий масалалар синфиини кўрайлик. Чекли сон қадамда ушбу синфдаги ҳар қандай саволга биз жавоб бера оладиган жараёнлик (процедура) мавжудми? Агар шундай процедура мавжуд бўлса, у ҳолда у берилган саволлар синфи учун *ечувчи процедура* ёки *ечувчи алгоритм (алгорифм)* деб айтлади. Ечувчи процедурани излаш муаммоси бу синф учун *ечилиш муаммоси* деб аталади.

Формал системалар учун ечилиш муаммосини кун тартибига биринчи қўйган олимлардан Шрёдер (1895), Лёвенгейм (1915) ва Гильбертни (1918) кўрсатиш мумкин.

Масалан, қўйидагилар ечувчи алгоритмларга мисол бўла олади:

1. Сонлар устида арифметик амалларни бажариш қоидлари.
2. Квадрат илдиз чиқариш қоидаси.
3. Энг катта умумий бўлувчини топиш қоидаси (Евклид алгоритми).
4. Квадрат тенгламанинг ечимини топиш қоидаси.
5. n -тартибли кўпҳаднинг ҳосиласини топиш қоидаси.
6. Рационал функцияни интеграллаш қоидаси.

Юқорида келтирилган ҳар бир мисолда бир хил типли (турдаги) масалалар синфи билан иш кўриштга тўғри келади. Бир хил турдаги масалалар синфи *оммавий муаммо* деб аталади. Бундай синфларнинг масалалари бир-биридан факат ифодасидаги параметрлар билан фарқ қиласди. Масалан, $ax^2 + bx + c = 0$ квадрат тенгламанинг ечимини топиш масаласида a , b ва c параметрлар қатнашади. Уларнинг қийматларини ўзгартириш йўли билан бир синфга мансуб турли хил масалаларга келамиз. Айтилганларни ҳисобга олиб алгоритмнинг қўйидаги интуитив таърифини бериш мумкин.

I-таъриф. *Берилган оммавий муаммодаги барча масалаларни умумий бир хил шаклда, аниқ маълум бўлган усул билан ечиш жараёни алгоритм деб аталади.*

Бундай таърифни қатъий деб ҳисоблаш мумкин эмас. Ҳақиқатан ҳам, унда аниқ мазмуни номаълум сўзлар учрайди. Ҳусусан, бу «усул» сўзига ҳам тааллуқли. Шунинг учун ҳам алгоритмнинг бўлмаган таърифи *интуитив таъриф* деб аталади.

Энди алгоритмнинг характерли хусусиятларини кўриб ўтайлик.

1. Алгоритмнинг дискретлиги. Алгоритм — миқдорларни шундай кетма-кет қуриш жараёни, бошланғич ҳолатда миқдорларнинг дастлабки чекли системаси берилган бўлиб, ҳар бир навбатдаги моментда миқдорлар системаси маълум аниқланган қонун (дастур) асосида олдинги ҳолатдаги миқдорлар системасидан ҳосил қилинади.

2. Алгоритмнинг детерминацияланувчанлиги (аниқланувчанлиги). Бошланғич ҳолатдан фарқ қилувчи бошқа ҳолатда аниқланган миқдорлар системаси илгариги ҳолатларда ҳосил қилинган миқдорлар системаси орқали бир қийматли аниқланади.

3. Алгоритм қадамларининг элементарлиги. Илгариги миқдорлар системасидан кейингисини ҳосил қилиш қонуни содда қадамлардан иборат бўлиши керак.

4. Алгоритмнинг оммавийлиги. Бошланғич миқдорлар системасини айрим потенциал чексиз тўпламдан танлаш мумкин.

5. Алгоритмнинг натижавийлиги. Миқдорларни топиш жараёни чекли бўлиши ва натижа (масаланинг ечимини) бериши керак.

Математик амаллар асосий ролни ўйнайдиган алгоритмлар *сонли алгоритмлар* деб аталади. Бундан ташқари, *мантиқий алгоритмлар* ҳам мавжуд. Мисол сифатида, мантиқий алгоритм ишлатиладиган куйидаги ўйинни кўрамиз.

Мисол. 15 та предмет бор. Ўйинда 2 киши қатнашади: бошловчи ва унинг рақиби. Ҳар бир ўйинчи навбат билан бир, икки ёки учта предметни олади. Ким охирги предметни олса, ўша ютган ҳисобланади. Бошловчи ютиш учун ўйинда қандай стратегияни ишлатиши керак?

Е ч и м . Бошловчининг ютуқ стратегиясини қўйидаги жадвал шаклида ифодалаш мумкин:

Юриш рақами	Бошловчи юриши	Рақибнинг юриши
1	3	n
2	$4 - n$	m
3	$4 - m$	p
4	$4 - p$	o

Ҳақиқатан ҳам, бошловчи бундай стратегия натижасида $3 + (4 - n) + (4 - m) + (4 - p) = 15 - (n + m + p)$ предмет олади ва рақиб $n + m + p$ предмет олади, яъни иккаласи биргаликда 15 та предмет оладилар. Охирги предметни бошловчи олганлиги туфайли, у ўйинни ютади.

2- §. Ечишувчи ва саналувчи түпламлар

- Ечишувчи түплам. Эффектив саналувчи түплам. Пост теоремаси. Ечишувчи түплам билан эффектив саналувчи түпламлар орасидаги муносабатлар.*

Бирор алфавит берилган бўлсин. Бу алфавитдаги ҳамма сўзлар түпламини S билан ва S түпламнинг қисм түплами ни M билан белгилаймиз.

1-таъриф . Агар x сўзининг M түпламга қарашлилик муаммосини ҳал қила оладиган алгоритм мавжуд бўлса, у ҳолда M ечишувчи түплам деб аталади.

2-таъриф . Агар M түпламнинг ҳамма элементларини санаб чиқа оладиган алгоритм мавжуд бўлса, у ҳолда M эффектив саналувчи түплам деб аталади.

1-теорема . Агар M ва L эффектив саналувчи түпламлар бўлса, у ҳолда $M \cup L$ ва $M \cap L$ ҳам эффектив саналувчи түпламлардир.

Исбот. M ва L эффектив саналувчи түпламлар бўлсин. У ҳолда, 2-таърифга асосан, уларнинг ҳар бири учун алоҳида алгоритм мавжудки, бу алгоритмлар орқали мос равишда M ва L даги ҳамма элементларни санаб чиқиш мумкин. $M \cup L$ ва $M \cap L$ түпламларнинг эффектив ҳисобловчи алгоритмни M ва L түпламларнинг эффектив ҳисобловчи алгоритмларини бир вақтда қўллаш натижасида ҳосил қилинади.

2-теорема (Пост теоремаси). M түпламнинг ўзи ва тўлдирувчиси CM эффектив саналувчи бўлганда ва факат шундагина M түплам ечишувчиидир.

Исбот. а) **M тўплам ва унинг CM тўлдирувчиси эффектив саналувчи бўлсин.** У ҳолда, 2-таърифга асосан, бу тўпламларнинг элементларини санаб чиқа оладиган A ва B алгоритмлар мавжуд бўлади. У ҳолда M ва CM тўпламларнинг элементларини санаб чиқиш пайтида уларнинг рўйхатида x элемент учрайди. Демак, шундай C алгоритм юзага келадики, у орқали x элемент M тўпламга қарашлими ёки қарашли эмасми деган муаммони ҳал қилиш мумкин. Шундай қилиб, M ечишувчи тўплам бўлади;

б) **M ечишувчи тўплам бўлсин.** У ҳолда, 1-таърифга асосан, x бу тўпламнинг элементими ёки элементи эмасми деган муаммони ҳал қилувчи алгоритм мавжуд бўлади. Бу алгоритмдан фойдаланиб, M ва CM тўпламларга кирувчи элементларнинг рўйхатини тузамиз. Шундай қилиб, M ва CM тўпламлар элементларини санаб чиқувчи иккита A ва B алгоритмни ҳосил қиласиз. Демак, M ва CM тўпламлар эффектив саналувчи тўпламлар бўлади.

1-мисол. $M = \{1, 4, 9, \dots, n^2, \dots\}$ натурал сонлар квадратлари тўплами эффектив саналувчи тўплам бўладими ёки йўқми?

Ечим. $M = \{n^2\}$ тўплам эффектив саналувчи тўплам бўлади, чунки унинг элементларини ҳосил қилиш учун кетма-кет натурал сонларни олиб, уларни квадратга кўтариш керак. Бу тўплам ечишувчи ҳам бўлади. Ҳақиқатан ҳам, би-

рорта x натурал соннинг M түпламга кириш ёки кирмаслигини аниқлаш учун уни туб кўпайтиувчиларга ажратиш керак. Бу усул унинг натурал соннинг квадратими ёки йўқми лекан муаммони ҳал қилиб беради.

2-мисол. Тартибланган натурал сонлар жуфтликларидан иборат түплам эфектив саналувчи эканлигини исботланг.

Е ч им. Тартибланган натурал сонлар жуфтликларидан иборат түпламнинг эфектив саналувчи эканлигини исботлаш учун диагонал методи деб аталадиган методдан фойдаланамиз. Бунинг учун ҳамма тартибланган натурал сонлар жуфтликларини куйидаги кўринишда ёзамиш:

$$\begin{array}{ccccccc} (0, 0), & \nearrow (0, 1), & \nearrow (0, 2), & \nearrow (0, 3), & \nearrow (0, 4), & \dots \\ \searrow (1, 0), & (1, 1), & \nearrow (1, 2), & \nearrow (1, 3), & \nearrow (1, 4), & \dots \\ \searrow (2, 0), & \nearrow (2, 1), & (2, 2), & \nearrow (2, 3), & \nearrow (2, 4), & \dots \\ (3, 0), & (3, 1), & (3, 2), & (3, 3), & (3, 4), & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

Юқори чап бурчакдан бошлиб кетма-кет диагоналлар бўйича ўтиб түплам элементларини санаб чиқамиш. Бу жуфтликларнинг рўйхати куйидагича бўлади:

$$(0, 0), (1, 0), (0, 1), (2, 0), (1, 1), (0, 2), (3, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 3), (4, 0), (3, 1), (2, 2), (1, 3), (0, 4), \dots$$

3-теорема. Ечишувчи бўлмаган эфектив саналувчи натурал сонлар түплами мавжуд.

И с б о т. Эфектив саналувчи ихтиёрий U натурал сонлар түплами берилган бўлсин. U түпламнинг ечишувчи эмаслигини исботлаш учун, Пост теоремасига (2-теорема) кўра, унинг CU тўлдирувчиси эфектив саналувчи эмаслигини исботлаш етарли.

M_0, M_1, M_2, \dots – ҳамма саналувчи натурал сонлар түпламларидаги эфектив санаб чиқилган түпламлар бўлсин. Демак, ҳар қандай $n \in N$ учун M_n түпламни тиклаш мумкин.

Энди U тўпламнинг ҳамма элементларини санаб чиқадиган A алгоритмни киритайлик. Бу алгоритм (m, n) рақамили қадамда $m \in M_n$ ни ҳисоблаб чиқади. Агар бу сон n сон билан устма-уст тушса, бу ҳолда A алгоритм уни U тўпламига киритади, яъни $n \in U \leftrightarrow n \in M_n$.

Бундан кўриниб турибдики, ҳар қандай саналувчи тўпламдан CU тўплам ҳеч бўлмаганда битта элемент билан фарқ қиласди, чунки CU шундай n элементлардан иборатки, $n \in M_n$. Шунинг учун ҳам CU саналувчи тўплам эмас. Демак, Пост теоремасига асосан U ечишувчи тўплам бўлмайди.

Изоҳ. Ислот этилган теорема аслида Гёделнинг формал арифметиканинг тўлиқсизлиги ҳақидаги теоремасини ошкормас (ошкора эмас) равишда қамраб олган.

3- §. Алгоритм тушунчасига аниқлик киритиш

- Диофант тенгламаси.** Ферманинг «буюк теорема»си. Ю.Матиясевич ва Г.Чудновский натижалари. Уч асосий йўналиш. Эффектив ҳисобланувчи функция. й.-аниқланувчи функциялар. Умумрекурсив функция. А.Чёрч ва С.Клини натижалари. Чёрч тезиси. К.Гёдел натижалари. Тьюринг тезиси. Тьюринг бўйича ҳисобланувчи функциялар. Тьюринг машиналари. Э.Пост натижалари. Нормал алгоритмлар.

Математика тарихида бир хил турдаги саволлар тўпламига «ҳа» ёки «йўқ» ва бир хил турдаги функциялар синфи «ҳисобланувчи» ёки «ҳисобланувчи эмас» деган жавоблар бериши мумкин бўлган алгоритмларни излаш узоқ давом этди. Айрим вакъларда бу изланишлар натижасиз тугади. Бу ҳолларда, табиийки, алгоритмнинг мавжудлигига шубҳа билан қаралади.

I- мисол. Мисол сифатида Ферманинг «буюк теорема»-сининг ечиш муаммосини кўрсатиш мумкин. 1637 йиллар атрофида Ферма қўйидаги теореманинг исботини ўзида бор деб эълон қилди: « $x^n + y^n = z^n$ тенглама $n > 2$ бўлганда мусбат бутун сон қийматли x, y, z, n ечимга эга эмас». Ҳозирги кунгача бу тасдиқ на исбот қилинган ва на рад этилган.

2- мисол. 1900 йилда Парижда ўтказилган иккинчи халқаро математиклар конгрессида немис математиги Давид Гильберт ечилиши муҳим бўлган 23 математик муаммо рўйхатини ўқиб берди. Шулар орасида қуидаги Гильбертнинг 10- муаммоси бор эди: «Коэффициентлари бутун сонлардан иборат бўлган ҳар қандай алгебраик тенгламанинг бутун сонли ечими мавжудми?», яъни бутун сонли коэффициентлардан иборат бўлган ҳар қандай алгебраик тенглама бутун сонли ечимга эгами деган муаммони ечадиган (ҳал қилидиган) алгоритм яратиш кераклигини Д.Гильберт кўрсатди.

Математикада бутун сонли коэффициентларга эга бўлган алгебраик тенглама *диофант тенгламаси* деб аталади. Масалан,

$$x^2 + y^2 - 2xz = 0, \quad 10x^5 + 7x^2 + 5 = 0$$

кўринишдаги тенгламалар диофант тенгламалари бўлади, улардан биринчиси уч ўзгарувчили ва иккинчиси бир ўзгарувчили тенгламадир. Умумий ҳолда тенглама исталган сондаги ўзгарувчиларга боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай тенгламалар бутун сонли ечимларга эга бўлиши ҳам, эга бўлмаслиги ҳам мумкин. Масалан, $x^2 + y^2 - 2xz = 0$ чексиз кўп бутун сонли ечимларга эга ва $10x^5 + 7x^2 + 5 = 0$ тенглама бутун сонли ечимга эга эмас.

Бир ўзгарувчили диофант тенгламасининг ҳамма бутун сонли ечимларини топиш алгоритми анчадан бери мавжуд. Аниқланганки, агар

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0$$

бутун сонли коэффициентлардан иборат тенгламанинг бутун илдизи бўлса, у ҳолда у a_n коэффициентнинг бўлувчиси бўлади. Бу тасдиқка асосланиб, қуидаги алгоритмни тавсия этиш мумкин:

- 1) a_n соннинг ҳамма бўлувчиларини топиш: d_1, d_2, \dots, d_n ;
- 2) a_n соннинг ҳар бир бўлувчиси учун $P_n(x)$ нинг қийматини аниқлаш: $P_n(d_i)$ ($i = \overline{1, n}$);

3) агар $1, 2, \dots, n$ лардан бирорта i учун $P_n(d_i) = 0$ бўлса, у ҳолда d_i тенгламанинг ечими бўлади. Агар $i = 1, 2, \dots, n$ ларнинг ҳаммасида $P_n(d_i) \neq 0$ бўлса, у ҳолда тенглама бутун сонли ечимга эга эмас.

Гильбертнинг 10-муаммоси билан дунёнинг кўп математиклари деярли 70 йил шуғулландилар. Фақатгина 1968 йилда Санкт-Петербурглик ёш математик Ю.В.Матиясевич ва сал кейинроқ рус математиги Г.В.Чудновский бу муаммони ҳал қилдилар: *қўйилган масаланинг ечимини бера оладиган алгоритм мавжуд эмас.*

Алгоритмнинг интуитив таърифи қатъий эмаслигига қарамасдан, у муайян масаланинг ечимини топадиган алгоритмнинг тўғрилигига шубҳа уйғотмайди.

Математикада шундай ечими топилмаган алгоритмик муаммолар мавжудки, улар ечимга эгами ёки эга эмасми эканлигини аниқлаш муаммоси пайдо бўлади. Бу муаммони ечишда алгоритмнинг интуитив таърифи ёрдам бера олмайди. Бу ҳолларда ёки алгоритмнинг мавжудлигини, ёки унинг мавжуд эмаслигини исботлаш керак бўлади.

Биринчи ҳолда масалани ечадиган жараённи тасвирилаш кифоя. Бу жараённинг ҳақиқатан ҳам алгоритм эканлигига ишонч ҳосил қилиш учун алгоритмнинг интуитив тушунчалиси етарли бўлади.

Иккинчи ҳолда алгоритмнинг мавжуд эмаслигини исботлаш керак. Бунинг учун алгоритмнинг нима эканлигини аниқ билиш талаб қилинади. XX асрнинг 30-йилларигача алгоритмнинг аниқ таърифи мавжуд эмас эди. Шунинг учун ҳам алгоритм тушунчасига аниқ таъриф бериш кейинги давр математикасининг асосий масаласи бўлиб қолди. Бу таърифни ишлаб чиқиш кўп қийинчиликларга дуч келди.

Биринчидан, бундай таъриф алгоритм интуитив таърифининг моҳиятини акс эттириши, *иккинчидан* эса, бундай таъриф формал аниқлик нуқтаи назаридан мукаммал бўлиши керак эди. Бу муаммонинг тадқиқотчилари томонидан алгоритмнинг бир нечта таърифи ишлаб чиқилди. Аммо вақт

Утиши билан бу таърифларнинг ўзаро тенг кучлилиги аниқланди. Ана шу таъриф ҳозирги замон алгоритм тушунчасидир.

Алгоритм тушунчасини аниқлаш бўйича ёндашувларни уч асосий йўналишга бўлиш мумкин.

Биринчи йўналиш – эффектив ҳисобланувчи функция тушунчасини аниқлаш билан боғлиқ. Бу йўналиш бўйича А. Чёрч, К. Гёдел, С. Клини тадқиқот ишларини олиб бордилар.

1935 йилда, 1932–1935 йиллар давомида А. Чёрч ва С. Клини томонидан ўрганилган ва « λ -аниқданувчи функциялар» деб аталган, тўғри аниқланган ҳисобланувчи назарий-сонли функциялар синфининг хоссалари: « λ -аниқланувчи функциялар» синфи бизнинг интуитив тасаввуримиз бўйича ҳисобланувчи деб қараладиган ҳамма функцияларни қамраб олиши мумкин деган фикр туғдирди. Бу кутилмаган натижа эди.

Ж. Эрбраннинг битта фояси асосида 1934 йилда К. Гёдел томонидан аниқланган ва «умумрекурсив функциялар» деб аталган бошқа ҳисобланувчи функциялар синфи ҳам « λ -аниқланувчи функциялар» хоссаларига ўхшаш хоссаларга эга эди.

1936 йилда А. Чёрч ва С. Клини томонларидан бу иккита синф бир хил синф эканлиги исботланди, яъни ҳар қандай λ -аниқланувчи функция умумрекурсив функция бўлиши ва ҳар қандай умумрекурсив функция λ -аниқланувчи функция эканлиги тасдиқланди.

1936 йилда Чёрч қуйидаги тезисни эълон қилди: ҳар қандай интуитив эффектив (самарали) ҳисобланувчи функциялар умумрекурсив функциялардир.

Бу теорема эмас, балки тезисдир: тезис таркибида интуитив аниқланган эффектив ҳисобланувчи функция тушунчаси аниқ математик атамаларда аниқланган умумрекурсив функция тушунчаси билан айнан тенгглаштирилган. Шунинг учун ҳам бу тезисни исботлаш мумкин эмас. Аммо Чёрч ва бошқа олимлар томонидан бу тезисни қувватловчи кўп далиллар кўрсатилди.

Иккинчи йўналиш – алгоритм тушунчасини бевосита аниқлаш билан боғлиқ: 1936–1937 йилларда А. Тьюринг Чёрч ишларидан бехабар ҳолда янги функциялар синфини киритди. Бу функцияларни «Тьюринг бўйича ҳисобланувчи функциялар» деб атадилар. Бу синф ҳам юқорида айтилган хоссаларга эга эди ва буни *Тьюринг тезиси* деб айтамиз. 1937 йилда А. Тьюринг исботладики, унинг ҳисобланувчи функциялари λ-аниқланувчи функцияларнинг ўзи ва, демак, умумрекурсив функцияларнинг худди ўзи экан. Шунинг учун ҳам Чёрч билан Тьюринг тезислари эквивалентdir.

1936 йилда (Тьюринг ишларидан бехабар ҳолда) Э. Пост айнан Тьюринг эришган натижаларга мос келадиган натижаларни эълон қилди ва 1943 йилда, 1920–1922 йиллардаги нашр этилмаган ишларига суюниб, тўртинчи эквивалент тезисни нашр этади. Шундай қилиб, алгоритм тушунчасини бевосита аниқлашга ва сўнгра унинг ёрдамида ҳисобланувчи функция тушунчасини аниқлашга биринчи бўлиб бироридан бехабар ҳолда Э. Пост ва А. Тьюринг эришдилар.

Пост ва Тьюринг алгоритмик процесслар маълум бир тузилишга эга бўлган «машина» бажарадиган процесслар эканлигини кўрсатдилар. Улар ушбу «машина»лар ёрдамида барча ҳисобланувчи функциялар синфи билан барча қисмий рекурсив функциялар синфи бир хил эканлигини кўрсатдилар ва, демак, Чёрч тезисининг яна битта фундаментал тасдиғи юзага келди.

Учинчи йўналиш – рус математиги А. Марков томонидан ишлаб чиқилган нормал алгоритмлар тушунчаси билан боғлиқ.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. $A = \{1, 9, 25, 121, \dots\}$ туб сонлар квадратлари тўплами эффектив саналувчи тўплам бўладими ёки йўқми?
2. Гильбертнинг қуйидаги «Коэффициентлари бутун сонлардан иборат бўлган ҳар қандай алгебраик тентгламанинг бутун сонли ечими мавжудми?» 10- муаммосининг ечиш алгоритми мавжудми ёки йўқми?

3. Ю.В. Матиясевич ва Г.В. Чудновский юқоридаги масалани қандай ҳал қылдилар? Уларнинг илмий натижалари қаерда нашр эттирилган?
4. Чёрч билан Тьюринг тезислари нега эквивалент?
5. А. Чёрч ва С. Клинининг қайси илмий ишларида ҳар қандай λ- аниқланувчи функция умумрекурсив функция бўлиши ва ҳар қандай умумрекурсив функция λ- аниқланувчи функция эканлигининг тасдиғи келтирилган?



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Алгоритм тушунчаси. Ечувчи процедура. Ечилиш муаммоси. Алгоритмнинг интуитив таърифи.
2. Алгоритмнинг характерли хусусиятлари. Алгоритмнинг дискретлиги, детерминацияланувчанлиги, қадамларининг элементарлиги ва натижавийлиги.
3. Ечилувчи ва саналувчи тўпламлар. Пост теоремаси. Ечилувчи тўплам билан эффектив саналувчи тўпламлар орасидаги муносабатлар.
4. Алгоритм тушунчасига аниқлик киритиш. Уч асосий йўналиш.
5. Эффектив ҳисобланувчи функция. λ- аниқланувчи функциялар. Умумрекурсив функция.
6. А. Чёрч ва С. Клинилар натижалари. Чёрч тезиси. К. Гёдел натижалари.
7. Тьюринг тезиси. Тьюринг бўйича ҳисобланувчи функциялар. Тьюринг машиналари.
8. Э.Пост натижалари. Нормал алгоритмлар.

4- §. Ҳисобланувчи функциялар. Қисмий рекурсив ва умумрекурсив функциялар

- Арифметик функция. Ҳисобланувчи функция. Бошлангич функциялар. Функциялар суперпозицияси. Примитив рекурсия схемаси. Минималлаш операцияси (μ - оператор). Примитив рекурсив функция. Қисмий рекурсив (рекурсив) функция. Умумрекурсив функция. А. Чёрч тезиси.**

1- таъриф . Агар бирор функцияning аниқланиши соҳаси ҳам, қийматлар соҳаси ҳам натурал сонлар тўпламишининг қисм тўпламлари бўлса, у ҳолда бундай функция **арифметик** (сон-

ли) функция деб аталади. Натурад сонлар түпламида берилған ҳар қандай мұносабатлар арифметик мұносабат дейилади.

Масалан, натурад сонлар түпламида $f(x, y) = x \cdot y$ (күпайтыма) – икки аргументли арифметик функциядыр, $x + y < z$ – уч аргументли арифметик мұносабат. Арифметик функция ва арифметик мұносабат түшунчалари интуитив түшунчалардир ва ҳеч қандай формал система билан бөғланған әмбидер.

Арифметик (сонли) функцияның қийматини ҳисобловчи алгоритм мавжудларын аниқлаш алгоритмик мұаммалардан биридір.

2-таъриф. Агар $g = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияның қийматини ҳисобловчи алгоритм мавжуд бўлса, у эффектив (самарали) ҳисобланувчи функция деб аталади.

Бу таърифда алгоритм түшунчаси интуитив маънода түшунилғанлиги сабабли, эффектив ҳисобланувчи функция түшунчаси ҳам интуитив түшунча бўлади.

Аммо алгоритм түшунчасидан эффектив ҳисобланувчи функция түшунчасига ўтишнинг ўзига хос ижобий томони бор. Масалан, алгоритм түшунчасига кўйилган ҳамма талаблар (характерли хусусиятлари сифатида) рекурсив (қайтариш) функциялар мажмуаси деб аталаған ҳамма ҳисобланувчи функциялар мажмуаси учун бажарилади.

Гёдел биринчи бўлиб бирор формал системада аниқланған ҳамма сонли функциялар синфины рекурсив функциялар синфи сифатида ифодалади. 1936 йилда Чёрч ҳам бошқа асосларга таяниб рекурсив функциялар синфини тасвирланған эди. Бу ерда ҳисобланувчи функциялар синфи қўйидаги равища тузилади.

3-таъриф. Қўйидаги сонли функциялар бошлангич (оддий, базис) функциялар дейилади:

- 1) ноль функция (бекор қилиш оператори): $0(x) = 0$ ҳар бир x учун;
- 2) бирни қўшиш (силжиш оператори): $\lambda(x) = x + 1$ ҳар бир x учун;

3) проекциялаш функцияси (проекциялаш оператори):
 $I_n^m(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_m$ ҳамма x_1, x_2, \dots, x_n лар учун ($n = 1, 2, \dots$;
 $m = 1, 2, \dots, n$).

Равшанки, учала бошланғич функция ҳамма жойда аниқланган ва интуитив ҳисобланувчи функциялардир.

Из ох. Аргументларининг барча қийматларида аниқланган функцияни ҳамма жойда аниқланган функция деб атайдиз.

Куйидаги учта қоида воситаси билан мавжуд функциялардан янги функциялар ҳосил қилинади.

1. Функциялар суперпозицияси. $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияларни ва $\phi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ функцияни қарайлик.

4-тәъриф. $\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \phi(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$ тенглик билан аниқланадиган $\psi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция ϕ ва f_1, f_2, \dots, f_m функцияларнинг **суперпозицияси** деб аталади.

Агар биз бирор усул билан ϕ ва f_1, f_2, \dots, f_m функцияларнинг қийматини ҳисоблаш имкониятига эга бўлсаک, у ҳолда ψ функцияни қуйидагича ҳисоблаш мумкин: x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларга мос равишда a_1, a_2, \dots, a_n қийматларни берамиз. Ҳамма $f_i(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ларни ҳисоблаб, $b_i = f_i(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ларни топамиз. Кейин $\phi(b_1, b_2, \dots, b_m)$ ни ҳисоблаб, $c = \psi(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ни топамиз.

Аниқки, агар ϕ ва f_1, f_2, \dots, f_m ҳамма жойда аниқланган бўлса, ψ функция ҳам ҳамма жойда аниқланган бўлади. Ҳақиқатан ҳам, агар f_1, f_2, \dots, f_m нинг ҳеч бўлмагандан бирор таси ҳамма жойда аниқланган бўлмаса, у ҳолда ψ функция ҳамма жойда аниқланган бўлмайди. Шу билан бирга, иккинчи томондан, аргументларнинг шундай a_1, a_2, \dots, a_n қийматлари топилиши мумкинки, $b_i = f_i(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ($i = 1, m$) бўлса, $\phi(b_1, b_2, \dots, b_m)$ ни ҳисоблаб бўлмайди. Бу ҳолда ҳам ψ функция ҳамма жойда аниқланмаган бўлади.

Шундай қилиб, агар $\phi, f_1, f_2, \dots, f_m$ функциялар интуитив ҳисобланувчи бўлса, у ҳолда ψ функция ҳам интуитив ҳисобланувчи бўлади.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтамизки, f_1, f_2, \dots, f_m функцияларнинг барчаси ҳам x_1, x_2, \dots, x_n аргументларнинг ҳаммасидан боғлиқ бўлмаслиги мумкин. Бу ҳолларда ψ функцияни ҳосил қилиш учун сохта аргументлардан ва $I_n^m(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциялардан фойдаланамиз. Масалан, $\psi(x, y, z) = \phi(f_1(x), f_2(x, y, z), y, x)$ функция $\phi(x_1, x_2, x_3, x_4)$ ва $F_1(x, y, z) = f_1(x), F_2(x, y, z) = f_2(x, y, z), F_3(x, y, z) = I_3^2(x, y, z), F_4(x, y, z) = I_3^1(x, y, z)$ функцияларнинг суперпозициясидан ҳосил қилинган.

2. Примитив (ўта содда) рекурсия схемаси. $\phi(x_2, x_3, \dots, x_n)$ ва $\psi(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1})$ ($n > 1$) функциялар берилган бўлсин. Куйидаги тенгликларни қаноатлантирувчи янги f функцияни кўрамиз:

$$\begin{aligned} f(0, x_2, x_3, \dots, x_n) &= \phi(x_2, x_3, \dots, x_n), \\ f(y+1, x_2, x_3, \dots, x_n) &= \psi(y, f(y, x_2, x_3, \dots, x_n), x_2, \dots, x_n), \end{aligned} \quad (1)$$

бу ерда ϕ функция $n - 1$ аргументга, ψ функция $n + 1$ аргументга ва f функция n аргументга боғлиқ функция.

5-таъриф. Агар $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция ϕ ва ψ функциялардан (1) муносабат орқали ҳосил қилинса, у ҳолда f функция ϕ ва ψ функциялардан **примитив (ўта содда) рекурсия схемаси** орқали ҳосил қилинган дейилади.

Агар ϕ ва ψ функциялар интуитив ҳисобланувчи функциялар бўлса, у ҳолда f ҳам интуитив ҳисобланувчи функция бўлади. Ҳақиқатан ҳам, x_1, x_2, \dots, x_n аргументларнинг қийматлар мажмуаси a_1, a_2, \dots, a_n бўлсин. У ҳолда кетма-кет куйидагиларни топамиз:

$$\begin{aligned} f(0, a_2, a_3, \dots, a_n) &= \phi(a_2, a_3, \dots, a_n) = b_0, \\ f(1, a_2, a_3, \dots, a_n) &= \psi(0, b_0, a_2, a_3, \dots, a_n) = b_1, \\ f_2(2, a_2, a_3, \dots, a_n) &= \psi(1, b_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = b_2 \text{ ва ҳоказо.} \end{aligned}$$

Равшанки, агар ϕ ва ψ функциялар аргументларнинг барча қийматларида аниқланган бўлса, у ҳолда f функция ҳам аргументларнинг барча қийматларида аниқланган бўлади.

Энди мисолларда примитив рекурсия схемаси орқали янги функцияларни ҳосил этишни кўрайлик.

1- мисол. $\phi(x) = x$ ва $\psi(x, y, z) = y + 1$ бўлсин ҳамда $f(y, x)$ функция қўйидаги тенгликлар орқали аниқлансин:

$$\left. \begin{array}{l} f(0, x) = x, \\ f(y + 1, x) = f(y, x) + 1. \end{array} \right\} \quad (2)$$

$f(y, x)$ функциянинг қийматини аргументларнинг $y = 5, x = 2$ қийматларида ҳисоблаб чиқайлик. $f(0, 2) = \phi(2) = 2$ бўлганилиги учун (2) формулаларнинг иккинчисидан кетма-кет равишда қўйидагиларни ҳосил қиласиз:

$$\left. \begin{array}{l} f(1, 2) = \psi(0, 2, 2) = 2 + 1 = 3, \\ f(2, 2) = \psi(1, 3, 2) = 3 + 1 = 4, \\ f(3, 2) = \psi(2, 4, 2) = 4 + 1 = 5, \\ f(4, 2) = \psi(3, 5, 2) = 5 + 1 = 6, \\ f(5, 2) = \psi(4, 6, 2) = 6 + 1 = 7. \end{array} \right\}$$

$f(y, x) = y + x$ эканлигини осонгина кўрсатиш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, $f(y + z, x) = f(y, x) + z$. Бу тенглика $y = 0$ деб қабул қилиб, $f(z, x) = f(0, x) + z$ ёки $f(z, x) = x + z$ ни ҳосил қиласиз.

2- мисол. $f(y, x)$ функция қўйидаги тенгликлар билан берилган дейлик:

$$\left. \begin{array}{l} f(0, x) = 0, \\ f(y + 1, x) = f(y, x) + x. \end{array} \right\} \quad (3)$$

Бу ерда $\phi(x) = 0$, $\psi(x, y, z) = y + z$ бўлади.

$f(y, x)$ функциянинг қийматини аргументларнинг $y = 2, x = 2$ қийматлари учун ҳисоблаймиз. $f(0, x) = \phi(x) = 0$ бўлганилиги учун $f(0, 2) = \phi(2) = b_0 = 0$ бўлади. Функциянинг $f(1, 2)$ ва $f(2, 2)$ қийматларини кетма-кет топамиз:

$$\left. \begin{array}{l} f(1, 2) = \psi(0, 0, 2) = b_1 = 0 + 2 = 2, \\ f(2, 2) = \psi(1, 2, 2) = 2 + 2 = 4. \end{array} \right\}$$

Бу мисолда $f(y, x) = x \cdot y$ әканлигини күрсатиш мүмкін. Ҳақиқатан ҳам, $f(y + z, x) = f(y, x) + z \cdot x$. Бу тенгликта $y = 0$ деб қабул қилиб, $f(z, x) = f(0, x) + z \cdot x$ ёки $f(z, x) = z \cdot x$ ни ҳосил қиласыз.

3. Минималлаш операцияси (μ - оператор). Ихтиёрий $f(x, y)$ функция берилған бўлсин. Куйидаги масалани кўриб чиқамиз: x аргументнинг ҳар қандай қийматлари учун y аргументнинг ҳеч бўлмаганда шундай битта қийматини топиш керакки, $f(x, y) = 0$ бўлсин. Масалани яна ҳам мураккаброқ ҳолда қўямиз: берилган $f(x, y)$ функция ва унинг муайян қийматли x аргументи учун $f(x, y) = 0$ қила оладиган у аргументларнинг энг кичик қийматларини топиш керак бўлсин. Масаланинг ечими x га боғлиқ бўлганлиги учун $f(x, y) = 0$ қила оладиган у нинг энг кичик қиймати ҳам x нинг функцияси бўлади, яъни

$$\phi(x) = \mu y [f(x, y) = 0] = 0. \quad (4)$$

(4) ифода қуйидагича ўқилади: «Шундай энг кичик y ки, $f(x, y) = 0$ ».

Худди шу тарзда кўп аргументли $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция аниқланади:

$$\phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mu y [f(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0]. \quad (5)$$

6-тাъриф. $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ функциядан $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияга ўтиши μ - операторнинг татбиғи деб аталади.

$\phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни ҳисоблаш учун қуйидаги алгоритмни тавсия этиш мүмкін:

1) $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ ни ҳисоблаймиз. Агар f нинг бу қиймати нолга тенг бўлса, у ҳолда $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ деб қабул қиласыз. Агар $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) \neq 0$ бўлса, у ҳолда навбатдаги қадамга ўтамиш;

2) $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 1)$ ни ҳисоблаймиз. Агар $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 1) = 0$ бўлса, у ҳолда $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$ бўлади. Агар $f(x_1, \dots, x_n, 1) \neq 0$ бўлса, у ҳолда навбатдаги қадамга ўтамиш ва ҳоказо.

Агар у нинг ҳамма қийматлари учун $f(x_1, \dots, x_n, y) \neq 0$ бўлса, у ҳолда $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ни аниқланмаган функция деб атайдиз.

Аммо у аргументнинг шундай y_0 қиймати мавжуд бўлиши мумкинки, $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y_0) = 0$ ва, демак, энг кичик у мавжудки, $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$ бўлади; шу вақтнинг ўзида, бирорта z учун ($0 < z < y_0$) $f(x_1, x_2, \dots, x_n, z)$ қиймат аниқланмаслиги мумкин. Аниқки, бу ҳолда у нинг $f(x_1, \dots, x_n, y) = 0$ бўладиган энг кичик қийматини топиш жараёни, y_0 гача етиб бормайди. Бу ерда ҳам $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ни аниқланмаган функция деб ҳисоблайдилар.

З-мисол. $f(x, y) = x - y$ функция берилган бўлсин. Бу функция минимизация оператори орқали ҳосил қилиниши мумкин:

$$f(x, y) = \mu z(y + z = x) = \mu z[I_3^2(x, y, z) + I_3^3(x, y, z)] = I_3^1(x, y, z).$$

Масалан, $f(x, y)$ функциянинг қийматини аргументларнинг $y = 2$, $x = 7$ қийматларида ($f(7, 2)$) ҳисоблаб чиқамиз. Бунинг учун $y = 2$ деб, x га кетма-кет қийматлар бериб борамиз:

$$\begin{array}{ll} z = 0, & 2 + 0 = 2 \neq 7, \\ z = 1, & 2 + 1 = 3 \neq 7, \\ z = 2, & 2 + 2 = 4 \neq 7, \\ z = 3, & 2 + 3 = 5 \neq 7, \\ z = 4, & 2 + 4 = 6 \neq 7, \\ z = 5, & 2 + 5 = 7 = 7. \end{array}$$

Шундай қилиб, $f(7, 2) = 5$.

7-таъриф. Агар $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни бошланғич (оддий) функциялардан суперпозиция ва примитив рекурсия схемаси амалларини чекли сонда қўллаш натижасида ҳосил қилиш мумкин бўлса, у ҳолда $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ **примитив рекурсив функция** деб аталади.

Бошланғич $0(x) = 0$, $\lambda(x) = x + 1$, $I_n^m(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_m$ ($1 \leq m \leq n$) функциялар ва $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a$ ($a \in N$), $f(x, y) = x + y$, $f(x, y) = x \cdot y$, $f(x, y) = x^y$ ($x^0 = 1$) функциялар примитив рекурсив функциялар бўлади.

8-таъриф. Агар $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни бошланғич функциялардан суперпозиция, примитив рекурсия схемаси ва минималлаш оператори (μ -оператори) амалларини чекли сонда қўллаши натижасида ҳосил қилиш мумкин бўлса, у ҳолда $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ қисмий рекурсив (рекурсив) функция деб аталади.

Бу кейинги таъриф примитив рекурсив функциянинг таърифидан фақат бошланғич функцияларга қўшимча равишда μ -операторини қўллашга руҳсат берилгани билан фарқ қиласди. Шунинг учун ҳам ҳар қандай примитив рекурсив функция ўз навбатида қисмий рекурсив функция бўлади.

9-таъриф. Агар $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция қисмий рекурсив ва аргументларнинг барча қийматларида аниқланган бўлса, у ҳолда $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ умумрекурсив функция деб аталади.

Куйидаги функциялар умумрекурсив функциялар бўлади:

$$\begin{aligned} \lambda(x), 0(x), I_n^m(x), f(y, x) &= y + x, \\ f(y, x) &= x \cdot y, f(y, x) = x + n. \end{aligned}$$

А. Чёрч тезиси. Ҳар қандай интуитив ҳисобланувчи функция қисмий рекурсив функция бўлади.

Бу тезисни исботлаш мумкин эмаслигини юқорида айтган эдик, чунки у интуитив ҳисобланувчи функция ноқатъий математик тушунчасини қатъий аниқланган қисмий рекурсив функция математик тушунчаси билан боғлайди.

Аммо, агар шундай интуитив ҳисобланувчи функция тузиш мумкин бўлсаки, у ўз навбатида қисмий рекурсив функция бўлмаса, у ҳолда бу тезисни рад этиш мумкин. Аммо бундай ҳолнинг мавжудлигини ҳозиргача ҳеч ким кўрсата олмаган.

Теорема. $g(y_1, y_2, \dots, y_k)$ примитив рекурсив (қисмий рекурсив) функция ва x_1, x_2, \dots, x_n ҳар хил ўзгарувчилар бўлсин. Агар ҳар бир i ($1 \leq i \leq k$) учун z_i ўзгарувчи x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларнинг бири бўлса, у ҳолда $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(z_1, z_2, \dots, z_k)$ функция ҳам примитив рекурсив (қисмий рекурсив) функция бўлади.

Исбот. $z_i = x_{j_i}$ ($1 \leq j_i \leq n$) бўлсин. У ҳолда

$$z_i = I_{j_i}^n(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

ва

$$\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \phi(I_{j_1}^n(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, I_{j_k}^n(x_1, x_2, \dots, x_n)).$$

Шундай қилиб, ψ функцияни $\phi, I_{j_1}^n, \dots, I_{j_k}^n$ функциялардан суперпозиция амали орқали ҳосил қилиш мумкин, яъни ψ примитив рекурсив (рекурсив) функция бўлади.

Бу теорема сохта ўзгарувчиларни киритиш, ўзгарувчиларнинг ўрнини алмаштириш ва уларни айнан тенглаштириш жараёни примитив рекурсив ва қисмий рекурсив функцияларни ўз синфларидан чиқармаслигини билдиради.

4- мисол. (*Сохта аргументларни киритиш.*) Агар $\phi(x_1, x_3)$ примитив рекурсив функция ва $\psi(x_1, x_2, x_3) = \phi(x_1, x_3)$ бўлса, у ҳолда $\psi(x_1, x_2, x_3)$ ҳам примитив рекурсив функция бўлади. Исбот қилиш учун $z_1 = x_1$ ва $z_2 = x_3$ деб белгилаб, теоремадан фойдаланиш керак.

5- мисол. (*Ўзгарувчиларнинг ўрнини алмаштириши.*) Агар $\phi(x_1, x_2)$ примитив рекурсив функция ва $\psi(x_1, x_2) = \phi(x_1, x_2)$ бўлса, у ҳолда ψ ҳам примитив рекурсив функция бўлади. Исбот қилиш учун $z_1 = x_2$ ва $z_2 = x_1$ деб белгилаб, теоремадан фойдаланиш керак.

6- мисол. (*Ўзгарувчиларни айнан тенглаштириши.*) Агар $\phi(x_1, x_2, x_3)$ примитив рекурсив функция ва $\psi(x_1, x_2) = \phi(x_1, x_2, x_3)$ бўлса, у ҳолда $\psi(x_1, x_2)$ ҳам примитив рекурсив функция бўлади. Исботлаш учун теоремада $n = 2$, $z_1 = x_1$, $z_2 = x_2$, $z_3 = x_1$ деб қабул қилиш керак.

Натижалар. 1. Ноль функция $0(x)$ – примитив рекурсив функция.

2. Агарда k – бирор бутун мусбат сон бўлса, ўзгармас $C_k^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = k$ функция примитив рекурсив функциядир.

3. Суперпозиция амалини ҳар бир f_i функция x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларнинг фақат айримларидангина боғлиқ бўлганда ҳам ишлатиш мумкин. Ҳудди шундай примитив рекурсия схемасида ҳам ϕ функция x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчиларнинг айримларига боғлиқ бўлмаслиги мумкин ва ψ функция $f(y, x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциягга ҳамда, шунингдек, x_1, x_2, \dots, x_n , у ўзгарувчиларнинг айримларига боғлиқ бўлмаслиги мумкин.

Шундай қилиб, ҳар бир примитив рекурсив функция қисмий рекурсив (рекурсив) функция бўлганлиги учун қисмий рекурсив функциялар синфи примитив рекурсив функциялар синфидан кенгdir.

Қисмий рекурсив функция тушунчаси алгоритмлар назариясининг асосий тушунчаларидан биридир. Шуни ҳам таъкидлаб ўтамизки, ҳар қандай қисмий рекурсив функциянинг қиймати механик характеристерга эга бўлган маълум бир процедура ёрдамида ҳисобланади ва бу процедура бизнинг алгоритм ҳақидаги интуитив тасаввуримизга тўғри келади.

Иккинчидан, ҳозиргача қандай муайян алгоритмлар яратилган бўлмасин, улар ёрдамида қийматлари ҳисобланувчи сонли (арифметик) функциялар албатта қисмий рекурсив функциялар бўлиб чиқди.

Шунинг учун ҳам ҳозиргича пайтда қисмий рекурсив функция тушунчаси алгоритм тушунчасининг илмий эквиваленти сифатида қабул қилинган. Буни биринчи бўлиб, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, илмий тезис сифатида А. Чёрч ва С. Клини ўртага ташладилар.

Ҳудди шу каби ҳар қандай алгоритмни мос Тьюринг машинаси ёрдамида реализация қилиш мумкин. Алгоритмнинг илмий эквиваленти қисмий рекурсив функция бўлганлиги учун ҳамма қисмий рекурсив функциялар синфи

A билан Тьюринг машиналари ёрдамида ҳисобланувчи функциялар (Тьюринг бўйича ҳисобланувчи функциялар) синфи *B* билан бир хилдир, яъни $A = B$.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Куйидаги функцияларнинг примитив рекурсив ва умум-рекурсив функциялар эканлигини исботланг:

$$1) x + y; \quad 2) x^y; \quad 3) x \cdot y;$$

$$4) \sigma(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{агар } x > 0 \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x = 1 \text{ бўлса;} \end{cases}$$

$$5) x - y = \begin{cases} x - y, & \text{агар } x \geq y \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x < y \text{ бўлса;} \end{cases}$$

$$6) |x - y| = \begin{cases} x - y, & \text{агар } x \geq y \text{ бўлса,} \\ y - x, & \text{агар } x < y \text{ бўлса;} \end{cases}$$

$$7) \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x = 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } x \neq 0 \text{ бўлса;} \end{cases}$$

$$8) \overline{\operatorname{sgn}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } x = 0 \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x \neq 0 \text{ бўлса;} \end{cases}$$

$$9) x!;$$

$$10) \min(x, y) = x \text{ ва } y \text{ сонларнинг энг кичиги;}$$

$$11) \min(x_1, x_2, \dots, x_n);$$

$$12) \max(x, y) = x \text{ ва } y \text{ сонларнинг энг каттаси;}$$

$$13) \max(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Изоҳ. Агар исбот қилишда қийналсангиз, у ҳолда Э. Мендельсоннинг «Введение в математическую логику» китобидан фойдаланинг, 137–138- бетлар.

2. $0(x)$ ва $I_n^m(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциялардан суперпозиция ва примитив рекурсия схемаси амаллари орқали $x + 1$ ва $2x$ функцияларни ҳосил қилиш мумкин эмаслигини исботланг:



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Арифметик функция. Ҳисобланувчи функция. Бошланғич функциялар.
2. Функциялар суперпозицияси. Примитив рекурсия схемаси. Минималлаш операцияси (μ -оператори).
3. Примитив рекурсив функция. Қисмий рекурсив (рекурсив) функция.
4. Умумрекурсив функция. А. Чёрч тезиси.

5- §. Тьюринг машиналари

- Оммавий муаммо. Ечиш алгоритми. Тьюринг машинаси. Таşқи алфавит. Ички алфавит. Лента (машинанинг ташқи хотираси). Бошқарувчи каллак. Бошланғич ахборот. Машина дастури. Тьюринг функционал схемаси.*

Агар бирор оммавий муаммони ечиш алгоритми маълум бўлса, у ҳолда уни реализация этиш учун шу алгоритмда аниқ ёритилган кўрсатмаларни ижро этиш зарур. Алгоритмни реализация этиш жараёнини автоматлаштириш гояси, табиийки, инсон бажарадиган ишни машинага узатишни тақозо қиласди. Бундай машинани XX асрнинг 30-йилларида америка математиги Э.Пост ва англия математиги А.Тьюринг тавсия этдилар.

Тьюринг машинаси тушунчаси бизга интуитив маълум бўлган ҳисоблаш процедурасини элементар операцияларга ажратиш натижасида ҳосил бўлади. Тьюринг таъкидлайдики, исталган мумкин бўлган ҳисоблашни ўтказиш учун унинг элементар операцияларини такрорлаш етарли.

Тьюринг айрим турдаги назарий ҳисоблаш машинасини изоҳлаб берди. Бу машина муайян механик қурилма эмас, балки «хаёлий» математик машинадир. Берилган кўрсатмана бажаравчи ҳисобловчи одамдан ёки мавжуд рақамли ҳисоблаш машинасидан Тьюринг машинаси икки жиҳати билан фарқ қиласди.

Бириңчидан, «Тьюринг машинаси» хато қила олмайды, яғни у оғишмай (четта чиқмасдан) күрсатилған қоидани бажаради.

Иккіңчидан, «Тьюринг машинаси» потенциал чексиз хотира билан таъминланған.

Энди Тьюринг машинаси түшунчаси билан батафсил танишамыз. Тьюринг машинасини қуидагилар түлиқ аниклады:

1. Таңқи алфавит, яғни $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n\}$ чекли символлар түплами. A түплам элементларининг чекли кетма-кетлиги A түпламдаги сүз дейилади. Сүзни ташкил этувчи символлар сони шу сүзнинг узунлиги дейилади.


Масалан, A алфавиттінг ҳар бир элементи узунлиги 1 га тент бўлган сўздир. Бу алфавитда сўз кўринишида машинага бериладиган ахборот (информация) кодлаштирилалади. Машина сўз кўринишида берилган информацияни қайта ишлаб, янги сўз ҳосил қиласади.

2. Ички алфавит, яғни $q_0, q_1, q_2, \dots, q_m, P, L, H$ символлар. $q_0, q_1, q_2, \dots, q_m$ — машинанинг чекли сон ҳолатларини ифодалайды. Исталган машинанинг ҳолатлари сони таинланган бўлади. Икки ҳолатда махсус вазифа бажарилади: q_1 — машинанинг бошланғич (дастлабки) ҳолати, q_0 — натижавий (охирги) ҳолати (тўхташ ҳолати), P, L, H — сурилиш символларидир (ўнгга, чапга ва жойида).

3. Икки томонга чексиз давом эттириш мумкин бўлган лента (машинанинг таңқи хотираси). У катакчаларга (ячейкаларга) бўлинган бўлади. Ҳар бир катакчага фақат битта ҳарф ёзилиши мумкин. Бўш катакчани a_0 символи билан белгилаймиз (VI.1- шаклга қаранг).

a_0	a_2	a_3	a_3	a_7	a_9	a_{11}	a_{12}			
-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------	--	--	--


4. Бошқарувчи каллак (головка). У лента бўйлаб ҳаракат қилади ва бирор катақча (ячейка) қархисида тўхташи мумкин (VI.2- шакл).



VI.2- шакл.

Бу ҳолатда «каллак катақчани», яъни символни «кўриб турибди» деб айтамиз. Машинанинг бир такт давомидаги ишида каллак фақат битта катақчага сурилиши (ўнгга, чапга) ёки жойида туриши мумкин.

Лентада сақлангаётган ҳар бир информация ташки алфавитнинг a_0 дан фарқли чекли символлар мажмуаси билан тасвирланади. Машина иш бошлишидан олдин лентага *бошлангич ахборот* (бошлангич маълумот) берилади. Бу ҳолда бошқарувчи каллак, қоидага асосан, q_1 бошлангич ҳолатни кўрсатувчи охирги чап белги қархисида туради (VI.3- шакл).



VI.3- шакл.

Машинанинг иши тактлар йифиндисидан иборат бўлиб, иш давомида бошлангич информация оралиқ информацияга айланади.

Бошлангич информация сифатида лентага ташки алфавитнинг катақчаларга ихтиёрий равишда қўйилган чекли символлар системасини (алфавитдаги ихтиёрий сўзни) бериш мумкин. Берилган бошлангич информацияга боғлиқ бўлган икки хил бўлиши мумкин:

1. Машина чекли сон тектеден кейин тұхтайди (q_0 тұхташ ҳолатига ўтади). Бу ҳолда лентада B информация тасвирланған бўлади. Бу ҳолда машина A бошланғич информацияга нисбатан татбиқ этиладиган (қўлланиб бўладиган) ва уни қайта ишлаб B натижавий информацияга келтирган деб айтилади.

2. Машина ҳеч вақт тұхтамайды, яъни q_0 тұхташ ҳолатига ўтмайды. Бу ҳолда машина A бошланғич информацияга нисбатан татбиқ этилмайды деб айтилади.

Машина ишининг ҳар бир тактида күйидаги функционал схема бўйича ҳаракат қиласи:

$$a_i q_j \rightarrow a_v \prod_{H}^n q_s .$$

Бу ерда a_i, a_v — ташқи алфавитнинг ҳарфлари; q_j, q_s — машинанинг ҳолатлари; \prod, L, H — сурилиш символлари.

Бошқарувчи каллак лентада қандай ҳарфни кўриб турганлиги (бизнинг ёзувда a_i) ва машина қайси ҳолатда (бизнинг ёзувда q_j) турганлигига қараб, бу тектеда уч элементдан иборат команда (буйруқ) ишлаб чиқилади:

1) кўриб турилган ҳарф алмаштирилган ташқи алфавит ҳарфи (a_v);

2) келгуси текте учун ташқи хотира адреси $\left(\prod_{H}^n \right)$;

3) машинанинг келгуси ҳолати (q_s).

Ҳамма командалар мажмуаси *Тьюринг машинасининг дастурини ташкил қиласи*. Дастур икки ўлчовли жадвал шаклида бўлиб, уни *Тьюринг функционал схемаси* деб аталади. Бундай схема қўйидаги жадвалда мисол сифатида берилган.

	a_0	a_1	a_2
q_1	$a_2 L q_3$	$a_1 n q_2$	$a_2 L q_1$
q_2	$a_0 H q_2$	$a_2 H q_1$	$a_1 H q_2$
q_3	$a_0 n q_0$	$a_1 n q_4$	$a_2 n q_1$
q_4	$a_1 H q_3$	$a_0 n q_4$	$a_2 n q_4$

Аниқки, Тьюринг машинасининг иши бутунлайига унинг дастури билан аниқланади. Агар иккита Тьюринг машинасининг функционал схемалари бир хил бўлса, у ҳолда улар бир-бираидан фарқ қилмайди. Ҳар хил Тьюринг машиналари ҳар хил дастурларга эга бўлади.

Бундан кейин Тьюринг машинасининг ҳар хил конфигурацияларини (тархий кўринишларини) соддороқ ифодалаш учун лента ва унинг катакчаларини ифодаламасдан ахборотни фақат сўз шаклида ёзамиз. Бошқарувчи каллак ва машина ҳолатини ифодалаш сифатида машина ҳолатини ёзамиз.

Юқоридаги жадвалда берилган функционал схемага мос келувчи Тьюринг машинасининг ишини кўриб ўтайлик.

1- мисол . Дастробки конфигурация қўйидагича берилган бўлсин:

$$\begin{array}{cccc} a_0 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_1 & & \end{array}$$

Бошқарувчи каллак a_2 , ҳарфини кўриб турганлиги ва машина q_1 , ҳолатда бўлғанлиги учун машина $a_2 \cdot a_2$ командани ишлаб чиқади ва натижада иккинчи конфигурацияни ҳосил қиласиз:

$$\begin{array}{cccc} a_0 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_1 & & \end{array}$$

Равшанки, навбатдаги конфигурациялар қўйидаги кўришишларда бўлади:

$$\begin{array}{cccc} a_0 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_1 & & \end{array} - \text{учинчи конфигурация},$$

$$\begin{array}{ccccc} a_0 & a_2 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_3 & & & \end{array} - \text{тўртинчи конфигурация},$$

$$\begin{array}{ccccc} a_0 & a_2 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_0 & & & \end{array} - \text{бешинчи конфигурация}.$$

Бешинчи конфигурацияда машина q_0 ҳолатда (түхташ ҳолатида) турғанлиги учун $a_1a_2a_2$ сүз ҳисоблашнинг натижаси бўлади.

2- мисол. Бошлангич конфигурация қўйидагича бўлсин:

$$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_1 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_1 & & & & \end{array}$$

Юқоридаги функционал схемадан фойдаланиб, қўйилдаги конфигурацияларга келамиз:

$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_1 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_1 & & & & \end{array}$ – иккинчи конфигурация,

$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_1 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_1 & & & & \end{array}$ – учинчи конфигурация,

$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_1 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_2 & & & & \end{array}$ – тўртинчи конфигурация,

$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_1 & a_1 & a_2 & a_0 \\ & q_2 & & & & \end{array}$ – бешинчи конфигурация,

$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_1 & a_2 & a_2 & a_0 \\ & q_1 & & & & \end{array}$ – олтинчи конфигурация.

Иккинчи ва олтинчи конфигурациялардан кўриниб турибдики, машинанинг иш жараёни такрорланди ва, демак, натижа бўлмайди.

6- §. Тьюринг машинасида алгоритмни реализация қилиш

- Алгоритмларни реализация этиш. Ўнлик системада n дан $n + 1$ га ўтиш алгоритмини реализация қилиш. Натурал сонларни қўшиш алгоритмини реализация қилиш. Евклид алгоритмини реализация қилиш.

Айрим оддий арифметик алгоритмларни реализация қиласынан (амалға оширадын) Тьюринг машинасинаң қандай ясашни бир қатор мисолларда күрсатамиз.

1-мисол. Тьюринг машинасида ўнлик системада n дан $n + 1$ га ўтиш алгоритмини реализация қилиш.

Е ч и м . Ўнлик системада n соннинг ёзуви берилған бўлсин ва $n + 1$ соннинг ўнлик системадаги ёзувини кўрсатиш талаб этилсан, яъни $f(n) = n + 1$ функцияни ҳисоблаш талаб этилсан.

Равшанки, машинанинг ташқи алфавити 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рақамларидан ва бўш катақча a_0 дан иборат бўлиши керак. Лентага ўнлик системада n сонни ёзамиз. Бу ерда қаторасига бўш жойсиз ҳар бир катақчага битта рақам ёзилади.

Кўйилган масалани ечиш учун ишнинг биринчи тактида машина n соннинг охирги рақамини ўчириб, уни бир бирлик катта сонга алмаштириб ва агар охирги рақам 9 сонидан кичик бўлса, у ҳолда тўхташ ҳолатига ўтиши керак.

Агар n соннинг охирги рақами 9 бўлса, у ҳолда машина 9 рақамини ўчириб, бўш қолган катақчага 0 рақамини ёзиб, ўша ҳолатда қолган ҳолда чапга юқорироқ разрядли кўшнисига сурилиши керак. Бу ерда ишнинг иккинчи тактида машина юқорироқ разрядли рақамга 1 сонини қўшиши керак.

Табиийки, чапга сурилиш пайтида юқорироқ разрядли рақам бўлмаса, у ҳолда машинанинг бошқарувчи каллаги бўш катақчага чиқиши мумкин. Бу ҳолатда бўш катақчага машина 1 рақамини ёзади.

Айтилганлардан шу нарса келиб чиқадики, $f(n) = n + 1$ функцияни ҳисоблаш алгоритмини реализация этиш пайтида машина бор йўғи q_1 ва q_0 ҳолатларда бўлади.

Шундай қилиб, ўнлик системада n дан $n + 1$ га ўтиш алгоритмини реализация этадиган Тьюринг машинаси қуйидаги кўринишда бўлади:

	a_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q_1	$1hq_0$	$1hq_0$	$2hq_0$	$3hq_0$	$4hq_0$	$5hq_0$	$6hq_0$	$7hq_0$	$8hq_0$	$9hq_0$	$0hq_1$

Күйида $n = 183$ ва $n = 399$ сонлари учун мос равища уларнинг конфигурациялари келтирилган:

$$\begin{array}{ll} a_0 \underset{q_1}{183} a_0 & a_0 \underset{q_1}{399} a_0 \\ a_0 \underset{q_0}{184} a_0 & a_0 \underset{q_1}{390} a_0 \\ & a_0 \underset{q_1}{300} a_0 \\ & a_0 \underset{q_1}{400} a_0 . \end{array}$$

2- мисол: Натурал сонларни қўшиш алгоритми.

Машина лентасига таёқчалар мажмууси шаклида иккита сон берилган бўлсин. Масалан, 2 ва 3 сонлари. Бу сонларни қўшиш талаб этилсан. Қўшиш символини (белгисини) юлдузча билан белгилаймиз. Шундай қилиб, машина лентасига қўидаги сўз ёзилади:

$$a_0 || * ||| a_0 \quad (1)$$

(1) сўзга татбиқ этиш натижасида 2 ва 3 сонларининг йиғиндисини, яъни

$$a_0 ||||| a_0 \quad (2)$$

сўзини берадиган функционал схемани топиш талаб этилади.

Кўйилган масалани ечиш жараёнини изоҳлаб берайлик. Дастрекани моментда машинанинг каллаги энг чапдаги таёқчани кўриб турсин. Уни то биринчи бўш катакчага эришгунча ҳамма таёқча ва юлдузчаларни чеклаб ўнгта суриш керак. Бу бўш катакчага биринчи таёқча ёзилади. Ундан сўнг иккинчи таёқчага қайтиб келиш керак ва уни ўчириб тўхташ керак. Машина ишининг ҳамма тактини қўидаги мос конфигурацияларда ифодалаб берамиз:

- | | | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 1) $a_0 \{ * a_0$ | q_1 | 2) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 | 3) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 |
| 4) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 | 5) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 | 6) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 |
| 7) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 | 8) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 9) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 |
| 10) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 11) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 12) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 |
| 13) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 14) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 15) $a_0 \{ * a_0$ | q_1 |
| 16) $a_0 a_0 \{ * a_0$ | q_2 | 17) $a_0 \{ a_0$ | q_2 | 18) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 |
| 19) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 | 20) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 | 21) $a_0 \{ * a_0$ | q_2 |
| 22) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 23) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 24) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 |
| 25) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 26) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 27) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 |
| 28) $a_0 \{ * a_0$ | q_3 | 29) $a_0 \{ * a_0$ | q_1 | 30) $a_0 a_0 \{ * a_0$ | q_0 |

Бу жараён масаланинг ечиш алгоритмини күйидаги икки ўлчовли жадвал шаклида ёзишга имконият яратади:

	a_0	*	
q_1		$a_0 \# q_0$	$a_0 \# q_2$
q_2	$\# q_3$	$* \# q_2$	$\# q_2$
q_3	$a_0 \# q_1$	$* \# q_3$	$1 \# q_3$

Шундай қилиб, бу ерда $\langle a_0, *, | \rangle$ ташқи алфавит ва a_0 , q_1 , q_2 , q_3 машина ҳолатларидан фойдаланилди.

З-мисол. Евклид алгоритми.

Евклид алгоритми берилган иккита натурал сон учун уларнинг энг катта умумий бўлувчисини топиш қўринишидаги масалаларни ечади.

Маълумки, Евклид алгоритми қўйидаги камаювчи сонлар кетма-кетлигини тузишга келтирилади: биринчиси берилган икки соннинг энг каттаси бўлади, иккинчиси – кичиги, учинчиси – биринчи сонни иккинчисига бўлишдан ҳосил бўлган қолдиқ, тўртинчиси – иккинчи сонни учинчисига бўлишдан ҳосил бўлган қолдиқ ва ҳоказо, то қолликсиз бўлингунча давом эттирилади. Охири бўлишдаги бўлувчи масала ечимининг натижаси бўлади.

Биздан Евклид алгоритмини Тьюринг машинасининг дастури сифатида ифодалаш талаб этилади. Бу дастур сонларни таққослаш ва айриш циклларининг навбатма-навбат (навбатлашиб) келишини таъминлаши керак.

Тўртта ҳарфдан иборат $\langle a_0, |, \alpha, \beta \rangle$ ташқи алфавитдан фойдаланамиз. Бу ерда a_0 – бўш катақча символи, $|$ – таёқча, α ва β – таёқча ролини вақтинчалик ўйнайдиган ҳарфлар.

Масаланинг ечилишини бошлангич конфигурацияси

$$\begin{array}{c} a_0 | | | | | | | | a_0 \\ q_1 \end{array}$$

бўлган ҳол учун 4 ва 6 сонларининг энг катта умумий бўлувчисини топиш мисолида кўриб ўтайлик.

Биринчи навбатда машина лентада ёзилган сонларни таққослаши керак. Шу мақсад учун машина биринчи сонни ифодаловчи таёқчаларни α ҳарфи билан ва иккинчи сонни ифодаловчи сонларни β ҳарфи билан алмаштириши керак. Машина ишининг биринчи тўрт тактика мос келувчи унинг конфигурацияси қўйидагича бўлади:

1) $a_0 ||| ||| ||| a_0$ q_1 2) $a_0 ||| \alpha ||| ||| a_0$ q_2 3) $a_0 ||| \alpha ||| ||| a_0$ q_2 4) $a_0 ||| \alpha \beta ||| ||| a_0$ q_1

Шу билан дастлабки сонларни таққослаш цикли тамом бўлиб, айриш цикли бошланади. Бу цикл давомида кичик сон лентадан бутунлайига ўчирилади, β ҳарфи билан белгиланган иккинчи сон таёқчалар билан алмашинади ва, демак, катта 6 сони иккита 4 ва 2 сонларига бўлинади.

Бу операцияларга бир қатор конфигурациялар тўғри келади. Шулардан айримларини ёзамиз:

 $a_0 \alpha \alpha \alpha \alpha \beta \beta \beta \beta || a_0$ q_1 $a_0 \alpha \alpha \alpha \alpha \beta \beta \beta \beta || a_0$ q_3 $a_0 a_0 \alpha \alpha \alpha \beta \beta \beta \beta || a_0$ q_3 $a_0 a_0 a_0 a_0 a_0 \beta \beta \beta \beta || a_0$ q_3 $a_0 a_0 a_0 a_0 a_0 | \beta \beta \beta || a_0$ q_3 $a_0 a_0 a_0 a_0 ||| ||| a_0$ q_3 $a_0 a_0 a_0 a_0 ||| ||| a_0$ q_2

Шу билан биринчи айриш цикли тамом бўлади.

Энди машина 4 ва 2 сонларини таққослаши керак. Бу сонларни таққослаш цикли қўйидаги

$$a_0 || \alpha \alpha \beta \beta a_0 \\ q_4$$

конфигурацияга ва айриш цикли

$$a_0 ||| | a_0$$

конфигурацияга олиб келади. Учинчи таққослаш цикли 2 ва 3 сонларини

$$a_0 \alpha \alpha \beta \beta a_0 \\ q_3$$

конфигурацияга ва айриш цикли

$$a_0 || a_0 \\ q_0$$

охирги конфигурацияга олиб келади. Шундай қилиб, Тьюринг функционал схемаси ушбу кўринишида бўлади:

	a_0		α	β
q_1	$a_0 n q_3$	$\alpha n q_2$	$\alpha l q_1$	$\beta l q_1$
q_2	$a_0^A q_4$	$\beta n q_1$	$\alpha n q_2$	$\beta n q_2$
q_3	$a_0 n q_0$	$ n q_2$	$a_0 n q_3$	$ n q_3$
q_4	$a_0 n q_0$	$ n q_1$	$ l q_4$	$a_0 l q_4$

7- §. Алгоритмлар назариясининг асосий гипотезаси

- Универсал усул. Тьюринг тезиси. Тьюринг, Чёрч, Гёдел, Клини ва Марков олган натижаларнинг эквивалентлиги.

Тьюринг машинаси алгоритм тушунчасини аниқлашнинг битта йўлини кўрсатади. Шу туфайли бир нечта саволлар пайдо бўлади: Тьюринг машинаси тушунчаси қан-

чалик умумий бўлади? Алгоритмларни Тьюринг машинаси воситаси билан бериш усулини универсал усул деб бўладими? Ҳамма алгоритмларни шу усул билан бериш мумкинми?

Ушбу саволларга ҳозирги вақтда мавжуд бўлган алгоритмлар назарияси қуйидаги гипотеза билан жавоб беради: *ҳар қандай алгоритмни Тьюринг функционал схемаси орқали бериш ва мос Тьюринг машинасида реализация этиши мумкин.*

Бу гипотеза **Тьюринг тезиси** деб аталади. Уни исботлаш мумкин эмас, чунки бу тезис қатъий таърифланмаган алгоритм тушунчасини қатъий аниқланган Тьюринг машинасининг тушунчаси билан боғлайди.

Бу тезисни рад этиш учун Тьюринг машинасида реализацияланмайдиган (амалга оширилмайдиган) алгоритм мавжудлигини кўрсатиш керак. Аммо ҳозиргача аниқланган ҳамма алгоритмларни Тьюринг функционал схемаси орқали реализация этиши мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтамизки, Марковнинг нормал алгоритм тушунчаси ҳамда Чёрч, Гёдел ва Клини томонидан киритилган рекурсив алгоритм (рекурсив функциялар) тушунчалари Тьюринг томонидан киритилган алгоритм тушунчаси (Тьюринг функционал схемаси) билан эквивалентлиги исботланган.

Бу далил ўз навбатида Тьюринг гипотезасининг тўғрилигини яна бир марта кўрсатиб ўтади.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. $\phi(n) = n + 2$, $\phi(n) = n + 4$, $\phi(n) = 0$ функцияларни ҳисобловчи алгоритмларни Тьюринг машинасининг дастурлари сифатида ифодаланг.

2. $\text{sgn } x = \begin{cases} 0, & \text{агар } x = 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } x \neq 0 \text{ бўлса,} \end{cases}$

функцияни ҳисобловчи Тьюринг машинасини тузинг.

$$3. \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & \text{агар } x = 0 \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x \neq 0 \text{ бўлса,} \end{cases}$$

функцияни ҳисобловчи Тьюринг функционал схемасини тузинг.

4. $\phi(n) = 2n$ функцияни ҳисобловчи Тьюринг машинасини тузинг.

$$5. f_p(n) = \begin{cases} 1, & \text{агар } n \text{ сон } p \text{ сонга бўлинса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда} \end{cases}$$

функцияни ҳисобловчи Тьюринг машинасининг дастурларини $\{a_0, 1\}$ алфавитда ёзинг.

6. Функционал схемалари қўйидаги 1, 2- жадвалларда берилган Тьюринг машинаси қандай функцияларни ҳисблайди?

1-жадвал

	a_0	
q_1	$a_0 n q_{p+1}$	л q_2
q_2	$a_0 n q_{p+3}$	л q_3
...
q_{p-1}	$a_0 n q_{p+3}$	л q_p
q_p	$a_0 n q_{p+1}$	л q_1
q_{p+1}	н q_0	$a_0 n q_{p+2}$
q_{p+2}	$a_0 n q_{p+1}$	
q_{p+3}	$a_0 n q_0$	$a_0 n q_{p+4}$
q_{p+4}	$a_0 n q_{p+3}$	

2-жадвал

	a_0	
q_1	n q_4	л q_2
q_2	$a_0 n q_6$	л q_3
q_3	$a_0 n q_6$	л q_1
q_4	н q_0	$a_0 n q_5$
q_5	$a_0 n q_4$	
q_6	$a_0 n q_0$	н q_7
q_7	$a_0 n q_6$	$a_0 n q_6$

7. Дастури қўйидаги функционал схема (3- жадвал) орқали берилган Тьюринг машинаси қандай кўринишдаги функцияни ҳисблайди?

3-жадвал

	a_0		α	β
q_1	$a_0 \sqcup q_2$	$ n q_1$	$\alpha n q_1$	$\beta n q_1$
q_2		$\beta \sqcup q_3$	$\alpha \sqcup q_2$	$\beta \sqcup q_2$
q_3	$a_0 n q_4$	$ n q_1$		
q_4	$a_0 n q_0$		$ n q_4$	$ n q_4$

Изоҳ. Мисолларни ечишда Л.М. Лихтарников ва Т.Г. Сукачеваларнинг «Математическая логика» (Санкт-Петербург, 1999 й.) китобидан фойдаланишни тавсия этамиз, 248–250- б., 275–281- б.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Оммавий муаммо. Ечиш алгоритми. Тьюринг машиналари.
2. Ташиқи ва ички алфавит. Машинанинг ташки хотираси. Бошқарувчи каллак. Бошланғич ахборот. Машина дастури. Тьюринг функционал схемаси.
3. Тьюринг машинасида алгоритмни реализация қилиш.
4. Натурал сонларни күшиш алгоритмини реализация этиш. Евклид алгоритмини реализация этиш.
5. Алгоритмлар назариясининг асосий гипотезаси.
6. Тьюринг, Чёрч, Гёдел, Клини ва Марков олган натижаларининг эквивалентлиги ҳақида.

8- §. Марковнинг нормал алгоритмлари

- Алфавит. Символлар. Ҳарфлар. Сўз. Бўш сўз. Алгоритм. Алгоритм таърифи. Алфавит устидаги алгоритм. Алфавитдаги алгоритм. Татбиқ этиладиган алгоритм. Татбиқ этилмайдиган алгоритм. Ўрнига қўйиш усули. Алгоритм схемаси. Нормал алгоритм ёки Марков алгоритми. Мисоллар.

1-таъриф. Бўш бўлмаган чекли символлар тўплами алфавитдаги символлар ҳарфлар деб аталади.

2-таъриф. *A алфавитдаги ҳарфларнинг ҳар қандай чекли кетма-кетлиги шу тўпламдаги сўз деб аталади. Ҳарфларнинг бўши кетма-кетлиги бўш сўз деб аталади ва уни \wedge символи билан белгиланади.*

Агар $S_{j_1} S_{j_2} \dots S_{j_k}$ сўзни P билан ва $S_{r_1} S_{r_2} \dots S_{r_m}$ сўзни Q билан белгиласак, у ҳолда $S_{j_1} S_{j_2} \dots S_{j_k} S_{r_1} S_{r_2} \dots S_{r_m}$ сўз P ва Q сўзларнинг бирлашмаси PQ ни билдиради. Ҳусусий ҳолда, $P \wedge = \wedge P = P$ ва $(P_1 P_2) P_3 = P_1 (P_2 P_3)$.

Агар $B \subset A$ бўлса, у ҳолда A алфавит B алфавитнинг кенгайиши (*кенгайтирилган*) деб айтилади. Равшанки, бу ҳолда B нинг ҳар бир сўзи ўз навбатида A алфавитининг ҳам сўзи бўлади.

A алфавитдаги ҳамма сўзларнинг тўплами D, C эса D тўпламнинг бирор қисм тўплами бўлсин, яъни $C \subset D$.

3-таъриф. *Аниқланиш соҳаси C ва қийматлар соҳаси D бўлган эфектив ҳисобланувчи функция A алфавитдаги алгоритм (алгорифм) деб аталади.*

4-таъриф. *Агар A алфавитдаги бирор P сўз U алгоритмнинг аниқланиш соҳасига тегишили бўлса, у ҳолда U алгоритм P сўзга татбиқ этиладиган деб аталади.*

5-таъриф. *Агар A \subset B бўлса, у ҳолда B алфавитдаги ҳар бир алгоритм A алфавит устидаги алгоритм деб аталади.*

А алфавитдаги нормал алгоритм тушунчаси билан A алфавит устидаги нормал алгоритм тушунчаси ўртасидаги фарқ жуда ҳам муҳимдир. A алфавитдаги ҳар қандай нормал алгоритм фақат A нинг ҳарфларидан фойдаланади. A алфавит устидаги нормал алгоритм эса A га кирмаган бошқа қўшимча ҳарфлардан ҳам фойдаланиши мумкин. Шундай қилиб, A даги ҳар қандай нормал алгоритм A устидаги нормал алгоритм ҳам бўлади. Аммо A да шундай алгоритмлар мавжудки, улар A устида нормал алгоритм эканлигига қарамасдан, A да нормал алгоритм бўла олмайди.

Кўп аниқланган алгоритмларни бирмунча оддийроқ қадамларга бўлиш мумкин. Шу мақсадда рус математиги А.А. Марков 1950 йилларда алгоритм тузишнинг асоси (негизи) қилиб, элементар операция сифатида бир сўзни иккинчи сўз ўрнига қўйиши олган.

Агар P ва Q лар A алфавитдаги сўзлар бўлса, у ҳолда $P \rightarrow Q$ ва $P \rightarrow \cdot Q$ ларни A алфавитдаги ўрнига қўйиш формулалари деб атаемиз. Бу ерда \rightarrow ва \cdot символлари A алфавитнинг ҳарфлари эмас ҳамда P ва Q ларнинг ҳар бири сўз бўлиши мумкин. $P \rightarrow Q$ ўрнига қўйиш формуласи оддий формула ва $P \rightarrow \cdot Q$ ўрнига қўйиш формуласи натижавий (хуносавий) формула деб аталади.

Берилган $P \rightarrow Q$ ва $P \rightarrow \cdot Q$ ўрнига қўйиш формулаларининг исталган бирини ифодалаш учун $P \rightarrow (\cdot)Q$ умумий кўринишдаги ёзувни ишлатамиз.

Алфавитнинг қуидаги ўрнига қўйиш формулаларининг чекли рўйхати

$$P_1 \rightarrow (\cdot)Q_1,$$

$$P_2 \rightarrow (\cdot)Q_2,$$

.....

$$P_r \rightarrow (\cdot)Q_r$$

алгоритм схемаси деб аталади ва у A алфавитда қуидаги алгоритмни юзага келтиради: агар шундай W, V сўзлар (бўш сўз бўлишлари мумкин) топилиб, $Q = WTV$ бўлса, у ҳолда T сўз Q сўзнинг таркибига киради деб келишиб оламиз.

Энди A алфавитда P сўз берилган бўлсин. Бу ерда икки ҳол бўлиши мумкин:

1. P_1, P_2, \dots, P_r сўзларнинг бирортаси ҳам P сўзнинг таркибига кирмайди. Бу тасдиқни қисқа равища $U: P \supset$ шаклида ёзамиз.

2. P_1, P_2, \dots, P_r сўзларнинг орасида P сўзнинг таркибига киравчилари топилади. Энди $1 \leq m \leq r$ муносабатни қаноатлантирувчи энг кичик бутун сон m ва P_m сўз P нинг таркибига киравчи сўз бўлсин.

P сўзининг таркибига энг чапдан кирган P_m сўзни Q_m билан алмаштиришдан ҳосил бўладиган сўзни R дейлик. P ва R орасидаги айтилган муносабатни:

а) агар $P \rightarrow (\cdot)Q_m$ ўрнига қўйиш формуласи оддий формула бўлса,

$$U: P \vdash R \quad (1)$$

шаклида ва;

б) агар $P \rightarrow (\cdot)Q_m$ ўрнига қўйиш формуласи натижавий формула бўлса,

$$U: P \vdash \cdot R \quad (2)$$

шаклида ёзамиз.

(1) ҳолда U алгоритм P сўзни R сўзга оддий ўтказади дейилади ва (2) ҳолда U алгоритм P сўзни R сўзга натижавий ўтказади деб айтилади.

$U: P \models R$ символик ёзув A алфавитда шундай R_0, R_1, \dots, R_k сўзлар кетма-кетлиги мавжудки, $P = R_0, R = R_k, j = 0, 1, \dots, k - 2$ лар учун $U: R_j \vdash R_{j+1}$ ва ёки $U: R_{k-1} \vdash R_k$, ёки $U: R_{k-1} \vdash \cdot R_k$ (охирги ҳолда $U: P \models R$ ўрнига $U: P \models \cdot R$ ёзилади) эканлигини билдиради.

Ёки $U: P \models \cdot R$, ёки $U: P \models R$ ва $U: R \supset$ бўлганда ва факат шундагина $U(P) = R$ деб қабул қиласиз.

Юқоридаги каби аниқланган алгоритм *нормал алгоритм* ёки *Марков алгоритми* деб аталади.

U алгоритмнинг амал қилишини куйидагича ифодалаш мумкин. A алфавитда P сўз берилган бўлсин. U алгоритм схемасида P_m сўз P нинг таркибига киравчи биринчи $P_m \rightarrow (\cdot)Q_m$ ўрнига қўйиш формуласини топамиз. P сўзининг таркибига энг чапдан кирган P_m сўз ўрнига Q_m формулани қўямиз. R_1 шундай ўрнига қўйишнинг натижаси бўлсин. Агар $P_m \rightarrow (\cdot)Q_m$ ўрнига қўйиш формуласи натижавий бўлса, у ҳолда алгоритмнинг иши тугайди ва унинг қиймати R_1 бўлади. Агар $P_m \rightarrow (\cdot)Q_m$ ўрнига қўйиш формуласи оддий бўлса, у ҳолда R_1 га P га нисбатан ишлатилган процедурани бажаралимиз ва ҳоказо. Агар охирги босқичда $U: R_i \supset$ муносабатни

қаноатлантирувчи (яъни, P_1, P_2, \dots, P_r сўзларнинг бирор таси R_i таркибига кирмайди) R_i сўз ҳосил бўлса, у ҳолда алгоритмнинг иши тутайди ва R_i унинг қиймати бўлади.

Агар ифодаланган жараён охирги босқичда тамом бўлмаса, у ҳолда U алгоритм P сўзга татбиқ этилмайди деб айтилади.

1- мисол. $\{b, c\} A$ алфавит бўлсин. Куйидаги алгоритм схемасини кўрамиз:

$$\left. \begin{array}{l} b \rightarrow \cdot \wedge \\ c \rightarrow c \end{array} \right\}.$$

Бу схема билан берилган U нормал алгоритм A алфавитдаги таркибига камида битта b ҳарфи кирган ҳар қандай P сўзни шундай сўзга ўзгариради, бу сўз P сўздан унинг таркибига энг чапдан кирган b сўзни ўчириш натижасида ҳосил бўлади.

Ҳақиқатан ҳам, P сўз таркибига энг чапдан кирган b сўздан чапроқда турган ҳар қандай c ҳарфни $c \rightarrow c$ оддий ўрнига қўйиш формуласи яна c ҳарфига ўтказади ва энг чапдаги b ҳарфини $b \rightarrow \cdot \wedge$ натижавий ўрнига қўйиш формуласи \wedge натижавий бўш сўзга ўзгариради.

Масалан, агар $P = ccbbc$ бўлса, у ҳолда $P \rightarrow \cdot Q$, бу ерда $Q = ccbc$. U алгоритм бўш сўзни ўз-ўзига ўзгариради.

U алгоритм b ҳарфи кирмаган бўш бўлмаган сўзларга татбиқ этилмайди. Ҳақиқатан ҳам, агар P сўз фақат c ҳарфлардан иборат бўлса, у ҳолда $c \rightarrow c$ оддий ўрнига қўйиш формуласи уни яна ўзига айлантиради. У ҳолда ҳамма вақт $P \rightarrow P$ бўлади ва биз натижавий ўрнига қўйиш формуласига кела олмаймиз, яъни жараён чексиз давом этади.

2- мисол. A ушбу $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ алфавит бўлсин. Куйидаги схемани кўрамиз:

$$\left. \begin{array}{l} a_0 \rightarrow \wedge \\ a_1 \rightarrow \wedge \\ \dots \\ a_n \rightarrow \wedge. \end{array} \right\}$$

Бу схемани $\forall_i (a_i \rightarrow \wedge) (a_i \in A)$ кўринишида ҳам ёзиш мумкин. Бу схема A алфавитдаги ҳар қандай сўзни бўш сўзга ўзгартирадиган U нормал алгоритмдир. Масалан,

$$U: a_1 a_2 a_1 a_3 a_0 \vdash a_1 a_2 a_1 a_3 \vdash a_2 a_1 a_3 \vdash a_2 a_3 \vdash \wedge$$

ва охири $U: \wedge \supset$. Демак, $U(a_1 a_2 a_1 a_3 a_0) = \wedge$.

З-мисол. A алфавит S_1 ҳарфдан иборат бўлсин. Бу ҳарфни 1 билан белгилаймиз. Ҳар қандай n натурал сон учун индукция методи бўйича $\bar{0} = 1$ ва $\bar{n+1} = \bar{n}1$ ларни аниқлаймиз. Шундай қилиб, $\bar{1} = 11$, $\bar{2} = 111$ ва ҳоказо.

\bar{n} сўзлар рақамлар деб айтилади. Ушбу

$$\{\wedge \rightarrow -1\}$$

схема орқали берилган U нормал алгоритмни аниқлаймиз. A алфавитдаги ҳар қандай P сўз учун $U(P) = 1P$ га эга бўламиз. Хусусий ҳолда, ҳар қандай n натурал сон учун $U(\bar{n}) = \bar{n+1}$. Ҳар қандай P сўз \wedge бўш сўзниг киришидан бошланишини (чунки $P = \wedge P$) эсласак, келтирилган алгоритмнинг тўғрилигига ишонамиз.

9- §. Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи ва ҳисобланувчи функциялар

- Батамом эквивалент алгоритмлар.** Эквивалент алгоритмлар. Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функциялар. Марков бўйича ҳисобланувчи функциялар. Қисмий рекурсив функция билан Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функция орасидаги муносабат. Умумрекурсив функция билан Марков бўйича ҳисобланувчи функция орасидаги муносабат.

U ва K алгоритмлар ва P сўз бўлсин. Агар U ва K алгоритмларнинг иккаласи ҳам P сўзга татбиқ этилмайдиган ёки иккаласи ҳам унга татбиқ этиладиган ва кейинги ҳолда $U(P) = K(P)$ бўлса, бу ҳолатни $U(P) \approx K(P)$ кўринишда ифодалаймиз.

Умуман, агар C ва D бирор ифодалар бўлса, у ҳолда $C \simeq D$ муносабат қўйидагини билдиради: ёки иккала ифода ҳам аниқланмаган, ёки иккаласи ҳам аниқланган ва улар бир хил обьектни белгилайди.

1-таъриф. Агар A алфавитдаги исталган P сўз учун $U(P) \simeq K(P)$ бўлса, у ҳолда U ва K алгоритмлар A га нисбатан A алфавит устида батамом (*тамомила*) эквивалент деб аталади.

Агар P берилган A алфавитдаги сўз бўлганида ҳар доим $U(P) \simeq K(P)$ ҳамда ҳеч бўлмагандага $U(P)$ ёки $K(P)$ сўзларнинг бирортаси аниқланган ва яна A нинг сўзи бўлса, U ва K алгоритмлар A алфавитга нисбатан эквивалент деб аталади.

Мушбу $\{1, *\}$ алфавит, ω — ҳамма натурал сонлар тўплами, ϕ эса n аргументли қисмий эффектив ҳисобланувчи арифметик функция, яъни ω^n тўпламнинг айрим қисм тўпламини ω га акслантирувчи функция бўлсин.

B_ϕ орқали ҳеч бўлмагандага бир томони аниқланган ҳолда ҳар доим $B_\phi(\overline{(k_1, k_2, \dots, k_n)}) = \overline{\phi(k_1, k_2, \dots, k_n)}$ тенгликни ўринили қиласиган M даги алгоритмни белгилаймиз. Бу алгоритм (k_1, k_2, \dots, k_n) сўзидан фарқ қилувчи бошқа сўзларга татбиқ этилмайди деб фараз қиласиз.

2-таъриф. Агар M устида M га нисбатан B_ϕ га батамом эквивалент бўлган нормал алгоритм мавжуд бўлса, у ҳолда ϕ ни *Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функция* деб аталади.

3-таъриф. Агар ϕ функция ҳар қандай n натурал сон учун (ҳамма жойда) аниқланган ва *Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функция* бўлса, у ҳолда у *Марков бўйича ҳисобланувчи функция* деб аталади.

Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функция тушунчалиси билан қисмий рекурсив функция тушунчалиси ҳамда Марков бўйича ҳисобланувчи функция тушунчалиси билан умумрекурсив функция тушунчалари эквивалентдир.

Келтирилган тасдиқни исботловчи қуйидаги теорема мавжуд.

1-теорема. Ҳар қандай қисмий рекурсив функция Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функция бўлади ва ҳар қандай умумрекурсив функция Марков бўйича ҳисобланувчи функциядир.

Куйидаги теоремаларни исботсиз келтирамиз.

2-теорема. Агар A алфавит устидаги U алгоритм бўйича, ψ_U функция қисмий рекурсив (рекурсив) бўлса, у ҳолда A алфавит устидаги A га нисбатан U алгоритмга батамом эквивалент бўлган нормал алгоритм мавжуддир.

3-теорема. Агар U алгоритм A алфавит устидаги нормал алгоритм бўлса, у ҳолда ψ_U қисмий рекурсив функция бўлади; агар, бундан ташқари, U алгоритм A алфавитдаги ҳар қандай сўзга татбиқ этиладиган бўлса, у ҳолда ψ_U умумрекурсив функция бўлади.

Натижа. Агар берилган ϕ қисмий функция Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функция бўлса, у қисмий рекурсив функция ҳам бўлади ва агар ϕ Марков бўйича ҳисобланувчи функция бўлса, у ҳолда ϕ умумрекурсив функция ҳамдир.

Натижа ва теоремаларнинг исботи Э. Мендельсон китобининг [39] 242–244 ва 246–249- бетларида келтирилган.

Шундай қилиб, келтирилган натижа ва 1-теорема Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функция тушунчаси билан қисмий рекурсив функция (худди шундай, Марков бўйича ҳисоблаш билан рекурсивлик) тушунчасининг эквивалентлигини кўрсатади.

Ўз навбатида Чёрч тезиси бўйича ҳисобланувчанлик тушунчаси билан рекурсивлик тушунчаси (қисмий эффектив ҳисобланувчанлик тушунчаси қисмий рекурсивлик тушунчасига) эквивалентдир. А.А. Марков алгоритмлар атамасида *нормаллаштириш (нормализация)* принципини яратди: A алфавитдаги ҳар қандай алгоритм A га нисбатан A устидаги бирор нормал алгоритмга батамом эквивалентдир.

Чёрч тезиси билан нормаллаштириш принципининг эквивалентлиги аниқланди. Ҳақиқатан ҳам, Чёрч тезиси түғри. A алфавитда U алгоритм берилган бўлсин. Унга мос келадиган ψ_u функция қисман эффектив ҳисобланувчи бўлади. У ҳолда, Чёрч тезисига асосан, ψ_u қисмий рекурсив функциядир. Демак, 2- теоремага кўра, U алгоритм A устидаги бирор нормал алгоритмга A га нисбатан батамом эквивалентdir. Шундай қилиб, агар Чёрч тезиси түғри бўлса, у ҳолда Марковнинг нормаллаштириш принципи ҳам түғридир.

Энди нормаллаштириш принципи түғри ва ϕ ихтиёрий қисман эффектив ҳисобланувчи функция, B_ϕ эса ϕ функцияга мос келувчи M даги алгоритм бўлсин. Нормаллаштириш принципига асосан B_ϕ алгоритм M устидаги бирор нормал алгоритмга M га нисбатан батамом эквивалентdir. Демак, ϕ функция Марков бўйича қисман ҳисобланувчи функциядир. У ҳолда олинган натижага кўра ϕ қисман рекурсив (рекурсив) функция бўлади. Шундай қилиб, Марковнинг нормаллаштириш принципидан Чёрч тезисини келтириб чиқардик.

Мълумки, алгоритм ва эффектив ҳисобланувчи функция тушунчалари интуитив тушунчалар бўлғанлиги учун биз Марковнинг нормаллаштириш принципи ва Чёрч тезисининг түғрилигини исбот қила олмаймиз.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, Чёрчнинг λ - ҳисобланувчанлик назарияси ва Постнинг нормал системалар назариясидан келиб чиқадиган тушунчалар ҳам қисман рекурсив функция ёки нормал алгоритм тушунчаларига эквивалент бўлади.

10- §. Алгоритмик ечилмовчи муаммолар

- Ечилиш алгоритми. Ечиливчи муаммолар. Ечилмовчи муаммолар. Математик мантиқда келтириб чиқарувчанликни таниши муаммоси. Чёрч теоремаси. Ўз-ўзига татбиқ этилувчанликни таниши муаммоси. Ассоциатив ҳисобидаги сўзларнинг эквивалентлик муаммоси. Марков, Пост, Новиков, Цейтлин, Чёрч ва бошқа математиклар олган илмий нағижалар.

Математика тарихида бирор масаланы ечиш, одатда, унинг ечилиш алгоритмини топиш деб ҳисобланарди. Деярли XX аср бошларигача ҳамма математик масалалар алгоритмик ечилувчи масалалар деб қаралган ва уларни ечувчи алгоритмлар изланган. Масалан, ҳақиқий коэффициентли n - даражали күпхаднинг илдизларини унинг коэффициентлари ёрдамида радикалларда ифода этиш алгоритмини излаш бир неча асрлар давом этди. Масалан, учинчи ва тўртинчи даражали тенгламалар учун бу алгоритмни XVI асрда итальян математиклари Кардано ва Феррари яратдилар. Узоқ йиллардан кейин норвегиялик математик Абель $n \geq 5$ бўлганда бундай алгоритм мавжуд эмаслигини кўрсатди. Иккинчи мисол сифатида Гильбертнинг диофант тенгламалар ҳакидаги 10- муаммосини кўрсатиш мумкин. Бу муаммони Гильберт 1900 йилда Парижда зълон қилган эди. Деярли 70-йилдан кейин рус математиклари Ю. Матиясевич ва Г. Чудновский бу муаммо алгоритмик ечилмөвчи муаммо эканлигини исботлаб бердилар.

Фақат алгоритмнинг интуитив тушунчасидан Тьюринг машинасининг аниқ тушунчасига ўтиш берилган оммавий муаммонинг алгоритмик ечилувчанлик масаласига аниқлик киритди. Бу масалани қуйидагича ифодалаш мумкин: *берилган оммавий муаммони ечадиган Тьюринг машинаси мавжудми ёки бундай машина мавжуд эмасми?*

Бу саволга алгоритмлар назарияси айрим ҳолларда салбий жавоб беради. Шу турдаги натижаларни биринчилар қаторида 1936 йилда америкалик математик А.Чёрч олди. У предикатлар мантиқидаги ечилиш муаммоси умумий ҳолда алгоритмик ечимга эга эмаслигини кўрсатди. Ўша йилнинг ўзида у математик мантиқидаги келтириб чиқарувчанликни таниш муаммоси ҳам алгоритмик ечилмаслигини исбот қилди. Кейинги масалани батафсироқ кўриб ўтайлик.

10.1. Математик мантиқда келтириб чиқарувчанликни таниш муаммоси. Математикада аксиоматик методнинг мазмунини қуйидагидан иборат: берилган назариянинг ҳамма

мулоҳазалари (теоремалари) шу назарияда исботсиз қабул қилинган мулоҳазалар (аксиомалар) дан формал мантикий келтириб чиқариш воситаси билан олинади.

Математик мантиқда формулаларнинг маҳсус тили ифодаланади. У орқали математик назариянинг исталган мулоҳазаси бутунлай аниқланган формула кўринишида ёзилади. *A* асос (шарт)дан *B* натижани мантикий келтириб чиқариш жараёнини дастлабки формулаларни формал алмаштиришлар жараёни сифатида ифодалаш мумкин. Бунга мантикий ҳисобдан фойдаланиш йўли билан эришиш мумкин.

Танланган мантикий ҳисобда *B* мулоҳазани *A* асосдан мантикий келтириб чиқариш масаласи *A* формуладан *B* формулага олиб келувчи дедуктив занжирнинг мавжудлиги масаласидир. Шу туфайли келтириб чиқарувчанликни таниш муаммоси пайдо бўлади: мантикий ҳисобдаги исталган иккита *A* ва *B* формула учун *A* дан *B* га олиб келувчи дедуктив занжир мавжудми ёки йўқми?

Бу муаммонинг ечими сифатида ҳар қандай *A* ва *B* лар учун жавоб берадиган алгоритм мавжудлиги маъносида тушунилади. Чёрч олган натижа қўйидагича изоҳланади.

Чёрч теоремаси. *Келтириб чиқарувчанликни таниш муаммоси алгоритмик ечилмовчидир.*

10.2. Ўз-ўзига татбиқ этувчанликни таниш муаммоси. Тьюринг машинасининг шифри тушунчасини киритамиз. Ҳозиргача Тьюринг машинасининг дастурини икки ўлчовли $m \times n$ жадвал кўринишида ёзардик. Аммо уни бир ўлчовли шаклда ҳам тасвирлаш мумкин. Бунинг учун 5 та символни шундай кетма-кетликда ёзиш керакки, бешликнинг биринчи символи жадвалнинг устунини, иккинчиси сатрини ва кейинги учтаси жадвалнинг юқорида кўрсатилган устун ва сатрлари кесишмасидаги учта символни (командани) ифодаласин.

Масалан, 3- жадвалда ифодаланган функционал схема ўрнига қўйидаги бир ўлчовли сатрни ҳосил қиласиз:

$$a_0 q_1 a_0 q_3 | q_1 \alpha \text{ и } q_2 \alpha q_1 \alpha \text{ и } q_1 \beta q_1 \beta \text{ и } q_1 a_0 q_2 a_0 \text{ и } q_4 \dots \quad (1)$$

Машина конфигурациясини ифодалашда ҳам шу усулан фойдаланамиз, яғни ҳолатни ифодаловчи ҳарфни «күрилаётган» ҳарфнинг тағидан эмас, балки чап ёнидан ёзамиз. Масалан,

|||||

q_4

конфигурацияни қуйидаги шаклда ёзамиз: ||||| q_4 |||.

(1) сатрдаги ҳар бир ҳарфни қуйидаги шарттарға риоя қылған ҳолда қайта номлаймиз:

1) (1) сатрни айрим кодлаштирилған гурухларға бир қийматтың қилиб бўлмоқ керак;

2) код символлари уч турда бўлишлари керак:

а) l , n , n ҳарфлари учун;

б) ташқи алфавит ҳарфлари учун;

в) машина ҳолатини ифодаловчи ҳарфлар учун.

Шу муносабат билан қуйидаги кодлаштириш жадвалидан фойдаланамиз:

Алфавит	Ҳарф	Кодлаштирилған гурух	Эслатмалар
Адреслар ҳарфи	l	101	1 лар орасида 1 та ноль
	n	1001	1 лар орасида 2 та ноль
	n	10001	1 лар орасида 3 та ноль
Ташқи алфавит	a_0	100001 4 та ноль	2 дан катта жуфт сонли
	a_1	10000001 6 та ноль	ноллар
	
	a_n	10...01 2($n + 2$) та ноль	
Ички алфавит	q_1	1000001 5 та ноль	3 дан катта тоқ сонли
	q_2	100000001 7 та ноль	ноллар
	
	q_m	10...01 2($n + 1$) + 1 та ноль	

Агар (1) сатрдаги $1, \alpha, \beta$ символларни мос равиша a_1, a_2, a_3 ҳарфлар деб қарасак, у ҳолда уни шу кодлаштириш системаси асосида күйидегида ёзиш мүмкін:

1000011000001100001100011000000001100000011000001... (2)

Функционал схема ёки алоқида олинган бирор конфигурация учун түзилгандың 1 ва 0 лардан иборат бўлган бундай сатр функционал схеманинг шифри ёки конфигурациянинг шифри деб аталади.

Тьюринг машинасининг лентасида машина алфавитида ёзилган унинг ўз (хусусий) шифри тасвирланган бўлсин. Икки ҳол бўлиши мүмкін:

1. Машина ўзининг шифрига татбиқ этилади, яъни машина бу шифрни қайта ишлайди ва чекли сон қадамлардан сўнг тўхтайди.

2. Машина ўзининг шифрига татбиқ этилмайди, яъни машина ҳеч қачон тўхташ ҳолатига ўтмайди.

Шундай қилиб, машиналарнинг ўзи (уларнинг шифри) икки синфга бўлинади: татбиқ этиладиган Тьюринг машиналари синфи ва татбиқ этилмайдиган Тьюринг машиналари синфи. Шунинг учун кўйидаги оммавий муаммо: ўз-ўзига татбиқ этилувчанликни таниш муаммоси пайдо бўлади.

Берилган ҳар қандай шифрга нисбатан шифрланган Тьюринг машинаси қайси синфга киришини аниқлаш керак: татбиқ этиладиган синфами ёки татбиқ этилмайдиган синфами?

2-теорема. Ўз-ўзига татбиқ этилувчанликни таниш муаммоси алгоритмик ечимга эга эмас (ешилмовчидир).

10.3. Ассоциативлик ҳисобидаги сўзларнинг эквивалентлик муаммоси. Алгоритмик ҳал этилмаслик ҳақидаги дастлабки натижалар математик мантиқ ва алгоритмлар назарияларида пайдо бўлган муаммолар учун олинган эди. Ушбу муаммолардан айримларини 10.1–10.2- бандларда келтирдик.

Кейинчалик, шунга ўхшаш муаммолар математиканинг турли хил қисмларида ҳам мавжуд эканлиги аниқланди. Шулар қаторида биринчи навбатда алгебраик муаммолар, шу жумладан, сўзлар эквивалентлиги муаммосидир.

$A = \{a, b, c, \dots\}$ алфавит ва ундаги сўзлар тўпламини кўриб ўтайлик. Агар L сўз M сўзнинг бир қисми бўлса, у ҳолда L сўз M сўзнинг таркибиغا киради деб айтамиз. Масалан, bca сўзи $abcabac$ сўзининг таркибиغا киради. Энди

$$P - Q \text{ ёки } P \rightarrow Q$$

кўринишидаги жоиз ўрнига қўйишлар орқали бир хил сўзларни иккинчи хил сўзларга ўзгартиришни кўриб ўтамиз.

R сўзнинг таркибиغا камида битта P сўз кирган бўлсагина, белтиланган йўналишти (ориентирланган) $P \rightarrow Q$ ўрнига қўйишни R сўзга қўллаш мумкин. Бу ҳолда унинг таркибидаги исталган битта P сўз Q сўз билан алмаштирилади.

Йўналишсиз $P - Q$ ўрнига қўйишни R сўзга қўллаш, унинг таркибидаги P сўзни Q га ёки Q сўзни P га алмаштиришни билдиради.

Асосан йўналишсиз ўрнига қўйишларни кўриб ўтамиз.

Мисол. $ac - aca$ ўрнига қўйишни $bcacab$ сўзига икки хил усул билан татбиқ этиш мумкин: бу сўз таркибидаги aca сўзини алмаштириш $bcacab$ сўзини ва ac сўзини алмаштириш $bcacaab$ сўзини беради.

Бу ўрнига қўйиш формуласи $abcab$ сўзига татбиқ этилмайди.

1-тaъриф. *Бирор алфавитдаги ҳамма сўзлар мажмуси билан жоиз ўрнига қўйишларнинг чекли системаси (тизими) ассоциатив ҳисоб деб аталади.*

Ассоциатив ҳисобни бериш учун унга мос бўлган алфавит ва ўрнига қўйиш системасини бериш кифоя.

Агар R сўзни жоиз ўрнига қўйишни бир марта татбиқ этиш натижасида S сўзга алмаштириш мумкин бўлса, у ҳолда S ни ҳам шу йўсинда R га алмаштириш мумкин. Бу ҳолатда R ва S сўзлар қўшни сўзлар деб аталади.

2-таъриф. Ҳар бир R_i ва R_{i+1} ($i = 1, 2, \dots, n - 1$) жуфт сўзлар $R_1, R_2, \dots, R_{n-1}, R_n$ сўзлар кетма-кетлигининг қўйни сўзлари бўлса, у ҳолда $R_1, R_2, \dots, R_{n-1}, R_n$ сўзлар кетма-кетлиги R сўздан S сўзга олиб келадиган дедуктив занжир деб аталади.

Агар R сўздан S сўзга олиб борадиган дедуктив занжир мавжуд бўлса, S сўздан R сўзга олиб борадиган дедуктив занжир ҳам мавжуд бўлади. Бу ҳолда R ва S сўзларни эквивалент сўзлар деб айтамиз ва $R \sim S$ кўринишда белгилаймиз.

Ҳар бир ассоциатив ҳисоб учун ўзининг маҳсус сўзлар эквивалентлиги муаммоси мавжуд: берилган ассоциатив ҳисобдаги ҳар қандай иккита сўз учун улар ўзаро эквивалентми ёки йўқми эканлигини билиш талаб этилади.

Ассоциатив ҳисоб учун сўзлар эквивалентлиги муаммоси 1911 йилда қўйилган эди. Ўша йилнинг ўзида маҳсус кўринишдаги байзи ассоциатив ҳисоблар учун сўзлар эквивалентлигини таниш алгоритми тавсия этилган эди.

Табийики, исталган ассоциатив ҳисобга татбиқ этилиши мумкин бўлган умумий алгоритмни топиш масаласи вужудга келди.

1946 ва 1947 йилларда бир-биридан бехабар ҳолда рус математиги А.Марков ва америка математиги Э.Пост исталган ассоциатив ҳисоби учун сўзлар эквивалентлигини таниш алгоритми мавжуд эмаслигини кўрсатдилар. Улар шундай муайян ассоциатив ҳисоблар туздиларки, уларнинг ҳар бири учун сўзлар эквивалентлиги муаммоси алгоритмик ечилмовчи эди.

1955 йилда рус математиги П.С.Новиков гурухларнинг айнан тенглиги муаммоси алгоритмик ечимга эга эмаслигини исботлади. Бу муаммо формал равишда ассоциатив ҳисобидаги сўзлар эквивалентлиги муаммосининг хусусий ҳолидир.

А.Марков ва Э.Пост томонидан тадқиқ этилаётган муаммонинг алгоритмик ечимга эга эмаслигини кўрсатиш учун тузилган мисоллар анча мураккаб ва юздан ортиқ жоиз ўрнига қўйишлар қўлланилган эди.

Санкт-Петербурглик математик Г.С.Цейтлин шу муаммонинг алгоритмик ечилмовчилигини исботлаш учун тузган мисолида фақатгина еттига жоиз ўрнига қўйишдан фойдаланади.

Навбатдаги мисол сифатида предикатлар мантиқидаги ечилиш муаммоси ва диофант тенгламалар тўғрисидаги Гильбертнинг 10- муаммосини кўрсатиш мумкин.

1936 йилда америкалик математик А.Чёрч предикатлар мантиқидаги ечилиш муаммоси умумий ҳолда алгоритмик ечилмовчилигини исботлади.

1970 йилда рус математиклари Ю.В.Матиясевич ва Г.В.Чудновский диофант тенгламалар ҳақидаги Гильбертнинг 10- муаммоси алгоритмик ечимга эга эмаслигини кўрсатганикларини яна бир эслатамиз.

Шундай қилиб, математикада кўплаб оммавий муаммолар алгоритмик ечимга эга эмас.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. A алфавит ё ва бу алфавитда ихтиёрий Q сўз берилган бўлсин. Куйидаги схемалар орқали берилган нормал алгоритмларнинг ишини ифодаланг:

а) $\{\wedge \rightarrow \cdot Q\}$;

б) $B = A \cup \{\alpha\}$ алфавитдаги схема, бу ерда $a \notin A$:

$$\begin{cases} a\xi \rightarrow \xi\alpha, (\xi \in A), \\ \alpha \rightarrow \cdot Q, \\ \wedge \rightarrow \alpha; \end{cases}$$

с) $\begin{cases} \xi \rightarrow \wedge, (\xi \in A), \\ \wedge \rightarrow \cdot Q; \end{cases}$

д) $B = A \cup \{1\}$ алфавитдаги схема:

$$\{\xi \rightarrow 1 \quad (\xi \in A \rightarrow \{1\}) \quad \{\xi \rightarrow 1.$$

2. f функция қисман рекурсив функция бўлмаслигини исбот қилинг:

$$1) f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{агар } \varphi_x(y) \text{ аниқланган бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда;} \end{cases}$$

$$2) f(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } \varphi_x(x) \text{ аниқланган бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда;} \end{cases}$$

$$3) f(x, y) = \begin{cases} \varphi_x(y), & \text{агар } \varphi_x(y) \text{ аниқланган бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда;} \end{cases}$$

$$4) f(x, y, z) = \begin{cases} 1, & \text{агар } \varphi_x(y) = z \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда;} \end{cases}$$

$$5) f(x, y, z) = \begin{cases} 1, & \text{агар шундай у мавжуд бўлсаки,} \\ \varphi_x(y) = z \text{ бўлсин,} \\ 0, & \text{акс ҳолда.} \end{cases}$$

3. f функция қисман рекурсив функция бўлиш ёки бўлмаслигини аниқланг:

$$1) f(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } \varphi_x(x) = 1 \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда;} \end{cases}$$

$$2) f(x) = \begin{cases} \text{аниқланмаган, агар } \varphi_x(x) \text{ аниқланган бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда;} \end{cases}$$

$$3) f(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } 1 \in \varphi_x \text{ функция қийматлар} \\ & \text{тўпламиининг элементи бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда;} \end{cases}$$

$$4) f(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } \varphi_x(y) \text{ примитив} \\ & \text{рекурсив функция бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда;} \end{cases}$$

$$5) \quad f(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } \pi \text{ сонининг ўнлик системасидаги} \\ & \text{ёйилмасида чексиз кўп ноллар бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда.} \end{cases}$$

Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Марковнинг нормал алгоритмлари. Алфавит, символлар, ҳарфлар, сўз, бўш сўз. Алгоритм таърифи.
2. Алфавит устидаги алгоритм. Алфавитдаги алгоритм.
3. Татбиқ этиладиган ва татбиқ этилмайдиган алгоритмлар.
4. Ўрнига кўйиш усули. Алгоритм схемаси.
5. Нормал алгоритм ёки Марков алгоритми.
6. Батамом эквивалент алгоритмлар. Эквивалент алгоритмлар.
7. Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи ва ҳисобланувчи функциялар.
8. Қисмий рекурсив функция билан Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи функция орасидаги муносабат.
9. Умумрекурсив функция билан Марков бўйича ҳисобланувчи функция орасидаги муносабат.
10. Алгоритмик ечилувчи ва ечилмовчи муаммолар.
11. Математик мантиқда келтириб чиқарувчанликни таниш муамоси. Чёрч теоремаси.
12. Марков, Пост, Новиков, Цейтлин, Чёрч ва бошқа математиклар олган илмий натижалар.


Математик мантиқнинг муҳим бўлимларидан бирини ташкил этувчи мулоҳазалар алгебрасининг техникага (математик кибернетикага) татбиқ этилишини кўришга ўтамиз.

Мазкур бобда реле-контактли схемалар, контактли схемалар ва уларнинг синтези, функционал элементлар ва улардан схемалар ясаш, кўп тактли схемалар, функционал элементлар системасининг тўлиқлиги, схемаларни минималлаштириш муаммоси, тескари боғланиши бўлмаган автоматлар, чекли автомат ҳақида умумий тушунчалар, Мили ва Мур автоматлари каби масалалар кўриб чиқилган. Мантиқ алгебраси функцияларини схемалар (автоматлар) орқали реализация қилиш масаласига алоҳида аҳамият берилган.

1- §. Функционал элементлар ва улардан схемалар ясаш

- Функционал элемент. Курилма. Схема ясаш усуллари. Функциянинг реализацияси. Схеманинг математик индукция методи бўйича таърифи. Соҳта кириши. Функционал элементлар системасининг тўлиқлиги. Цикл. Теорема.*

Бирор курилма берилган бўлсин. Унинг ички таркиби бизни қизиқтирумайди. Курилманинг n та тартибланган (масалан, 1 дан n гача рақамланган) «кириши» ва битта «чиқиши» бўлсин (VII.1- шакл).




VII.1- шакл.

Курилманинг ҳар бир киришига икки хил сигнал беринш мумкин (ток бор ёки ток йўқ). Бу сигналларни биз мос равишда 1 ёки 0 билан белгилаймиз. Курилма киришларига берилган ҳар бир сигналлар мажмуаси учун унинг чиқишида битта сигнал пайдо бўлади (1 ёки 0). Чиқишдаги сигналнинг қиймати киришларга берилган сигналлар мажмуасига боғлиқ бўлади. Шундай аниқланган курилмани биз функционал элемент деб атамиз. Маълумки, ҳар бир функционал элементга мантиқ алгебрасининг битта $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияси тўғри келади, бу ҳолда ҳар бир функционал элемент мантиқ алгебрасининг битта функциясини реализация қиласди деб айтамиз. Бунинг учун киришнинг ҳар бир i номерига x_i ($1 \leq i \leq n$) ўзгарувчини мос қилиб қўямиз. У ҳолда ўзгарувчиларнинг ҳар бир a_1, \dots, a_n қийматлар мажмуасига $f(x_1, \dots, x_n)$ функциянинг 0 ёки 1 га teng $f(a_1, \dots, a_n)$ қиймати мос келади.

Агар ϕ_1, \dots, ϕ_n функционал элементлар мавжуд бўлса, у ҳолда улардан янги мураккаб функционал элементларни куйидагича ясаш мумкин.


1. Бирорта функционал элементнинг киришини иккинчи бир функционал элементнинг чиқиши билан туташтириш натижасида мураккаб функционал элемент ҳосил қилиш мумкин (VII.2- шакл).



VII.2- шакл.

Хосил қилинган қурилмани янги функционал элемент деб қабул қилиш мүмкін. Бу функционал элементтің чиқиши φ_3 элементтің чиқишидан, киришлари эса φ_2 ва φ_3 элементтіларнинг озод бүлгандықтан иборат бүләді. Агар янги хосил бүлгандықтан қурилманиң киришларыга сигналдар мажмусини юборсак, у ҳолда φ_3 элементтің озод киришларыға сигналдар бир вақтта етиб боради, қолганига бүлса, φ_2 элементтің чиқишидагы сигнал тушади.


2. Бирор функционал элементтің иккі ва үндән ортиқ киришларини айнан туташтириш натижасыда янги мураккаб функционал элемент хосил қилиш мүмкін (VII.3- шакл).



VII.3- шакл.

Бу функционал элементтің чиқиши φ_1 элементтің чиқишидан иборат, киришлари бүлса, туташтирилмаган киришлардан ва айнан туташтирилған киришларға мөс келәдиган битта киришдан иборат бүләді.

3. Учинчи усул биринчи ва иккінчи усулларнинг комбинациясыдан иборат. Масалан, бирорта φ элементтің бирор киришига φ_1 элементтің чиқиши, иккінчи бирор киришига φ_2 элементтің чиқиши уланади ва айрим киришлары айнан тенгглаштирилади ва ҳоқазо (VII.4- шакл).



VII.4- шакл.

Ҳосил бўлган янги мураккаб функционал элементга биринчи ва иккинчи усусларни қўллаб, яна янги мураккаб функционал элементта эга бўламиз. Шу процессни чексиз давом эттиришимиз мумкин.

Агар $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ функционал элементлар мос равишда f_1, f_2, \dots, f_n функцияларни реализация қилса, у ҳолда ҳосил бўлган янги мураккаб функционал элемент реализация қилалиган функция f_1, f_2, \dots, f_n функцияларнинг суперпозициясидан иборат бўлади.

Ҳақиқатан ҳам, агар бирор S_i функцияни реализация қиласиган ϕ_i элементнинг киришига f_i функцияни реализация қиласиган ϕ_j элементнинг чиқиши уланган бўлса, у ҳолда f_i функциянинг ўша киришига мос бўлган аргументи ўрнига f_j функцияни келтириб қўйишмиз керак. Ҳамма айнан туташтирилган киришлар ўрнига уларга мос келган факат битта аргумент қўйиш керак, шунинг учун VII.2- шаклга асосан, ϕ функционал элемент реализация қиласиган $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ функциянинг x_2 аргументи ўрнига ϕ_i функционал элемент реализация қиласиган $f_i(y_1, y_2)$ функцияни келтириб қўйиш керак. Натижада, $f(x_1, f_i(y_1, y_2)x_3, x_4) = \psi(x_1, x_3, x_4, y_1, y_2)$ функцияни реализация қиласиган мураккаб функционал элементта эга бўламиз, ψ_i функция бўлса, таърифга асосан, f ва f_i функциялар суперпозицияси маҳсулидир. VII.3- шаклдаги функционал элемент $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \psi_2(x_1, x_2, x_5)$ функцияни, VII.4- шаклдаги функционал элемент эса

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9) &= \\ &= f(x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8) = \\ &= f(\phi_1(y_1, y_2), x_2, x_4, x_5, \phi_2(t_1, t_2, t_3)) = \\ &= \psi_3(x_2, x_3, y_1, y_2, t_1, t_2, t_3) \end{aligned}$$

функцияни реализация қиласиди. Демак, ψ_i функция f ва f_i функциялар, ψ_2 функция f функция ва ψ_3 функция эса f, f_1, f_2, f_3 функцияларнинг суперпозициясидир.

Биринчи ва иккинчи усулларни кўллаш натижасида ҳосил қилинган қурилмалар схемалар (*тўғри схемалар*) деб аталади.

Энди схеманинг индукция методи бўйича таърифини берайлик.

1-таъриф. *a) Ҳар қандай функционал элемент схема бўлади. Унинг кириши функционал элементнинг киришидан, чиқиши бўлса, унинг чиқишидан иборат бўлади;*

б) агар S_0 схема ва унинг иккита кириши айнан туташтирилган бўлса, у ҳолда ҳосил бўлган S қурилма ҳам схема бўлади. S нинг чиқиши S_0 нинг чиқишидан ва S нинг киришлари бўлса, S_0 нинг туташтирилмаган киришларидан ва айнан туташтирилган иккита киришга мос келган киришдан иборат бўлади;

в) агар S_0 ва S_1 схемалар бўлса, у ҳолда S_0 схеманинг бирорта киришига S_1 схеманинг чиқишини улаш натижасида ҳосил бўлган S қурилма ҳам схема бўлади. S схеманинг чиқиши S_0 схеманинг чиқишидан ва унинг киришлари S_1 нинг ҳамма киришларидан ҳамда S нинг чиқиши билан туташтирилган S_0 нинг киришидан ташқари озод қолган ҳамма киришларидан иборатdir;

г) б) ва в) бандларда тасвиirlанган усуллар орқали чекли қадамда ҳар қандай схеманинг функционал элементлардан ясаш мумкин.

Бу таъриф олдинги параграфларда функциялар суперпозицияси ҳақида берилган таърифдан шакли жиҳатдан бирмунча фарқ қиласи. Бу фарқ биринчи навбатда схеманинг ранги (функционал элементлардан схема ясаш учун бажарилган қадамлар сони схеманинг ранги деб аталади) деган тушунчани киритмаганимиз туфайли пайдо бўлди. Иккала таърифни таққослаб таҳдил этишни ўкувчига ҳавола этамиз.

Энди мантиқ алгебрасининг схема реализация қиласидаган функциясини индукция методи орқали топайлик.

1. Индукция асоси. Ҳар бир функционал элемент мантиқ алгебрасининг битта функциясини реализация қилиши аниқланган.

2. Индуктив үтиш. а) Агар S_0 схема $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни реализация қилса, у ҳолда 1-таърифнинг б) банди асосида қурилган S_1 схема айнан туташтирилган киришларга мос келадиган x_i , x_j аргументларни айнан тенглаштириш нағижасида ҳосил қилинган функцияни реализация қиласи;

б) $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни S_0 схема ва $\psi(y_1, y_2, \dots, y_m)$ функцияни S_1 схема реализация қилсин, бу ерда x_1, \dots, x_n , y_1, y_2, \dots, y_m лар бир-бирига тенг бўлмаган ўзгарувчилар бўлсин. У ҳолда 1-таърифнинг в) бандига асосан қурилган S схема $f(x_1, \dots, x_{i-1}, \psi(y_1, \dots, y_m), x_{i+1}, \dots, x_n)$ ни реализация қиласи, бу ерда $\psi(y_1, \dots, y_m)$ функция f функцияниңг x_i аргументи ўрнига кўйилган.

Тенг кучли функцияларни бир хил функционал элемент реализация қиласи деб қабул қиласиз. Бунинг учун соҳта кириши деган тушунчани киритамиз.

2-таъриф. Агар функционал элемент реализация қиласи $f(x, y_1, \dots, y_n)$ функцияниңг қиймати x аргументга мос келган кириш сигналининг қиймати (0 ёки 1)га боғлиқ бўлмаса (яъни x ўзгарувчи $f(x, y_1, \dots, y_n)$ нинг соҳта аргументи бўлса, у ҳолда Φ элементнинг x аргументга мос кириши соҳта кириши деб аталади).

3-таъриф. Фақатгина киришларнинг рақамланиш тартиби ва соҳта киришлари билан фарқ қиласидан функционал элементлар эквивалент функционал элементлар деб аталади.

Демак, функционал элементни ўзгартирмасдан исталганча соҳта киришларни олиб ташлаш ёки қўйиш мумкин.

$\Phi = \{\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n\}$ система $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ функционал элементлар системаси ва $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ система f_1, f_2, \dots, f_n функционал элементлар мос равишда реализация қиласидан f_1, f_2, \dots, f_n функциялар системаси бўлсин. $\Phi = \{\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n\}$ система қандай шартларни қаноатлантирганда, мантиқ алгебрасининг исталган функциясини унинг $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ функционал элементларидан ясалган схема орқали реализация қилиш мумкинлиги масаласини кўрайлик.

4-тәріф. *Мантиқ алгебрасидаги исталған $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни Φ системадағы $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ функционал элементтардан ясалған схема орқали реализация қилиш мүмкін бўлса, бу функционал элементлар системаси тўлиқ система деб аталади.*

Биз юқорида схема реализация қиладиган функция шу схемани ясашда фойдаланилган функционал элементлар реализация қиладиган функцияларнинг суперпозициясидан иборат эканлигини кўрган эдик. Демак, $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ функциялар системаси Пост теоремасининг шартларини қаноатлантирган тақдирдагина, $\Phi = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ системасидаги функционал элементлар орқали мантиқ алгебрасининг исталған функциясини реализация этадиган схема ясашимиз мүмкін экан. Бу ердан функционал элементлардан ясалған схемалар тили мантиқ алгебраси функцияларининг суперпозицияси тилига эквивалентлиги келиб чиқади.


Мисоллар. 1. $F_1 = \{xy, x \vee y, \bar{x}\}$ функциялар системаси тўлиқ бўлганлиги учун F_1 нинг элементларини мос равишда реализация қиладиган $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ элементлардан иборат $\Phi_1 = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ система тўлиқ бўлади.

2. $F_2 = \{xy, x \vee y\}$ функциялар системаси тўлиқ бўлмаганлиги учун F_2 нинг элементларини мос равишда реализация қиладиган φ_1, φ_2 элементлардан иборат $\Phi_2 = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ система тўлиқ бўлмайди.

3. $F_3 = \{xy, \bar{x}\}$ функциялар системаси тўлиқ бўлганлиги учун F_3 нинг элементларини мос равишда реализация қиладиган φ_1, φ_3 элементлардан иборат $\Phi_3 = \{\varphi_1, \varphi_3\}$ система ҳам тўлиқ бўлади.

4. $F_4 = \{x \vee y, \bar{x}\}$ функциялар системаси тўлиқ бўлганлиги учун F_4 нинг элементларини мос равишда реализация қиладиган φ_2, φ_3 элементлардан иборат $\Phi_4 = \{\varphi_2, \varphi_3\}$ система ҳам тўлиқ бўлади.

Мисол. $\Phi_1 = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ ва $F_1 = \{xy, \bar{x}\}$ бўлсин. φ_1 функционал элемент xy функцияни, φ_2 эса \bar{x} функцияни реа-



VII.5- шакл.

лизация қилади. Бу функционал элементлар орқали $x \vee y$, $x \rightarrow y$, $x \leftrightarrow y$, $x + y$, 0 ва 1 элементар функцияларни реализация қилиш талаб этилсан.

1) $x \vee y$ ни реализация қилиш учун $x \vee y = \bar{x}\bar{y}$ формуладан фойдаланамиз. Агарда Φ_2 нинг киришига $\bar{x}\bar{y}$ сигнал берсак, у ҳолда унинг чиқишида $\bar{x}\bar{y} = x \vee y$ сигнал пайдо бўлади. $\bar{x}\bar{y}$ сигнални ҳосил қилиш учун Φ_2 элементнинг бирининг киришига x ва иккинчисига \bar{y} сигналларни берамиз. Натижада, унинг чиқишида $\bar{x}\bar{y}$ сигнал пайдо бўлади ва уни Φ_2 нинг кириши билан улаймиз. \bar{x} ва \bar{y} ни ҳосил қилиш учун иккита Φ_2 элементнинг бирининг киришига x ва иккинчисининг киришига y сигналларни бераб, уларнинг чиқишлиари Φ_1 нинг киришлари билан уланади. Шундай қилиб, VII.5- шаклда ифода этилган ($x \vee y$) функцияни реализация қиладиган S_1 схемага эга бўламиз.

2) $x \rightarrow y$ функцияни схема орқали реализация қилиш учун $x \rightarrow y = \bar{x} \vee y = \bar{x}\bar{y}$ формуладан фойдаланамиз. Агарда Φ_2 элементнинг киришига $\bar{x}\bar{y}$ сигнал берилса, у ҳолда унинг чиқишида берилган сигналнинг инкори, яъни $\bar{x}\bar{y} = x \rightarrow y$ сигнал пайдо бўлади. Ўз навбатида $\bar{x}\bar{y}$ сигнални ҳосил

қилиш учун ϕ_1 элемент киришларининг бирига x ва иккинчисига \bar{y} сигнални бериш керак ҳамда унинг чиқишини $\bar{x}\bar{y}$ функцияни реализация қиладиган ϕ_2 элементнинг киришига улаш керак. \bar{y} сигнални ҳосил қилиш учун ϕ_2 элементнинг киришига y сигнал бераб, унинг чиқишини ϕ_1 нинг иккинчи киришига улаймиз. Натижада, $x \rightarrow y = \bar{x}\bar{y}$ функцияни реализация қиладиган S_2 схемага эга бўламиз (VII.6- шакл).

3) $x \leftrightarrow y$ функцияни реализация қиладиган схемани ясаш учун $x \leftrightarrow y = (x \rightarrow y)(y \rightarrow x) = (\bar{x} \vee y)(x \vee \bar{y}) = \bar{x}\bar{y} \cdot \bar{x}y$ формуладан фойдаланамиз. Юқорида акс эттирилган услубдан фойдаланиб, $x \leftrightarrow y = (\bar{x} \vee y)(x \vee \bar{y}) = \bar{x}\bar{y} \cdot \bar{x}y$ функцияни реализация қиладиган S_3 схемани ҳосил қиласмиз (VII.7- шакл).

4) 1 константани реализация қилиш учун $x \vee \bar{x} = 1$ ва 0 ни реализация қилиш учун $x\bar{x} = 0$ формулалардан фойдаланамиз ва уларни реализация қиладиган схемалар VII.8- шаклда келтирилган.

Мисол ечмининг таҳлилидан кўриниб турибдики, бирор ихтиёрий $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни схема орқали реализация қилиш учун:


1) берилган Φ системадаги ϕ_1, \dots, ϕ_n функционал элементлардан кўп поғонали схема тузишга тўғри келади;

2) кўп поғонали схемани юқоридан пастта қараб ясашга тўғри келади;


3) схеманинг озод чиқишли функционал элементи киришларига шундай сигналлар мажмуасини бериш керакки, унинг чиқишида курилаётган схема реализация қилиши керак бўлган f функцияга мос келадиган сигнал пайдо бўлсин;

4) схеманинг ички функционал элементлари киришларига шундай сигналлар мажмуасини бериш керакки, унинг чиқишида сизга керак бўлган сигнал пайдо бўлсин.


Таърифга асосан берилган қурилманинг схема эканлигини аниқлаш мумкин. Аммо схема эмаслигини аниқлаш учун берилган қурилманинг схемага лойиқ бўлган хусусиятларга эга эмаслигини кўрсатиш керак бўлади.




VII.6- шакл.



VII.7- шакл.



a)



б)

VII.8- шакл.

5-таъриф. $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ функционал элементлар берилган бўлсин. Агар Φ_1 элементнинг чиқиши Φ_2 элементнинг киришига, Φ_2 нинг чиқиши Φ_3 элементнинг киришига ва ҳоказо, Φ_{k-1} чиқиши Φ_k нинг киришига ва Φ_k нинг чиқиши Φ_1 нинг киришига уланган бўлса, у ҳолда бундай қурилма цикл деб аталади ва қурилмада тескари боғланниш бор деб айтилади.

Теорема. $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ функционал элементлардан ясалган S қурилма:

- 1) Φ_i ($i = 1, \dots, n$) элементлардан фақатгина биттасининг чиқиши озод бўлса;
- 2) ҳар бир Φ , элементнинг кириши фақатгина Φ , элементларнинг биттасининг чиқиши билан уланган бўлса;
- 3) S қурилмада цикл (тескари боғланиш) мавжуд бўлмаганда ва фақат шундагина схема бўлади.

Теоремани исбот қилишни ўқувчиларга ҳавола этамиз.

2- §. Кўп тактли схемалар

Такт. Ушлаб туриши вақти. Ушлаб туриши элементи. Кўп тактли схема. Бир тактли функционал элементлар системасининг тўлиқлиги. Теорема.

Мазкур бобнинг биринчи параграфида кўрилган функционал элементлар ва улардан ясалган схемалар оний равишда ишлайди деб фараз қилган эдик, яъни уларнинг киришларига сигналлар мажмуаси берилган заҳотиёқ (уларнинг) чиқишиларида натижавий сигнал пайдо бўлади. Демак, киришларга берилган сигналлар мажмуасини ишлаб чиқиши учун хеч қандай вақт сарфланмайди.

Аммо, амалда функционал элемент киришларига берилган сигналлар мажмуасига мос келадиган унинг чиқишидаги натижавий сигнални олиш учун бир оз вақт сарф бўлади. Бундай ҳолатда схеманинг киришларига берилган сигналлар мажмуаси унинг ички функционал элементларининг киришларига ҳар хил вақтда етиб келади, чунки, биринчидан, элементларнинг киришларига етиб келган сигналлар бир қанча элементлардан ўтиб келади, иккинчидан, ҳар бир элемент киришларига етиб келган сигналларни ҳар хил вақтларда ишлаб чиқади. Бироқ схема киришларига берилган сигналлар мажмуасини етарлича узоқ вақт бераб туриш мумкини, токи схема ички элементларининг ҳамма киришларига сигналлар етиб келсин. Натижада, схеманинг чиқишида маълум вақтдан кейин унинг киришларига берилган

сигналлар мажмусига мос келадиган сигнал пайдо бүләди. Шундан кейин киришларга берилган сигналлар наборини тұхтатиш мүмкін ва бу схемани у реализация қиладиган функция қыйматини аргументлар қийматининг бошқа мажмусида ҳисоблаш учун ишлатиш мүмкін.

Функционал элементнинг бу иккінчи хил ишлаши қуидаги камчиликларга зәға бүләди:

1) киришта сигналлар мажмусини маълум вақт давомида беріб туриш;

2) маълум вақт давомида схема чиқишида пайдо бүлдиган сигнал унинг киришларига берилған сигналлар мажмусига мос келмаслиги.

Яңги шароитта қандай қурилмани биз функционал элемент деб биламиз деган саволга жавоб берайлык.


1-таъриф. Элемент (*VII. I-шакл*) учун аниқ бүлгән *у вақтдан кейин унинг чиқишида киришларига берилған сигналлар мажмусига мос келадиган сигнал* (реализация этиладиган функцияның берилған сигналлар наборындағы қыйматы) пайдо бүлса, бундай қурилма **функционал элемент деб аталаади**.

Агар келгуси моментда элемент киришларига яңги сигналлар мажмуси берилса, у ҳолда *у вақтдан кейин унинг чиқишида берилған сигналлар мажмусига мос келадиган сигнал пайдо бүләди*, яғни киришларга кетма-кет берилдиган сигналлар мажмуси бир-бирига бөлгілік бүлмаган ҳолда ишлаб чиқылади.

Вақт дискрет равишида үзгаради деб фараз қиласмиз ($t = 1, 2, 3, \dots, k$) *у вақт берилған сигналлар мажмусига мос келадиган сигнал* *унинг чиқишида пайдо бүлишигача сарф этилған вақт* функционал элементнинг *ушлаб туриш вақты деб аталаади*.

2-таъриф. *у вақт (элемент киришига берилған сигналлар мажмусига мос келадиган сигнал унинг чиқишида пайдо бүлишигача сарф этилған вақт)* функционал элементнинг *ушлаб туриш вақты деб аталаади*.

Бундан кейин схемани берилған таърифга мос келадиган яңги маънодаги функционал элемент сифатида қараймиз. Бундай схемаларни ясаш жараённанда ушлаб туриш элементлари катта роль үйнайды.



3- таъриф. Агар функционал элемент чиқишида маълум вақтдан (тактдан) кейин унинг киришига берилган (0 ёки 1) сигналнинг ўзи пайдо бўлса, у ҳолда бундай функционал элемент ушлаб туриш элементи деб аталади (VII.9- шакл).

VII.9- шакл. Ушлаб туриш элементи функцияни реализация қиласидиган функционал элементdir, яъни унинг чиқишида маълум вақтдан кейин киришига берилган сигналнинг ўзи пайдо бўлади.

Бундан кейин (агарда махсус айтилган бўлмаса) ҳамма функционал элементларни бир тактли, яъни элементнинг киришига сигнал берилгандан кейин унинг чиқишида натижавий сигнал пайдо бўлгунча бир тантрик вақтни деб фарз қиласиз.

4- таъриф. Агар S схеманинг n та киришига (x_1, x_2, \dots, x_n) сигналлар мажмусини бергандан маълум в тақтдан кейин унинг чиқишида f функциянинг $f(x_1, \dots, x_n)$ қиймати ҳосил бўлса, у ҳолда S схема $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни в ушлаб туриш вақти билан реализация қиласиди деб аталади.

Бундай S схемани в ушлаб туриш вақти билан $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни реализация қиласидиган функционал элемент деб караш мумкин.


Мантиқ алгебрасининг исталган функциясини реализация қиласидиган схема *тўғри схема* деб аталади.

Бир тактли функционал элементлардан тузилган схемани *кўп тактли*, оний равишда ишлайдиган функционал элементлардан тузилган схемани *ноль тактли схема* деб атаемиз.


I- изоҳ. Агар (бир тактли функционал элементлардан тузилган) тўғри схемадаги ҳамма функционал элементларни ноль тактли деб фарз қиласак, у ҳолда ҳосил бўлган ноль тактли схема ҳам кўп тактли схема реализация қиласидиган функцияни реализация қиласади.

2-изоҳ. $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни реализация қиладиган N түгри схеманинг ушлаб туриш вақти v доимо схеманинг кетма-кет уланган ички функционал элементлари сонига тенг эмас. Масалан, $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ функционал элементлардан (VII.10-шакл) тузилган схема (VII.11-шакл), кетма-кет уланган функционал элементларнинг сони иккига тенг бўлишига қарамасдан, xy функцияни реализация қилувчи бир тактли схемадир.

3-изоҳ. Константаларни (0 ёки 1) реализация қилалиган схемалар ёки функционал элементларнинг ҳамма киришлари соҳта киришлардир. Бундай схемаларни ноль тактли схемалар деб айтиш мумкин.



VII.10-шакл.



VII.11-шакл.

Энди $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ бир тектелген функционал элементтерден иборат Φ системаның түлиқдик масаласини күришга үтәмиз.

5-тәріф. Агар мантиқ алгебрасының исталған функцияларының $\Phi = \{\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n\}$ системадағы функционал элементтерден түзилгандай схема орқали реализация қилиш мүмкін болса, у ҳолда Φ система түлиқ система деб аталади.


Мисол. $\Phi = \{\Phi_1, \Phi_2\}$ шундай бир тектелген функционал элементтер системасыки, бу ерда Φ_1 элемент x функцияны реализация қиласынан ушлаб туриш элементи, Φ_2 эса \bar{xy} Шеффер функциясыны реализация қиласынан функционал элементтір. Ушбу:

а) \bar{x} ; б) xy ; в) $x \vee y$; г) 1; д) 0; е) $x + y$; з) $x \rightarrow y$; ж) $x \leftrightarrow y$ функцияларни реализация қилувчи схемаларни Φ_1 ва Φ_2 функционал элементтер орқали ясаш ва ушлаб туриш вактіні (тактіні) аниклаш талаб этилади.




Юқорида күрсетілген функцияларни реализация этапынан схемалар күйидегіча бўлади (VII.12-а-ж шакллар):

а) $\bar{x} = \Phi_2(x, x)$




б) $xy = \overline{\Phi_2(x, y)}$




v = 1

v = 2

в) $x \vee y = \Phi_2(\bar{x}, \bar{y})$



 $v = 2$

г) $1 = \bar{x}\bar{x} = \Phi_2(x, \bar{x})$


 $v = 2$

д) $0 = \bar{1}$

е) $x - y = x\bar{y} \vee \bar{x}y = \Phi_2(\Phi_2(x, \bar{y}), \Phi_2(\bar{x}, y))$

 $v = 3$  $v = 3$

$$3) x \rightarrow y = \varphi_2(x, \bar{y}) \quad \text{ж) } x \leftrightarrow y = (x \rightarrow y)(y \rightarrow x) = \overline{x\bar{y} \vee \bar{x}y}$$



VII.12- шакы.

Мисоллар . 1. Шеффер функциясини реализация қила-диган φ элементдан иборат $\Phi = \{\varphi\}$ система түлиқ бўладими?

2. $\Phi_1 = \{0, 1\}$ элементлар системасининг тўлиқлигини исбот қилинг.

Мисоллар ечимларининг таҳлилидан маълумки, бир тактли $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ функционал элементлар системаси $\Phi\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ нинг тўлиқлик шартлари ноль тактли $\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_n^*$ функционал элементлар системаси $\Phi' = \{\varphi_1^*, \varphi_2^*, \dots, \varphi_n^*\}$ нинг тўлиқлик шартларига мос келмайди.

Куйидаги белгилашларни киритамиз: 1) мандық алгебрасининг элементлари $f(0, 0, \dots, 0) = 1$ ва $f(1, 1, \dots, 1) = 0$ (0 ва 1 сақламовчи функциялар, яъни аргументларини айнан тенглаштирилганда f функция га тенг бўлади) функциялардан иборат тўпламни Q билан;

2) исталған қисм үзгарувлар үрнига константаларни (0 әки 1) қўйиб, қолган қисмини айнан тенглаштирганда 0, 1 ёки \bar{x} (яъни x пайдо бўлмайди) ҳосил бўладиган функциялардан иборат тўпламни R билан белгилаймиз.

Теорема. Агар $\Phi\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ бир тактли функционал элементлар системаси реализация қиласидиган функциялар ичida:

a) Пост теоремаси шартларини қаноатлантирувчи функциялар системаси;


b) Q тўплам элементи бўлмаган функциялар;

в) R тўплам элементи бўлмаган функциялар мавжуд бўлганда ва фақат шундагина бундай система тўлиқ бўлади.



Муаммоли масала ва топшириқлар


1. $F_2 = (x \vee y, \bar{x})$ системадаги функцияларни реализация қиласидиган $\Phi_2 = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ функционал элементлар системаси берилган бўлсин (VII.13- шакл).



VII.13- шакл.


$xy, x \rightarrow y, x \leftrightarrow y, x + y, 0$ ва 1 элементар функцияларни реализация этадиган схемалар ясанг.

2. $F_1 = (\bar{x}\bar{y})$ ва $\Phi_1 = \{\varphi_1\}$ ҳамда $F_2 = (\overline{x \vee y})$ ва $\Phi_2 = \{\varphi_2\}$ лар берилган бўлсин. Ҳамма элементар функцияларни реализация қиласидиган схемаларни аввал φ_1 функционал элемент орқали, кейин φ_2 орқали ясанг.
3. VII.14- шаклдаги функционал элементлардан тузилган курилмаларнинг қайси бири схема бўлади?



VII.14- шака.

4. VII.15- шаклдаги курилмаларнинг қайси бири схема бўлади?



VII.15- шакл.

5. $\Phi = \{\Phi_1, \Phi_2\}$ бўлсин, бу ерда Φ_1 функционал элемент $x \vee y$ Шеффер функциясини ва Φ_2 функционал элемент x функциясини (ушлаб туриш элементи) реализация қиласди. Мантиқ алгебрасининг ҳамма элементар функцияларини реализация қиласдиган схемалар ясанг.
6. $\Phi = \{\Phi_1, \Phi_2\}$ бўлсин, бу ерда Φ_1 функционал элемент $x \wedge y$ Шеффер функциясини ва Φ_2 функционал элемент x функциясини (ушлаб туриш элементи) реализация қиласди. $x \rightarrow y \rightarrow z$, $(x \vee y) \leftrightarrow z$, $xz \rightarrow y$, $(x \leftrightarrow y) \rightarrow z$, $(x \leftrightarrow y) \leftrightarrow z$, $(x \rightarrow y) \vee z$ функцияларни реализация қиласдиган схемалар ясанг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Функционал элементлар ва улардан схемалар ясаш.
2. Схеманинг математик индукция методи бўйича таърифи.
3. Функционал элементлар системасининг тўлиқлиги ҳақидаги теорема.

4. Цикл деб нимага айтилади?
5. Ушлаб туриш вақти ва ушлаб туриш элементи.
6. Кўп тактли схеманинг таърифи.
7. Бир тактли функционал элементлар системасининг тўлиқлиги ҳақидаги теорема.

3- §. Тескари боғланиши бўлмаган автоматлар

Элементнинг юқори ва қуий индекси. Тўғри схема. Тескари боғланиши бўлмаган автомат. Характеристик функция. ρ -индекси. Кучсиз автоматли тўлиқ система.

Ўтган параграфда мантиқ алгебрасининг функцияларини фақат тўғри схемаларгина реализация қилишини кўрдик. Бир тактли функционал элементлардан ясалган схеманинг умумий ҳолда ишлаш жараёнини кўрайлик. Схема киришларига ҳар моментда сигналлар мажмуаси бериб турилади. Аниқки, схеманинг чиқишидаги сигнал унинг киришларига олдинги моментларда берилган сигналлар мажмуасига боғлиқ бўлади.

Функционал элементнинг куий ва юқори индекслари деган тушунчани киритайлик.

1 - таъриф. Схеманинг киришларига берилган сигналлар ϕ функционал элементнинг чиқишида ҳосил бўлишига қадар босиб ўтилган ички функционал элементларнинг максимал сони (ϕ элементнинг ўзи ҳам киради) элементнинг **юқори индекси ва минимал сони қуий индекси** деб аталади. ϕ функционал элемент S схеманинг чиқиши элементи (яъни озод чиқишига эга бўлган элементи) бўлсин. У ҳолда ϕ элементнинг юқори ва қуий индексларини мос равишда $\mu = \mu(S)$ ва $\eta = \eta(S)$ билан белгилаймиз.

Демак, схема тўғри бўлиши учун бирор ϕ элементнинг киришларига чиқишилари уланган ҳамма функционал элементларнинг юқори индекслари тенг бўлиши керак (етарли шарт).

Схема таърифига асосан, t вақт моментида схеманинг чиқишидаги сигнал унинг киришларига $t - \mu$ дан $t - \eta$ моментгача берилган сигналлар наборига боғлиқ бўлади. Демак, t моментдаги чиқиш сигнални унинг киришларига $\rho = \mu - \eta + 1$ кетма-кет берилган сигналлар мажмуасининг функцияси бўлади: $F(x_1^0, \dots, x_n^0; x_1^1, \dots, x_n^1; \dots; x_1^{0-1}, \dots, x_n^{0-1})$.

Бу ерда F – мантиқ алгебрасининг ρ^n аргументли функцияси ва киришларга $t - \mu + i$ моментда берилган сигналлар мажмуаси бўлади. Агар схема тўғри бўлса, у ҳолда F функция қатъиян $t - \eta$ моментда (яъни $i = \eta - v$, албатта $\eta \geq v$) берилган фақатгина битта сигналлар (x_1^i, \dots, x_n^i) мажмуасига боғлиқ бўлади ва S схема F функцияни v ушлаб туриш вақти (v тант) билан реализация қиласди.

2-таъриф. n киришга ва битта чиқишга эга бўлган қурилма берилган бўлсин (VII.1- шакл) Ҳар бир моментда унинг киришларига 0 ёки 1 сигнал берилганда, чиқишида ҳар бир t моментда 0 ёки 1 сигнал ҳосил бўлади. Чиқишидаги сигнал киришларга $t - \mu$ дан $t - \eta$ моментгача ρ ($\rho = \mu - \eta + 1$) кетма-кет берилган сигналлар мажмуасининг функцияси бўлади:

$$F(x_1^0, \dots, x_n^0; x_1^1, \dots, x_n^1; \dots; x_1^{0-1}, \dots, x_n^{0-1}).$$

Бу ерда t момент $\mu + i$ моментда берилган сигналлар мажмуига тенг бўлади. У ҳолда бундай қурилма **тескари боғланиши бўлмаган автомат** деб аталади. Мантиқ алгебрасининг F функцияси унинг **характеристик функцияси**, ρ – индекси, v – **ушлаб туриш вақти** деб аталади.

Агар тескари боғланиши бўлмаган иккита автоматнинг F_1 ва F_2 характеристик функциялари фақатгина соҳта аргументлари билан фарқ қиласа, у ҳолда бундай автоматлар эквивалент автоматлар деб аталади.

Ҳар қандай функционал элемент бирорта тескари боғланиши бўлмаган автоматни ифодалайди. Бу элемент учун характеристик функция у реализация қиласидаган функция билан мос тушади, индекс ва ушлаб туриш вақти эса 1 га тенг бўлади.

Шундай қилиб, бир тактли функционал элементлардан тузилган ҳар қандай схема тескари боғланиши бўлмаган автоматни ифодалайди. Аслида функционал элементлар бир тактли бўлиши шарт эмас. Фақатгина схеманинг қуи ва юқори индексларини бошқача ҳисоблаш керак:

φ элементнинг қуи ва юқори индекслари деб, схеманинг киришларига берилган сигналлар φ элементнинг чиқишида ҳосил бўлгунча босиб ўтилган функционал элементлар ушлаб туриш вақтлари йифиндисининг мос равишда минимуми ва максимумига айтилади.

Ҳар қандай тескари боғланиши бўлмаган автомат ўз навбатида битта функционал элементдан тузилган схемани ифодалайди (ушбу фикрнинг тўғрилигини исботлашни ўкувчига ҳавола этамиз).


3- таъриф. *Функционал элементлардан тузилган S схема билан ифодаланадиган автомат тескари боғланиши бўлмаган A автоматдан фақатгина ушлаб туриш вақти v билан фарқ қиласа, бу автомат A автоматни реализация қилади дейилади.*

4- таъриф. *Агар ҳар қандай тескари боғланиши бўлмаган автоматни $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ функционал элементлардан тузилган схема орқали реализация қилиш мумкин бўлса, у ҳолда функционал элементлар системаси кучсиз автоматли тўлиқ система деб аталади. Бир тактли функционал элементлар системаси тўлиқлигининг етарли ва зарурлик шартлари элементлар системасининг кучсиз автоматли тўлиқлик шартига мос келади.*

4- §. Тескари боғланиши бўлган функционал элементлардан схемалар ясаш. Чекли автомат ҳақида умумий тушунчалар

- Тескари боғланишли функционал элементлар. Хотирада сақловчи қурилма. Схеманинг $(t + 1)$ моментдаги ҳолати. $U(\Omega, n)$ автомат. Автомат ҳолатлари. Автомат ишининг натижалари.*

Хозиргача биз функционал элементлардан ясалган тескари боғланиши бўлмаган схемаларни кўриб ўтдик. Бундай чеклашни биз ноль тактли функционал элементлардан схемалар ясаш масаласини счиш учун кўйган эдик, чунки, акс ҳолда, бундай схемаларнинг иш жараёнини ёритиш мумкин эмас эди.



VII.16- шакл.


VII.16- шаклда кўрсатилган функцияни реализация қилалигидан схеманинг иш жараёнини кўриб ўтайлик. ϕ функционални бир тактли элемент деб ҳисоблаймиз. Агар бирор t моментда ϕ нинг чиқишида 1 сигнал пайдо бўлса, у ҳолда шу моментнинг ўзида ўша сигнал унинг киришида пайдо бўлади ва $(t+1)$ моментда унинг чиқишида 0 сигнал пайдо бўлади ва ҳоказо. Натижада, ϕ функционал элементнинг чиқишида кетма-кет 1, 0, 1, 0, 1, 0, ... сигналлар пайдо бўлади ва ϕ ноль тактли функционал элемент бўлган вақтдаги қарама-қаршиликлар ўз-ўзидан йўқолади. Бу схемани «қўнғироқ» схемаси деб аташ мумкин, чунки қўнғироқда бир тактда қарама-қарши қийматларга ўзгарадиган кетма-кет бериладиган сигналлардан фойдаланилди.

Бу параграфда биз куйидаги шартларни қаноатлантирувчи тескари боғланишли схемаларни кўриб чиқамиз:

- 1) курилманинг ϕ , ($i = 1, 2, \dots, n$) элементлари орасида фақат ва фақат биттаси озод чиқишига эга;
- 2) ϕ , элементнинг ҳар бир кириши ϕ , элементларнинг фақатгина биттасининг чиқиши билан уланади.

Юқоридаги шартларни қаноатлантирувчи бир тактли функционал элементлардан ясалган тескари боғланишли схемаларнинг ишлаш жараёнини кўриб ўтайлик. Схема тескари боғланишли бўлганлиги учун унинг чиқишидаги сигнал фақат схема киришларига берилган сигналлар мажмуига эмас, балки унинг ички элементларининг чиқишидаги сигналларга ҳам боғлиқ бўлади. Бу кейинги сигналлар схема киришларига берилган сигналларга боғлиқ бўлмаслиги

ҳам мүмкін ёки анча олдин берилған кириш сигналларига боелиқ бўлиши мүмкін. Масалан, цикл элементларининг кириши схема кириши бўлмаслиги мүмкін. VII.17- шаклдаги ϕ бир тактли элемент $x \vee y$ функцияни, ψ бир тактли элементи эса $(x \vee y)z$ функцияни реализация қилади, f – бир тактли ушлаб туриш элементи.



VII.17- шакл.

Агар VII.17-*a* шаклдаги схеманинг у киришига исталғанча анча олдин 1 сигнал берилған бўлса, у ҳолда шу сигналнинг ўзи доимо унинг чиқишида пайдо бўлиб туради (яъни сигнал хотирада сақланади).

VII.17-*b* шаклдаги схемада у сигнал фақат $z = 1$ бўлган дагина хотирада сақланади. $z = 0$ сигнални бериб, хотирани тозалашимиз мүмкін. Шундан кейингина у нинг янги қийматини хотирада сақтай оламиз ($z = 1$ қийматда). Реал схемаларда «хотирада сақловчи курилма» цикл ёрдамида реализация қилинади.

Тескари боғланишли схема иш жараёнининг характеристикасини ифодалашда унинг ички элементларининг ҳолатини ҳисобга олиш керак.

S – тескари боғланишли схема ва $\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_k$ – унинг элементлари бўлсинг. Бу ерда Φ_0 – чиқиши элементи бўлсинг, яъни озод чиқишига эга бўлган элементдир. Φ_i элементнинг

чиқишидаги t вақт моментидаги сигналини $\phi_i(t)$ билан белгилаймиз ($\phi_i(t)$ сигнал 0 ёки 1 га тенг). Схема чиқишида t моментдаги сигнал $\Phi_0(t)$ га тенг бўлади.

$\Phi(t) = \{\Phi_0(t), \Phi_1(t), \dots, \Phi_k(t)\}$ система S схеманинг t вақт моментидаги ҳолати деб аталади. t моментда S схема киришларига берилган сигналларни $s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t)$ билан ва $s(t) = \{s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t)\}$ орқали уларнинг мажмуини белгилаймиз. У ҳолда схеманинг $(t+1)$ моментдаги ҳолати $\Phi(t+1)$ схеманинг t моментдаги $\Phi(t)$ ва $s(t)$ лари орқали бир қийматли аниқланади, яъни

$$\Phi(t+1) = \Phi(\Phi(t), s(t)).$$

Демак, элементларнинг чиқишидаги $(t+1)$ моментдаги сигналлар уларнинг киришларига t моментда берилган сигналларга боғлиқ бўлар экан, яъни t моментда схеманинг киришларига берилган сигналлар ва элементларнинг шу моментдаги чиқиш сигналлари боғлиқдир. Аниқроғи, Φ система $(k+n+1)$ аргументли $(k+1)$ та $\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_k$ мантиқ алгебраси функцияларининг мажмуудан (тўпламидан) иборат бўлади. Бу $(k+n+1)$ аргументларнинг айримлари соҳта бўлиши мумкин. Масалан, Φ , учун фақат куйидаги аргументлар соҳта эмас: Φ , элементнинг киришларига чиқишлилар уланган функционал элементларга ва схеманинг киришлари бевосита Φ , элементнинг ҳам киришлари деб ҳисобланадиган сигналларга мос келадиган аргументлар. Агар фақат шундай соҳта эмас аргументларни ҳисобга олсак, у ҳолда Φ , функция Φ , элемент реализация этадиган функцияга мос келади ва юқоридаги формула $(t+1)$ вақт моментида Φ , элементларнинг чиқишлиарида t моментда уларнинг киришларига берилган сигналлар мажмуига боғлиқ бўлган қандай сигнал пайдо бўлишини кўрсатади.

Таъриф. Ω тўплам $(k+1) > 0$ узунликдаги иккилик мажмуаларнинг бирор тўплами бўлсин. Агар $(n+k+1)$ аргументли $(k+1)$ та қисман аниқланган Φ , мантиқ алгебрасининг функцияларидан иборат Φ мажмууа кўрсатилган бўлса, у ҳолда Ω руҳсат этилган ҳолатлар тўпламида n киришга эга бўлган $U(\Omega, n)$ автомат берилган деб аталади.

Бу ерда Φ , функциялар шундай $(n + k + 1)$ узунликдаги иккиликтік мажмударда аниқланғанки, улардан $(k + 1)$ та элементи Ω кируди мажмуда бўлади ва шу мажмудаги Φ , функцияларнинг қиймати Ω га киради. Ω тўпламдаги элементлар сони автоматнинг хотираси деб аталади. Агар автоматнинг бошлангич ҳолати $\phi^0 \in \Omega$, бирор натурал сон v (ушлаб туриш вақти) ва ҳар бир вақт моментида n узунликдаги $s(t) = \{s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t)\}$ кириш сигналлар мажмуди берилган бўлса, у ҳолда $U(\Omega, n)$ автоматнинг иш жараёни аниқланған деб аталади.

Агар автоматнинг иш жараёни аниқланған бўлса, у ҳолда $t \geq v$ учун кетма-кет ҳолатлари

$$\phi(t + v) = \Phi(\phi(t), s(t)), \quad \phi(0) = \phi^0$$

формула орқали аниқланади. Бу формула *автоматнинг ҳолатлар тенгламаси* деб аталади. Равшанки, автоматнинг ҳар қандай вақт моментидаги ҳолати $\phi(t) \in \Omega$ бўлади. $\phi^0(t)$ ($t \geq v$) кетма-кетлик *автоматнинг чиқиши (ишнинг натижаси)* деб аталади. Агар $k = 0$ ва Φ фақатгина $s(t)$ га боғлиқ бўлса, у ҳолда U автомат мантиқ алгебрасининг функциясига айланади.

Қабул қилинган белгилашларда бир тактли функционал элементлардан ясалган тескари боғланишли S схема қуйидаги характеристикага эга бўлган автоматни ифодалайди: $v = 1$; ϕ^0 бошлангич ҳолат $t = 0$ моментидаги S схема элементлари чиқишиларидағи сигналлари; Ω – ҳамма мумкин бўлган элементлар чиқишиларидағи сигналлар мажмуди.

Шундай қилиб, $v = 1$ ушлаб туриш вақтига эга бўлган чекли автоматни бир тактли функционал элементлардан ясалган тескари боғланишли схема орқали ифодалаш мумкин.

5- §. Мили ва Мур автоматлари

- Чекли автомат модели. Автомат ишининг каноник тенгламаси. Инициал ва ноинициал автоматлар. Мили ва Мур автоматлари, улар орасидаги муносабатлар.

Чекли хотирали дискрет қурилмалар чекли автомат модели бўлади. Бу автоматнинг n та x_1, x_2, \dots, x_n кириши, m та y_1, y_2, \dots, y_m чиқиши ва $Q = \{g_0, g_1, \dots, g_{r-1}\}$ чекли ички ҳолати мавжуд.

Чекли автомат дискрет вақт $t = 0, 1, 2, \dots$ моментларида ишлайди. Агар t моментдаги x_i киришнинг, y_j чиқишининг ва g ҳолатининг қийматларини мос равища $x_i(t), y_j(t)$ ва $g(t)$ билан белгиласак, у ҳолда автоматнинг иши қуйидаги каноник тенглама билан ифодаланади:

$$\begin{aligned} y_j(t) &= \Phi_j(x_1(t), \dots, x_n(t), g(t-1)), \quad (j = 1, \dots, m), \\ g(t) &= \psi(x_1(t), \dots, x_n(t), g(t-1)). \end{aligned} \quad (1)$$

(1) тенгламалардаги Φ_j ва ψ функциялар мос равища j чиқишининг функцияси ва ўтишлар функцияси деб аталади. Автоматнинг иш жараёнини аниқлаш учун унинг бошланғич $g(0)$ ҳолатини кўрсатиш керак.

Агар $g(0)$ ва 1- моментдаги кириш қийматлари $x_1(1), x_2(1), \dots, x_n(1)$ маълум бўлса, у ҳолда (1) каноник тенгламадан фойдаланиб 1- моментдаги чиқиш $y_j(1)$ ва $g(1)$ ҳолатнинг қийматини, $g(1)$ ва $x_1(2), \dots, x_n(2)$ асосида 2- моментдаги чиқиш $y_j(2)$ ва $g(2)$ ҳолатларни аниқлаш мумкин ва ҳ.к. Икки турдаги автоматлар мавжуд: *инициал* ва *инициал-мас* (ноинициал). Инициал автоматларда бошланғич ҳолат тайинланган (маҳкамланган) бўлади. Ноинициал автоматларда бошланғич ҳолат сифатида исталган ҳолатни олиш мумкин.

Ихтиёрий сондаги кириш ва чиқишга эга бўлган автомат ишини аниқлаш масаласи 1 та кириш ва 1 та чиқишга эга бўлган автоматнинг ишини аниқлаш масаласига келтирилади. Шунинг учун асосий модель сифатида 1 та x киришга ва 1 та y чиқишга эга бўлган автоматларни кўрамиз. Бундай автоматлар қуйидаги каноник тенглама билан ифодаланади:

$$y(t) = \Phi(x(t), g(t-1)), \quad g(t) = \psi(x(t), g(t-1)).$$

Бундай турдаги автомат *Мили автомати* деб аталади.

Мили автомати чекли хотирали дискрет қурилманинг ягона модели эмас. Иккинчи модель – *Мур автомати* мавжуд. Мур автоматида чиқиш қиймати ўша моментнинг ўзидаётк ички ҳолатнинг қиймати билан аниқланади. Мур автоматининг каноник тенгламаси күйидаги күринишида бўлади:

$$g(t) = \psi(x(t), g(t-1)), \quad y(t) = \lambda(g(t-1)).$$

Агар биринчи тенгламадан иккинчисига $g(t)$ қийматини кўйсак ва $\Phi = \lambda(\psi)$ деб белгиласак, у ҳолда иккинчи тенглама күйидаги күринишига келади:

$$y(t) = \lambda(\psi(x(t), g(t-1))) = \Phi(x(t), g(t-1)).$$

Демак, Мур автоматини Мили автоматининг хусусий ҳоли деб қараш мумкин. Бу ерда ўтиш функцияси маҳсус $\Phi = \lambda(\psi)$ күринишида бўлади. Худди шу каби, Мили автоматини ҳам (айрим маънода) Мур автоматига келтириш мумкин.

Демак, ҳар қандай инициал ва ноинициал *Мили автоматлари* учун уларга эквивалент бўлган инициал ва ноинициал *Мур автоматлари* мавжуд (исботи А.А.Шоломовнинг «Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств» [49] китобида мавжуд).



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Ҳар қандай тескари боғланиши бўлмаган автоматни функционал элементлардан ясалган бирор схема орқали ифодалаш мумкинлигини исботланг.
2. Ҳар қандай инициал ва ноинициал Мили автоматлари учун уларга эквивалент бўлган инициал ва ноинициал Мур автоматлари мавжуд эканлигини исботланг.
3. Ҳар қандай ишлаб туриш вақти $v = 1$ бўлган чекли автоматни бир тактли функционал элементлардан ясалган схема орқали ифодаланишини кўрсатинг.



Мустақил ишлаш учун савол ва толшириқлар


1. Элементнинг юқори ва қуи индекси. Тұғри схема.
2. Тескари боғланиши бүлмаган автоматлар.
3. Характеристик функция. Күчсиз автоматли түлиқ система.
4. Тескари боғланиши бүлганса функционал элементлардан схемалар ясаш.
5. Чекли автомат ҳақида умумий түшүнчалар.
6. Мили ва Мур автоматлари ва улар орасидаги муносабатлар.
7. Автомат ишининг каноник тенгламаси. Инициал ва ноинициал автоматлар.

6- §. Реле-контактлы схемалар

- Үтказгичлар. Реле-контактлы схемалар. Манфий контактлы реле. Мусбат контактлы реле. Ушлаб туриш элементтер. Реле-контактлы схема орқали функцияни реализация этиши.*


Бу параграфда мантиқ алгебраси функцияларини реле - контактлы схемалар орқали реализация этиш усулини күрамиз.

Агар ҳар бир үтказгичга x ўзгарувчини мос қилиб қойсак, у ҳолда $x = 1$ да үтказгичда ток бор ва $x = 0$ да үтказгичда ток йўқ деб ҳисоблаймиз. У ҳолда үтказгичларни кетма-кет уланишига ўзгарувчиларнинг конъюнкцияси (VII.18-а шакл) ва параллел уланишига дизъюнкцияси (b) мос келади (VII.18-б шакл). Үтказгичларни кетма-кет ва параллел улаш натижага



VII.18- шакл.

Сида схема ҳосил қиласыз. Бу схема фақаттана монотон функцияларни реализация қиласы, чунки конъюнкция ва дизъюнкцияларнинг суперпозицияси орқали фақат монотон функцияларни ифодалаш мүмкін. Ихтиёрий функцияларни реализация қилиш учун \bar{x} функцияни реализация қиласынан қорылма керак бўлади. Буни манфий контактли реле орқали реализация қилиш мүмкін. Бундай реленинг схемаси VII.19- шаклда тасвирланган. Агар A фалтак ўрамлари орқали ток ўтмаса ($x = 0$), у ҳолда пружина B контактни юқорига тортади ва занжир уланади (туташади). Натижада C чиқишида ток пайдо бўлади ($\bar{x} = 1$). Агар $x = 1$ бўлса ва A фалтак ўрами орқали ток ўтса, у ҳолда B контакт пастга тортилади ва C чиқишида ток бўлмайди, яъни $\bar{x} = 0$ бўлади. Демак, манфий контактли реле ϕ_2 функцияни реализация қиласы. Агар B контакт киришига 1 ўрнига у сигнал берсак, у ҳолда биз $\bar{x}y$ функцияни реализация қиласыз (VII.20- шакл).




VII.19- шакл.

VII.20- шакл.

Мусбат контактли реледа агар фалтак ўрамида ток бўлса ($x = 1$), у ҳолда B контакт уланади ва C чиқишида ток бўлмайди ($\bar{x} = 0$). Шундай қилиб, x функцияни мусбат контактли реле орқали реализация қилиш мүмкін (VII.21- шакл). Маълумки, агар ўтказгичда ток бўлса, у ҳолда у ҳар тарафга тарқалади. Масалан, $x \vee y$ ни VII.18- шаклдаги схема орқали реализация қиссан, у ҳолда $x = 1$ ва $y = 0$ бўлганда, ток A нуқтадан ҳар тарафга, шу жумладан, у ўтказгичга мос бўлган ўтказгич орқали ҳам ўтади ($y = 0$ бўлишига қарамасдан). Бундай шароитда схеманинг иш жараённида ноаниқ-



VII.21- шакл.






VII.22- шакл.

ликлар пайдо бўлади. Бу ҳолдан қутилиш учун фақат бир томонга ток ўтказадиган асбоблардан, шу жумладан, мусбат контактли реледан фойдаланиш мумкин. Масалан, мусбат контактли реледан фойдаланиб, $x \vee y$ ни реализация қилалигиган схемани VII.22- шаклда тасвирлангандек ясаш мумкин.

Энди реле-контактли схеманинг ишлаш вақтини кўриб ўтайлик. Ток ўтказгичлар бўйича бирданига тарқалади ва реле ишлаши учун (контакт уланиши учун) бир такт вақт кетади деб ҳисоблаймиз. Демак, VII.20 ва VII.21- шаклларда x сигналга нисбатан y сигнал бир тактдан кейин берилиши керак.

Схема чиқишидаги сигнал (xy ёки \bar{xy}) y сигнал билан бир вақтда пайдо бўлади. Шунинг учун схемада берилган сигналларни ишлаб чиқиш учун сарф бўладиган вақтни доимо ҳисобга олиш керак, реализация бўладиган функцияни ўзгартирмасдан, айрим вақтларда, бу вақтни ўзгартириш керак. Бу процедурани, худди бир тактли функционал элементлардан ясалган кўп тактли схемаларда қилганимиздек,



VII.23- шакл.

ушлаб туриш элементлари ёрдами билан бажариш мумкин. Ушлаб туриш элементи вазифасини мусбат контактли реле бажаради (VII.21- шакл). Ушлаб туриш вақти 1 тақтга тенг бўлади.

Таъриф. Агар реле-контактли схеманинг киришларига t моментда x_1, x_2, \dots, x_n сигналлар набори берилганда, унинг чиқишида $t + v$ моментда $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ сигнал пайдо бўлса, у ҳолда реле-контактли схема $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни v ушлаб туриш вақти билан реализация қиласи деб аталади.

Кетма-кет берилган сигналлар бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда ишлаб чиқилади.

Шундай қилиб, мантиқ алгебрасининг исталган функциясини айрим ушлаб туриш вақти билан реле-контактли схема орқали реализация қилиш мумкин. (Ушбу холосани исбот қилишни ўқувчига ҳавола этамиз).


Мисол. а) $xy \vee \bar{z}$; б) $\bar{x}y \vee z\bar{t}$; в) $xy \vee ux \vee xz$ функциялар реле-контактли схема орқали реализация қилинсин.

Берилган функцияларни схема орқали реализация қилиш учун ўтказгичларни кетма-кет ва параллел улашлар натижасида элементтар конъюнкцияларни ва уларнинг дизъюнкцияларини реализация қиласимиз. Манфий контактли реледан фойдаланиб ўзгарувчиларнинг ва айрим элементтар конъюнкцияларнинг инкорларини реализация қиласимиз. Мусбат контактли реле орқали сигналларнинг бир вақтда етиб келишини таъминлаймиз. Натижада, VII.23- шаклда кўрсатилган схемаларга эга бўламиз.

7- §. Контактли схемалар ва уларнинг синтези

- Автоматнинг кириши. Автоматнинг чиқиши. Контактларни параллел ва кетма-кет улаш. Ўтказувчанлик функцияси. Муҳим занжир. П- схема.

Ҳар бир автомат турлича контактли ёки контакtsиз схемалардан фойдаланиш асосида тузилади. Биз контактли схемалар билан жиҳозланган автоматларнинг ишини умумий ҳолда кўриб ўтамиз.



VII.24- шакл.


Масалан, VII.24- шаклда күрсатилганидек, симлардан, иккита T_1 ва T_2 күтбдан, бешта P_1, \dots, P_5 кнопка билан таъминланган контактлардан ясалган тузилма *контактли схема* деб аталади. T_1 күтб электр токи манбайни ифодалайди, T_2 күтб эса автоматнинг «чиқиши»да ишни бажарувчи қурилмани билдиради. Автоматнинг «чиқиши»да иш бажарилғанлыги ҳақида хабар берувчи контрол лампа ўрнатиш мүмкинлигидан, T_2 күтб мана шу лампани тасвирлайди деб айта оламиз.

Схемада кнопкалар тегишли равища да ёқилса ва, демак, схема бўйича ток юрадиган бўлиб контактлар тикланса, T_1 күтбдан T_2 күтбга борган ток контрол лампочкани ёндиради.

Энди ҳар бир мураккаб контактли схеманинг таркибий қисмларини ташкил этувчи энг содда контактли схемалар билан танишамиз.

VII.25- шаклдаги схема битта симдан, T_1 ва T_2 күтблардан ва P кнопкали битта контактдан ясалган.

P кнопкa ёқилганда, контакт тикланиб, ток схема бўйича T_1 дан T_2 га томон юради ва контрол лампа ёнади. P кнопкa очиқ бўлганда контакт узилиб, ток бўлмайди ва лампа ёнмайди. P кнопкага x – « P кнопкa ёпиқ» деган мулоҳазани мос келтирамиз. P кнопкa ҳақиқатан ёпиқ бўлса, x мулоҳаза чин бўлади. Бу ҳолда контрол лампа ёнади. P кнопкa очиқ бўлганда эса x мулоҳаза ёлғон бўлади ва бу ҳолда контрол лампа ёнмайди.




VII.25- шакл.

Шундай қилиб, x муроҷазанинг чин-ёлғонлиги билан ток бор-йўқлиги (контрол лампанинг ёниш-ёнмаслиги) орасида ўзаро бир қийматли мослик ўрнатилади ва буни ушбу жадвал ифодалайди:

x	схемада ток
ч	бор
ё	йўқ

Энди кетма-кет уланган иккита P ва Q кнопкага (икки кетма-кет контактли) схемани олайлик (VII.26- шакл).




VII.26- шакл.

P ва Q кнопкаларга мос равишда x – « P кнопка ёпиқ» ва y – « Q кнопка ёпиқ» деган муроҷазаларни мос келтирамиз. У ҳолда

x	y	Схемада ток	$x \wedge y$
1	1	бор	1
1	0	йўқ	0
0	1	йўқ	0
0	0	йўқ	0

Демак, схемада ток бор-йўқлиги ($x \wedge y$) конъюнкциянг чин-ёлғонлигига мос келади.

Параллел уланган икки P ва Q кнопкали схемага мурожаат қиласиз (VII.27- шакл).



x	y	Схемада ток	$x \vee y$
1	1	бор	1
1	0	бор	0
0	1	бор	0
0	0	йўқ	0

Демак, параллел уланган икки P ва Q контактли схемада ток бор-йўқлиги ($x \vee y$) дизъюнкциянинг чин-ёлғонлиги билан аниқланади.

VII.26 ва VII.27- шаклларда берилган схемаларни умумлаштириб, n та P_1, \dots, P_n кнопкани кетма-кет ва, шунингдек, параллел улаш мумкин. Бунинг натижасида n та кетма-кет ва n та параллел контактли схемалар ясалган бўлади. Улар мос равишда $(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)$ ва $(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n)$ функцияларни реализация қиласи, бу ерда x_i мулоҳаза P_i кнопка ёпиқ эканлигини билдиради.

Шундай жуфт-жуфт кнопкалар билан таъминланган контактли схемаларни ҳам ясаш мумкинки, ҳар жуфт кнопканинг исталган бири ёпилганда (очилганда), иккинчиси очилади (ёпилади). Бир жуфт кнопкa \bar{P} ва P каби белтиланади. P кнопкага x мулоҳаза мос келганда, \bar{P} га x нинг \bar{x} инкорини мос келтириш табиийдир, чунки P – ёпиқ, демак, x чин бўлганда, \bar{P} – очик, демак, \bar{x} – ёлғон бўлади.

Бир жуфт кнопкали энг содда схемалардан биттаси қуйидагичадир (VII.28- шакл).




VII.28- шакл.

Кнопкаларнинг биттаси очилганда иккинчиси албатта ёпилгани учун бундай схемада ток ҳеч қачон бўлмайди. VII.28- шаклдаги схема жадвали қуидагича бўлади:

x	\bar{x}	Схемада ток	$x \wedge \bar{x}$
1	0	йўқ	0
0	1	йўқ	0

Бир жуфт кнопкали схемаларнинг иккинчиси қуидагича бўлади (VII.29- шакл):




VII.29- шакл.

Бу схемада ток ҳар доим бор, чунки P ёпиқ бўлса (у ҳолда \bar{P} очиқ бўлади), ток юқори симдан P орқали ўтади. Схема жадвали қуидагича бўлади:

x	\bar{x}	Схемада ток	$x \vee \bar{x}$
1	0	бор	1
0	1	бор	1

Шундай қилиб, ҳар бир содда контактли схема мулоҳазалар алгебрасининг маълум бир функциясини реализация қиласди. Бу функция контактли схеманинг ўтказувчанлик функцияси деб аталади. Биз кўриб ўтган энг содда схемаларнинг ўтказувчанлик функциялари қуидагича бўлади:

$$x, x \wedge y, x \vee y, x \wedge \bar{x}, x \vee \bar{x}. \quad (1)$$



VII.30- шакл.

Бу функцияларнинг чинлик жадваллари тегишли схемаларда қачон ток бўлиши ва қачон бўлмаслигини кўрсатади.

Содда схемаларнинг турли комбинацияларидан ҳар хил мураккаб контактли схемаларни тузиш мумкин. Бундай схемаларнинг ҳар бирига (1) функцияларнинг суперпозициясидан ҳосил қилинган функциялар мос келади.

Масалан, VII.30- шаклдаги схеманинг ўтказувчанлик функциясини топайлик. Аввало, P , Q , R кнопкаларга мос равища x , y , z мулоҳазаларни мос келтирамиз. У ҳолда \bar{P} , \bar{Q} , \bar{R} га \bar{x} , \bar{y} , \bar{z} мулоҳазалар мос келади. Схеманинг юқори қисми $\bar{x} \wedge [(y \wedge \bar{z}) \vee x]$ формула билан, пастки қисми $z \wedge \bar{y} \wedge [x \vee \bar{y}]$ формула билан ифодаланади. Юқори ва пастки қисмлар параллел улангани учун бутун схеманинг ўтказувчанлик функцияси куйидагича бўлади:


$$f(x, y, z) = \{\bar{x} \wedge [(y \wedge \bar{z}) \vee x]\} \vee [z \wedge \bar{y} \wedge (x \vee \bar{y})].$$

Аксинча, мулоҳазалар алгебрасининг ҳар бир функциясига бирор контактли схема мос келади. Масалан,

$$f(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (\bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \quad (2)$$

функция ва x , y , z ўзгарувчиларга мос келадиган P_1 , P_2 , P_3 кнопкалар берилган бўлсин. У ҳолда (2) функцияга VII.31-шаклдаги контактли схема мос келади.


Бундан кейин, схемаларнинг кўриниши оддий бўлиши учун, контактни икки қутбга эга бўлган кесма орқали ифодалаймиз (кесманни икки қутбли деб атаемиз). Агар кесма уланувчи бўлса, уни x билан, ажратувчи бўлса, \bar{x} билан белгилаймиз. Бу ерда x – фалтақда реализация қилинадиган



VII.31- шакл.

ўзгарувчи. Ҳар бир ғалтакка битта ўзгарувчи мос келади ва у билан исталганча сондаги контактлар уланиши мумкин. Кесмалар қутблари орқали бир-бирлари билан уланади. Ҳар бир схема кириш ва чиқишига эга бўлади. Схеманинг киришига ток берилганда, унинг чиқишида бир тақтдан кейин ток пайдо бўлса, у ҳолда схемада ўтказувчаник бор деб айтилади, акс ҳолда, ўтказувчаник йўқ деб айтилади.

Кесмаларнинг VII.32- шаклдагидек кетма-кет уланишини занжир деб атаемиз.



VII.32- шакл.

Занжирда битта контакт бир неча марта қатнашиши мумкин. Биринчи контактнинг кириши схеманинг киришига ва охирги контактнинг чиқиши схеманинг чиқишига тўғри келади. Ўзгарувчиларнинг бирор қийматлари мажмууда схеманинг (ДНШ кўринишидаги функцияни реализация қиласиган схеманинг) чиқишида ток бўлиши учун ҳеч бўлмагандан бирорта занжирнинг ҳамма контактлари уланган бўлиши етарли ва зарурдир. Агар схемага кирувчи ҳар бир Γ занжирга ўзгарувчиларнинг ёки улар инкорларининг U , элементар конъюнкциясини мос қилиб кўйсак, у вақтда схемага кирувчи занжирларга мос келган Γ элементар конъюнкцияларнинг дизъюнкциясига схеманинг ўтказувчаник функцияси мос келади.

Шуни таъкидлаш керакки, схеманинг ўтказувчанлик функциясини ҳосил қилиш учун айрим занжирларнинг дизъюнкциясини олиш кифоядир.

1-таъриф. Ҳар бир қутбдан бир марта ўтган занжир мұхым (жиддий) занжир деб аталади (яғни схеманинг кириши ва чиқишига биттадан контакт да занжирнинг қолган қутбларига иккитадан контакт түрі келадиган занжир мұхым занжир деб аталади).

Мисоллар. 1. Ҳар бир схемада чекли сондаги мұхым занжирлар мавжуд бўлишини исбот қилинг.


2. Мұхим занжирларга мос келувчи конъюнкцияларнинг дизъюнкцияси схеманинг ўтказувчанлик функциясига teng кучли эканлигини исбот қилинг.

2- мисолнинг натижасига асосан, схемага қараб унинг ўтказувчанлик функциясини ёзиш мумкин.


VII.33- шаклда берилган схемаларнинг ўтказувчанлик функцияларини топайлик. Бундан кейин рангсиз доирача билан схеманинг кириши ва қора рангли доирача билан схеманинг чиқиши белгиланади. Ушбу формулалар

- $xyt \vee tyt \vee xz \vee tz \vee \bar{y}\bar{x}t \vee \bar{y}\bar{x}yz = yt \vee xz \vee tz \vee \bar{y}\bar{x}t ;$
- $xy\bar{x} \vee x\bar{x}\bar{t} \vee xy\bar{t}\bar{x} \vee xt\bar{y}\bar{x} \vee x\bar{y}\bar{x} \vee x\bar{t}\bar{x} \vee x\bar{t}\bar{y}\bar{x} \vee xy\bar{t}\bar{x} = 0 ;$
- $xy \vee tu \vee xzu \vee tzy$

VII.33- шаклнинг мос равишда а), б) ва в) бандларида кўрсастилган схемаларнинг ўтказувчанлик функциялари бўлади.



VII.33- шакл.




VII.34- шакл.

Энди тескари масалани кўрайлик, яъни берилган функцияга қараб уни реализация қиласидаги схемани ясаш масаласини кўрамиз. Бунинг учун функцияни ДНШ кўринишига келтирамиз. ДНШ ифодасидаги ҳар бир $x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} x_3^{\sigma_3} \dots x_k^{\sigma_k}$ элементар конъюнкцияга мос равиша битта кетма-кет уланган контактларни мос қўямиз (VII.32- шаклга қаранг). Бундан кейин ҳамма киришларни ва чиқишларни мос равиша айнан туташтирамиз. Ҳосил қилинган схема ДНШ кўринишидаги функцияни реализация қиласади.


Берилган: а) $(y \vee z) \rightarrow x\bar{y}$; б) $z\bar{y} \leftrightarrow xy$ ва в) $(x + y + z)$ функцияларни контактли схемалар орқали реализация қиласайдик. Бунинг учун функцияларни ДНШ кўринишига келтирамиз:

- а) $(y \vee z) \rightarrow x\bar{y} = \overline{y \vee z} \vee x\bar{y} = \bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}$ (VII.34-а шакл);
 б) $z\bar{y} \leftrightarrow xy = (\bar{z}\bar{y} \vee yx)(z\bar{y} \vee \bar{yx}) = (\bar{z} \vee y \vee yx)(z\bar{y} \vee \bar{y} \vee x) =$
 $= (\bar{z} \vee y)(\bar{y} \vee \bar{x}) = \bar{z}\bar{y} \vee \bar{z}\bar{x} \vee y\bar{x}$ (VII.34-б шакл);
 в) $x + y + z = xyz \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}yz$ (VII.34-в шакл).

Биз юқорида ДНШ кўринишидаги функцияни контактли схема орқали реализация этишни кўрдик. Табийки, КНШ кўринишидаги функцияни ҳам контактли схема ор-



VII.35- шакл.



VII.36- шакл.

қали реализация этиш мүмкін. Бунинг учун, бириңчи навбатда, ҳар бир элементар дизъюнкцияларни реализация қилаған схемалар тузамиз (VII.35- шакл). Иккінчі навбатда, элементар дизъюнкцияларга мос келганд схемаларнинг биттасининг чиқишини иккінчисининг киришига, иккінчи сининг чиқишини учинчисининг киришига ва ҳоказо улаб чиқамиз (VII.36- шакл). Бириңчисининг кириши контактлы схеманиң кириши ва охиргисининг чиқиши схеманиң чиқиши бўлади. Ҳосил қилинган схема КНШ кўринишдаги функцияни реализация қиласди.

Юқорида келтирилган алгоритмдан фойдаланиб, а) $(y \vee z) \rightarrow x\bar{y}$; б) $\bar{z}\bar{y} \leftrightarrow xy$ ва в) $(x + y + z)$ функцияларни контактли схемалар орқали реализация этиш талаб этилсин.


а) $f_1(x, y, z) = (y \vee z) \rightarrow x\bar{y}$ функцияни КНШ кўринишига келтирамиз ва уни содлаштириш учун таниш бўлган ушбу

$$\begin{array}{ll} x \vee xy = x, & x(x \vee y) = x, \\ x \vee \bar{x}y = x \vee y, & \bar{x} \vee xy = \bar{x} \vee y, \\ x(\bar{x} \vee y) = xy, & \bar{x}(x \vee y) = \bar{x}y \end{array}$$

тент кучли формулалардан фойдаланамиз:

$$f_1(x, y, z) = \overline{y \vee z} \vee x\bar{y} = \bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y} = \bar{y}(\bar{z} \vee x) \quad (\text{VII.37-}a \text{ шакл});$$

$$\begin{aligned} \text{б)} \quad f_2(x, y, z) &= \bar{z}\bar{y} \leftrightarrow yx = (\bar{z}\bar{y} \vee yx)(\bar{y}x \vee \bar{z}\bar{y}) = \\ &= (\bar{z} \vee y \vee yx)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}\bar{y}) = (\bar{z} \vee y)(\bar{x} \vee \bar{y}) \quad (\text{VII.37-}b \text{ шакл}); \end{aligned}$$



VII.37- шакл.

в) $f_3 = x + y + z = (x \vee y \vee z)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (x \vee \bar{y} \vee \bar{z})$
 (VII.37-в шакл).

Параллел-кетма-кет улаш натижасида ҳосил этилган схемалар классини индуктив тарзда ифодалайлик.


2-таъриф. Бир контактдан иборат схема элементар схема деб аталади. Элементар схемаларнинг айримларини чекли сон марта параллел ва кетма-кет улаш натижасида ҳосил бўлган контакт схема **параллел-кетма-кет схема ёки П-схема** деб аталади.

Равшанки, элементар схемалардан ҳар қандай усул билан ясалган П-схемага дизъюнкция, конъюнкция ва инкорамаллари билан ифодаланган ўтказувчанлик функцияси мос келади ва, аксинча, ҳар қандай шундай функция учун маълум П-схема ясаш мумкин.

Изоҳ. Ҳар қандай контактли схема П-схема бўла олмайди.


Мисол. Берилган $f_1(x, y, z, t) = (x \vee y\bar{z})(xy \vee zt)$ ва $f_2(x, y, z, t) = (\bar{x}(y \vee \bar{z}) \vee \bar{t})x$ функциялар учун П-схемалар ясаш талаб этилсин.

а) x, y, z, t, \bar{z} ни реализация қиласидиган элементар схемаларни тузамиз (VII.38- шакл).




VII.38- шакл.

x ва y ўзгарувчиларга мос бўлган контактлар икки донадан бўлиши керак. Энди контактларни кетма-кет улаб, $y\bar{z}$, xy ва zt элементар конъюнкцияларни реализация қиласиз (VII.39- шакл).




VII.39- шакл.

Учинчи қадамда, параллел улашдан фойдаланиб, $x \vee y\bar{z}$ ва $xy \vee zt$ функцияларни реализация қиласиз (VII.40- шакл).




VII.40- шакл.

Ҳосил қилинган схемаларни кетма-кет улаб, берилган $f_1(x, y, z, t) = (x \vee y\bar{z})(xy \vee zt)$ функцияни реализация эта-диган П-схемага эга бўламиз (VII.41- шакл).



VII.41- шакл.

б) $f_2(x, y, z, t) = (\bar{x}(y \vee \bar{z}) \vee \bar{t})x$ функцияни реализация қылладиган П-схема VII.42- шаклда күрсатилған.



VII.42- шакл.

8- §. Контакт схемаларни минималлаштириш мүаммоси

- Минимал схема.** Схемаларни минималлаштириш мүаммоси.
Минимал схема бўлишилик шарти. Шенон функцияси.
Контактлар сонини баҳолаш.

Маълумки, битта функцияниң ўзини ҳар хил контактли схемалар орқали реализация қилиш мумкин, чунки функцияниң ДНШ (КНШ) кўриниши ятона эмас. Функцияни контактли схема орқали реализация этишда, табиийки, схемада мавжуд бўлган контактлар сони мумкин бўлгунча энг кам бўлишига ёки, ҳеч бўлмагандага, шу энг кам сондан салгина ортикроқ бўлишига интиламиз. Битта ўтказувчанлик функциясига эга бўлган ҳамма схемалар ичida мумкин бўлгунча энг кам сонли контактга эга бўлган схемани **минимал схема** деб айтиласи.

Мантиқ алгебраси функцияларини минимал схемалар орқали реализация этиш муаммосини ечиш жуда катта илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган долзарб муаммодир. Афуски, аниқ схемаларнинг минимал схема эканлигини исботлаш айрим ҳоллардагина мумкин.

Схемаларни минималлаштириш муаммоси мантиқ алгебраси функцияларини минималлаштириш муаммоси билан чамбарчас боғлангандир.

Айрим ҳолларда берилган схеманинг минимал схема эканлигини кўрсатадиган хусусиятларни топиш мумкин. Буни мисолларда кўрайлик.


Агар бирорта ўзгарувчи функциянинг соxта эмас (муҳим) аргументи бўлса, у ҳолда ушбу функцияни реализация этадиган схемада камида ўша ўзгарувчига мос келадиган бир дона контакт мавжуд бўлиши керак. «Кўприкча» реализация этадиган ўтказувчанлик функцияси $f(x, y, z, u, t) = xy \vee tu \vee xzu \vee tzu$ бўлади. Бу функциянинг ҳамма x, y, z, t, u аргументлари муҳим аргументлардир (масалан, $t = z = u = 0$, $y = 1$ бўлганда, функциянинг қиймати x га боғлиқ бўлади; $x = u = 1$ бўлганда функциянинг қиймати z га боғлиқ бўлади ва ҳоказо). Схемада бу аргументларга мос келган контактлар бир мартадан қатнашган. Демак, «кўприкча» схемаси минимал схемадир.

Шундай қилиб, агар схемадаги контактлар ҳар хил ўзгарувчиларга мос келса ва бу ўзгарувчилар ўтказувчанлик функциясининг муҳим аргументлари бўлса, у ҳолда схема минимал схема бўлади.

Энди VII.43- шаклда ифодаланган схема минимал схема бўлишини кўрсатайлик.

Берилган бу ихтиёрий схемада x_1 ўзгарувчига мос бўлган контактлар фақат мусбат бўлсин. У ҳолда $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ўтказувчанлик функцияси учун

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq f(0, x_2, \dots, x_n)$$



VII.43- шакл.

муносабат ҳамма x_2, \dots, x_n учун бажарилади (агар схемада айрим контактлар уланган бўлса, у ҳолда схемада ўтказувчанлик йўқолмайди). Худди шу каби, агар x_1 га фақатгина манфий контактли контактлар мос келса, у ҳолда

$$f(1, x_2, \dots, x_n) \leq f(0, x_2, \dots, x_n)$$


муносабат ҳамма x_2, x_3, \dots, x_n учун бажарилади.

Шундай сигнallлар мажмуи $(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$ мавжуд бўлсинки, $f(1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) < f(0, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ бажарилсинг. У ҳолда f функция x_1 аргументи бўйича ўсмайди ва f функцияни реализация қиласиган ҳар қандай схемада x_1 га мос бўлган манфий контакт бор деб айтамиз.

Худди шу каби, $(\beta_2, \dots, \beta_n)$ мажмуа учун

$$f(1, \beta_2, \dots, \beta_n) > f(0, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

бажарилса, у ҳолда f функция x_1 аргументи бўйича камаймайди ва f ни реализация қиласиган схемада x_1 га мос мусбат контакт бор деб айтамиз. Агарда f функция x_1 аргументи бўйича на камаювчи ва на ўсувчи функция бўлса, у ҳолда f функцияни реализация қилувчи схемада x_1 аргумент бўйича ҳам манфий, ҳам мусбат контактлар мавжуд бўлади. VII.44- шаклдаги схеманинг ўтказувчанлик функциясининг $f = x_1 x_2 \dots x_n \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \dots \bar{x}_n$ кўриниши бўлади. $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_n = 0$ да f функция x_1 аргументи бўйича ортувчи бўлмайди ва $\beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_n = 1$ да камаювчи бўлмайди. Кўрилаётган функция ҳамма аргументларига нисбатан симметрик бўлгани учун, қолган ҳамма аргументлари бўйича ҳам ўсувчи ва кама-



VII.44- шакл.

ювчи функция бўлмайди. Кўрилаётган схемада ҳар бир ўзгарувчига мусбат ва манфий контакт тўгри келгани учун бу схема минимал схема бўлади.

Демак, агар схемада ҳар бир ўзгарувчига биттадан мусбат ва манфий контакт мос келиб, функцияниң ҳамма аргументлари муҳим аргументлар бўлса ва бу ўзгарувчилар бўйича функция ўсувчи ҳам, камаювчи ҳам бўлмаса, у ҳолда схема минимал схема бўлади.

$f = x_1 x_2 \dots x_n \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \dots \bar{x}_n$ функцияни реализация қиласидаган VII.44- шаклдаги схемадан фарқ қиласидаган минимал схема тузиш талаб этилсин. Бунинг учун f функцияни

$$f = (x_1 \vee \bar{x}_2)(x_2 \vee \bar{x}_3)(x_3 \vee \bar{x}_4) \dots (x_{n-1} \vee \bar{x}_n)(x_n \vee \bar{x}_1)$$

кўринишдаги КНШга келтирамиз ва уни реализация қиласидаган схема минимал бўлади (VII.44- шакл).

Демак, битта функцияни ҳар хил минимал схемалар орқали реализация қилиш мумкин экан, яъни минимал схема ягона эмас.

П-схемалар тўпламида (классида) ҳам минимал схемалар мавжуд бўлади. Минимал П-схема ҳамма схемалар классида ҳам минимал схема бўла оладими ёки йўқми деган савол туғилди.

«Кўприкча» минимал схемаси орқали реализация қилинган $f = xy \vee tu \vee xzu \vee tzy$ функция учун 5 контактли П-схема мавжуд эмаслиги кўйилган саволга жавоб беради.

$f(x_1, \dots, x_n)$ мантиқ алгебрасининг функцияси бўлсин. $L(f)$ орқали уни реализация қиласидаган минимал схемадаги

контактлар сонини ва $L_n(f)$ орқали П-схемадаги контактлар сонини белгилаймиз. У ҳолда

$$L(f) \leq L_n(f)$$

бўлади. $\max L(f) = L(n)$ ва $\max L_n(f) = L_n(n)$ лар Шенон функциялари деб аталади. n аргументли $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни схема орқали реализация қилиш учун зарур бўлган максимал ва минимал контактлар сонини топиш масаласи катта амалий аҳамиятта эга эканлиги ҳаммамизга майдум. Илмий изланишлар ҳозирги вақтда қуйидаги баҳони беради:


$$\frac{2^n}{n} < L(n) \leq 3 \cdot 2^{n-1} - 2.$$



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Қуйидаги функцияларни реализация қиласиган реле-контактли схемалар ясанг:
 - $x + y + z$;
 - $(x \rightarrow y) \leftrightarrow z$;
 - $(xy \vee \bar{z}) \rightarrow t$;
 - $x \rightarrow y \rightarrow z$;
 - $(x \vee y) \leftrightarrow z$;
 - $xz \rightarrow z$;
 - $(x \leftrightarrow y) \rightarrow z$;
 - $(x \leftrightarrow y) \leftrightarrow z$;
 - $(x \rightarrow y) \vee z$.
2. Ҳар бир схемада чекли сондаги муҳим занжирлар мавжуд бўлишини исбот қилинг.
3. Муҳим занжирларга мос келувчи конъюнкцияларнинг дизъюнкцияси схеманинг ўтказувчанлик функциясига тенг кучли эканлигини исбот қилинг. Мисолнинг натижасига асосан, схемага қараб унинг ўтказувчанлик функциясини ёзинг.
4. Ҳар қандай контакт схема П-схема бўла олмаслигини исботланг.
5. 1) Қуйидаги функцияларни реализация қиласиган П-схемаларни топинг:
 - $f_1(x, y, z) = x \rightarrow y \rightarrow z$, $f_2(x, y, z) = x \leftrightarrow y \leftrightarrow z$,
 - $f_3(x, y, z, t) = (xy \vee t) \leftrightarrow (\bar{x}y \rightarrow z)$,
 - $f_4(x, y, z, t) = (x \vee y \vee z)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee t)(xt \vee \bar{y}z)$.

2) VII.45- шаклда күрсатылған схема («күпприкча») П-схема бўла олмаслигини исботланг.



VII.45- шакл.

6. Агар қыйидагилар аниқ бўлса, у ҳолда тўрт талабадан қайси бири имтиҳон топширган:
 - 1) агар биринчى талаба имтиҳон топширган бўлса, у ҳолда иккинчиси ҳам топширган;
 - 2) агар иккинчи талаба имтиҳон топширган бўлса, у ҳолда учинчиси топширган ёки биринчиси топширмаган;
 - 3) агар тўртинчى талаба имтиҳон топширмаган бўлса, у ҳолда биринчиси топширган ва учинчиси топширмаган;
 - 4) агар тўртинчى талаба имтиҳон топширган бўлса, у ҳолда биринчиси ҳам топширган.
7. Тўртта дўст – Сафаров (*C*), Бекмуродов (*B*), Хўжаев (*X*), Азизов (*A*) меҳнат таътилларини тўрт шаҳарда – Тошкент, Бухоро, Самарқанд ва Фарғонада ўтказишга келишидилар. Қыйидаги чеклашлар мавжуд бўлган ҳолда улардан ҳар бирининг қайси шаҳарга боришини аниқланг:
 - 1) агар *C* Тошкентга бормаса, у ҳолда *X* Бухорога бормайди;
 - 2) Агар *B* Тошкентга ҳам, Фарғонага ҳам бормаса, у ҳолда *C* Тошкентга боради;
 - 3) агар *X* Фарғонага бормаса, у ҳолда *B* Самарқандга боради;
 - 4) агар *A* Тошкентга бормаса, у ҳолда *B* Тошкентга бормайди;

- 5) агар *A* Бухорога бормаса, у ҳолда *B* Тошкентга бормайди.
8. Терговчи бир вақтда уч гувоҳни – Донақул, Тошпўлат ва Қосимни сўроқ қилди. Уларнинг кўрсатмалари бир-бириникига қарама-қарши эди ва уларнинг ҳар бири кимнидир ёлғончиликда айбларди:
- 1) Донақул Тошпўлатни ёлғон кўрсатма беряпти деб айбларди;
 - 2) Тошпўлат Қосимни ёлғончи деб айбларди;
 - 3) Қосим терговчини Тошпўлатга ҳам, Донақулга ҳам ишонмасликка чақираарди.
- Аммо терговчи уларга бирорта ҳам савол бермасдан ким тўғри гапираётганини аниқлади. Гувоҳлардан қайси бири тўғри гапираётган эди?
9. «Уч талабадан қайси бири математик мантиқни ўқиган» деган саволга ушбу тўғри жавоб олинган: «Агар биринчиси ўқиган бўлса, у ҳолда учинчиси ҳам ўқиган, аммо, агар иккинчиси ўқиган бўлса, у ҳолда учинчиси ҳам ўқиган дегани нотўғри».
- Ким математик мантиқни ўқиган?



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Мусбат ва манфий контактли реле.
2. Реле-контактли схема орқали функцияни реализация қилиш.
3. Контактларни параллел ва кетма-кет улаш. Ўтказувчанлик функцияси.
4. Муҳим занжир ва П-схема ҳақида тушунчалар.
5. Контакт схемаларни минималлаштириш муаммоси. Минимал схема бўлишлик шарти.
6. Шенон функцияси. Контактлар сонини баҳолаш.

Мазкур бобда дискрет математикани математик кибернетикага татбиқи, яъни минимал дизъюнктив нормал шаклдаги функцияларни ясаш ва уларни ечиш йўллари кўрсатилган. Бу ерда дизъюнктив нормал шакл (ДНШ)ни соддлаштириш, энг қисқа ДНШ, қисқартирилган ДНШ, тупикили ДНШ, Квайн ДНШ ва минимал ДНШ ни ясаш алгоритмлари келтирилган. Аналитик ва геометрик тарздаги алгоритмларнинг эквивалентлиги кўрсатилган.

1- §. Масаланинг қўйилиши

- Элементар конъюнкциянинг ранги. Мулоҳазалар алгебраси функцияларини минималлаштириш муаммоси. Соддалик индекси ва унинг хусусиятлари. Минимал ДНШ. Энг қисқа ДНШ. Тривиал алгоритм. «Бирма-бир кўздан кечириш» алгоритми.

1-таъриф. Ушибу

$$K = x_{i_1}^{\sigma_1} \cdot x_{i_2}^{\sigma_2} \cdots x_{i_r}^{\sigma_r} \quad (\gamma \neq \mu \text{ да } i_\gamma \neq i_\mu) \quad (1)$$

ифода элементар конъюнкция деб аталади. r сон элементар конъюнкциянинг ранги дейилади. Константа 1 ни ранги 0 га тенг бўлган элементар конъюнкция деб биламиз.

2-таъриф. Ушибу

$$D = \bigvee_{i=1}^s K_i \quad (i=j \text{ да } K_i \neq K_j) \quad (2)$$

ифода дизъюнктив нормал шакл (ДНШ) деб аталади, бу ерда K_i – ранги i га тенг бўлган элементар конъюнкция.

Маълумки, D дизъюнктив нормал шакл мантиқ алгебрасининг маълум бир $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциясини реализация қиласиди. Мантиқ алгебрасининг ҳар қандай $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

($f \neq 0$) функциясини ДНШ қўринишига келтириш мумкинлигини, яъни

$$D = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (3)$$

ни II бобда таъкидлаган эдик.

Бундай ДНШ сифатида f функциянинг мукаммал дизъюнктив нормал шаклини (МДНШ) олиш мумкин, яъни

$$D = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = 1}} \cdot x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \dots x_n^{\sigma_n}. \quad (4)$$

1- мисол. $f(x_1, x_2, x_3)$ функция қўйидаги чинлик жадвали билан берилган бўлсин.

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$	x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	1

У ҳолда бу функцияни қўйидаги МДНШ қўринишида ифодалаш мумкин:

$$D_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3. \quad (5)$$

Иккинчи тарафдан, шу функциянинг ўзини

$$D_2 = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \quad (6)$$

ДНШ қўринишида ҳам ифодалаш мумкин (чинлик жадвали орқали аниқлашни ўқувчига ҳавола этамиз).

Ушбу мисол кўрсатяптики, мантиқ алгебрасининг битта функциясини бир нечта ДНШ қўринишида ифодалаш мумкин.

Агарда D_1 билан D_2 қўринишларини таққосласак, у ҳолда D_1 ифодасида 15 та ўзгарувчи символи ва 5 та элементар конъюнкция қатнашаётганлигини, D_2 ифодасида эса 3 та

ўзгарувчи символи ва 2 та элементар конъюнкция қатнаша-ётганигини күрамиз. Демак, D_2 формула ўзгарувчилар символи (элементар конъюнкциялар) сонига нисбатан D_1 га қара-ганды соддароқ формула ҳисобланади.

Агарда D_1 ва D_2 кўринишлардаги функцияни:

а) контактли схема орқали реализация қилсак, у ҳолда D_1 ни реализация қилиш учун 15 та контакт ва D_2 ни реализация қилиш учун 3 та контакт талаб этилади;

б) ноль тактли функционал элементлардан ясалган схема орқали реализация этсак, у ҳолда D_1 ни реализация қилиш учун 21 дона функционал элемент ва D_2 ни реализация қилиш учун 4 дона функционал элемент сарф бўлади;

в) бир тактли функционал элементлардан ясалган кўп тактли тўғри схема орқали реализация қилиш талаб этилса, у ҳолда D_1 ни реализация этиш учун 33 дона функционал элемент, шу жумладан, 12 дона ушлаб туриш элементи ва D_2 ни реализация қилиш учун 6 дона, шу жумладан, 2 дона ушлаб туриш элементи керак бўлади (бу мулоҳазаларнинг чинлигини исботлашни ўкувчига ҳавола этамиз).

Демак, D_1 ни реализация қиладиган схеманинг (қандай схема бўлишидан қатъи назар) таннархи D_2 ни реализация қиладиган схеманинг таннархидан анча қиммат (ортиқ) туради.

Шунинг учун ҳам мантиқ алгебраси функцияларини минималлаштириш муаммоси (халқ хўжалиги учун) катта амалий аҳамиятга эгадир. Бу масалани ҳал этиш учун ДНШ нинг «мураккаблигини» ифодаловчи $L(D)$ соддалик индексини киритамиз.

$L(D)$ функционал учун қуйидаги аксиомаларнинг бажарилишини талаб қиласиз.

I. Манфий эмаслиги ҳақидаги аксиома. Ҳар қандай ДНШ учун $L(D) \geq 0$.

II. Монотонлиги ҳақидаги аксиома (кўпайтмага нисбатан). Агар $D = D^1 \vee x_i^{a_i} K^1$ бўлса, у ҳолда

$$L(D) \geq L(D^1 \vee K^1). \quad (7)$$

III. Қавариқлиги ҳақидаги аксиома (кўшишга нисбатан).

Агар $D = D_1 \vee D_2$ ва $D_1 \wedge D_2 \equiv 0$ бўлса, у ҳолда

$$L(D) \geq L(D_1) + L(D_2). \quad (8)$$

IV. Инвариантлик ҳақидаги аксиома (изоморфизмга нисбатан). Агар R^l ДНШ R ДНШ дан ўзгарувчиларни қайта номлаш (айнан тенглаштиришсиз) усули билан ҳосил қилинган бўлса, у ҳолда

$$L(R^l) = L(R).$$

Дизъюнктив нормал шакллар учун мавжуд бўлган содалик индексларини келтирайлик.

1. $L_f(D)$ – берилган D дизъюнктив нормал шаклдаги ўзгарувчилар ҳарфларининг сони. Масалан, бизнинг мисолимиздаги D_1 ва D_2 учун $L_f(D_1) = 15$ ва $L_f(D_2) = 3$, яъни бу индексга нисбатан D_2 ДНШ D_1 ДНШ га қараганда соддароқдир.

2. $L_k(D)$ – берилган D дизъюнктив нормал шаклдаги элементар конъюнкциялар сони. D_1 ва D_2 учун $L_k(D_1) = 5$ ва $L_k(D_2) = 2$, яъни D_2 бу индексга нисбатан ҳам D_1 га қараганда соддароқдир.

3. $L_0(D)$ – берилган D дизъюнктив нормал шаклдаги инкор (\neg) символининг сони. D_1 ва D_2 лар учун $L_0(D_1) = 6$ ва $L_0(D_2) = 2$, демак, D_2 бу индекс учун ҳам D_1 га нисбатан соддароқ экан.

$L_f(D)$, $L_k(D)$ ва $L_0(D)$ индекслар юқорида келтирилган аксиомаларни қаноатлантиради.

Маълумки, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ўзгарувчилар тўпламидан 3^n та элементар конъюнкция тузиш мумкин («бўш» конъюнкцияга 1 константа мос қилиб қўйилган). Бундан ўз навбатида $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ тўплам элементларидан 2^{3^n} та дизъюнктив нормал шакл тузиш мумкинлиги келиб чиқади.

З-т аъриф. Агар $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияни реализация қилувчи ДНШ $L(D)$ индексга нисбатан минимал бўлса, у ҳолда бундай ДНШ L га нисбатан минимал ДНШ, L_k индексга нисбатан минимал бўлган ДНШ эса энг қисқа дизъюнктив нормал шакл деб аталади.

Бундан кейин L_b индексга нисбатан минимал бўлган ДНШ ни минимал дизъюнктив шакл деб атаемиз.

1- мисолни таҳдил қиласлийк.

1. $D_2 = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1$ ДНШ минимал ДНШ бўлади, чунки ушбу ДНШ орқали ифодаланган $f(x_1, x_2, x_3)$ функцияning x_1, x_2, x_3 аргументлари муҳим (сохта эмас) аргументлардир. Шунинг учун уни учтадан кам ҳарф билан ифодалаш мумкин эмас.

2. $D_2 = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1$ ДНШ энг қисқа ДНШ бўлади, чунки ушбу ДНШ билан ифодаланган $f(x_1, x_2, x_3)$ функция ҳар қандай элементар конъюнкциядан фарқ қўлади.

3. $D_2 = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1$ ДНШ L_0 индексга нисбатан минимал ДНШ бўлади, чунки ушбу ДНШ билан ифодаланган $f(x_1, x_2, x_3)$ функция x_2 ва x_3 ўзгарувчилари бўйича ўсуви функция эмас ва, демак, уни иккита инкордан кам инкор қатнашган ДНШ кўринишида ифодалаш мумкин.

Бизнинг бу бобдаги асосий вазифамиз, математик мантиқнинг ихтиёрий $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияси учун L индексга нисбатан минимал дизъюнктив нормал шаклни қандай усуллар ёрдами билан топишдан иборат бўлади. Бу муаммо математик мантиқ функцияларини минималлаштириш муаммоси деб аталади. Бу масала ечимининг *тривиал алгоритми* мавжудлигини кўрсатамиз.

1. $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ўзгарувчилар тўпламида ҳамма 2^n та $D_1, D_2, \dots, D_{2^{n-1}}$ дизъюнктив нормал шаклларни маълум тартибда тузамиз.

2. Кейин бу ДНШ лардан $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни реализация қиласлийк ДНШ ларни ажратиб оламиз.

3. Ажратиб олинган ДНШ лар соддалик индексларининг (L_b, L_k, L_0) миқдорларини ҳисоблаб чиқамиз.

4. Ҳисоблаб чиқилган индекслар миқдорларини бир-бира га таққослаш ўйли билан L га нисбатан минимал бўлган ДНШ ни топамиз.

Келтирилган алгоритмни амалий реализация қилиш учун жуда ҳам күп меңнат талаб этилади, чунки камида 2^{3^n} та кичик амални (операцияни) бажаришга түфри келади. Масалан, $n = 3$ бўлганда, $f(x_1, x_2, x_3)$ функцияни реализация қиладиган L индексга нисбатан минимал дизъюнктив нормал шаклларни топиш учун камида $2^{3^3} = 134\,217\,728$ та амалий бажаришга түфри келади. Шунинг учун $n \geq 3$ дан бошлаб бу алгоритмдан фойдаланиш мантиқка түфри келмайди, ундан фақатгина $n = 1$ ва $n = 2$ ҳоллар учун фойдаланиш мумкин.

Демак, «бирма-бир кўздан кечириш» алгоритми минимал дизъюнктив нормал шаклни топиш масаласида амалий ёрдам бермайдиган алгоритмдир. Шунинг учун мантиқ алгебраси функциясини минималлаштиришнинг бошқа усулларини излашга түфри келади.

2- §. Дизъюнктив нормал шаклни соддалаштириш ва тупикли ДНШ

- ДНШ ни соддалаштиришнинг икки хил йўли.** Элементар конъюнкцияни четлаштириш жараёни. Кўпайтuvчини четлаштириш жараёни. Тупикли ДНШ. Минимал ДНШга келтириш ҳақидаги теоремалар. Мисоллар.

D ихтиёрий ДНШ ва

$$D = D^1 \vee K, \quad D = D^1 \vee x_i^{\sigma_i} K^1 \quad (1)$$

бўлсин, бу ерда D^1 – бирор ДНШ, K – берилган D нинг бирор элементар конъюнкцияси, $x_i^{\sigma_i}$ – шу K нинг бирорта кўпайтuvчиси, K^1 эса K нинг қолган кўпайтuvчилари, $K = x_i^{\sigma_i} K^1$. ДНШ ни соддалаштиришнинг икки хил йўлини (типини) кўриб ўтайлик.

I. Элементар конъюнкцияни четлаштириш жараёни (операцияси). D ДНШдан D^1 ДНШ га ўтиш учун K элементар конъюнкцияни четлаштириш керак. Бундай ўзгартириш $D = D^1$ бўлганда ва фақат шундагина мумкин.

П. Күпайтувчини четлаштириш операцияси (жараёни). D ДНШ дан $D^1 \vee K^1$ ДНШ га ўтиш операцияси. Буни бажарыш учун K элементар конъюнкция ифодасидан $x_i^{\sigma_i}$ күпайтувчини четлаштириш керак. Бу алмаштириш $D = D^1 \vee K^1$ бўлганда аниқланган.

1-таъриф. I ва II алмаштиришлар йўллари билан содалаштириши мумкин бўлмаган D дизъюнктив нормал шакл (I ва II алмаштиришларга нисбатан) тупикили ДНШ (ТДНШ) деб аталади.

I-мисол. $D = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1$ ДНШ I ва II алмаштиришларга нисбатан тупикили ДНШ бўлади.

(1) ва монотонлик аксиомасига асосан $L(D^1) \leq L(D)$ ва $L(D^1 \vee K^1) \leq L(D)$ бўлади. Шунинг учун ТДНШ лар орасида ҳар доим минимал дизъюнктив нормал шакллар мавжуд бўлади.

Энди ДНШ ни юқорида келтирилган иккита алмаштириш асосида содалаштириш алгоритмини келтирамиз.

1. $f(x_1, x_2, x_3)$ функцияни ифодаловчи бирор ДНШ ни дастлабки ДНШ сифатида оламиз. Масалан, шундай ДНШ сифатида унинг мукаммал дизъюнктив нормал шаклини оламиз (чунки чинлик жадвали асосида уни формула орқали осонгина ёзиш мумкин).

2. Дастлабки дизъюнктив нормал шаклда қўшилувчиларни ва ҳар бир қўшилувчидағи күпайтувчиларни тартибга соламиз. Бу тартиблаш билан ДНШ кўриниши берилади.

3. Чапдан ўнгта қараб ДНШ кўриниши кўрилиб ўтилади. Навбатдаги K_i ($i = 1, 2, \dots, n$) элементар конъюнкцияяни нисбатан K элементар конъюнкцияни четлаштириш операцияси қўлланилади, агар бу мумкин бўлмаса, у ҳолда чапдан ўнгта қараб $K_i = x_{i_1}^{\sigma_{i_1}} x_{i_2}^{\sigma_{i_2}} \dots x_{i_r}^{\sigma_{i_r}}$ элементар конъюнкцияларнинг $x_{i_v}^{\sigma_{i_v}}$ ($v = 1, 2, \dots, r$) күпайтувчи ҳадлари кўриб чиқилиади ва уларга нисбатан мумкин бўлгунга қадар $x_{i_v}^{\sigma_{i_v}}$ күпайтувчини четлаштириш операцияси қўлланилади. Шундан сўнг кейинги элементар конъюнкцияяни ўтилади.

Охирги элементар конъюнкцияни ишлаб чиққандан кейин, ҳосил бўлган ДНШ ни яна қайтадан чапдан ўнгга қараб кўриб чиқилади ва элементар конъюнкцияни четлаштириш операцияси синаб кўрилади.

Натижада изланган дизъюнктив нормал шаклга эга бўламиз.

1-теорема. Соддалаштириши алгоритмини қўллаш натижасида ҳосил қилинган дизъюнктив нормал шакл (I ва II алмаштиришларга нисбатан) минимал ДНШ бўлади.

2- мисол. Куйидаги чинлик жадвалида берилган $f(x_1, x_2, x_3)$ функцияни кўриб чиқайлик.

1- жадвал

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$	x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1

$f(x_1, x_2, x_3)$ функция учун дастлабки ДНШ сифатида МДНШни оламиз ва икки тартиблашни ўтказамиз:

$$D^1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 ,$$

$$D^{11} = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_3 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_2 \bar{x}_1 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_3 x_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 .$$

D^1 тартибга солинган ДНШ учун алгоритмнинг ишланини кўрамиз.

1. $\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$ конъюнкцияни четлаштириш мумкин эмас, аммо \bar{x}_1 кўпайтувчини четлаштириш мумкин, чунки

$$\bar{x}_2 \bar{x}_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 .$$

Натижада $\bar{x}_2 \bar{x}_3$ конъюнкцияга эга бўламиз, ундан бирорта ҳам кўпайтувчини четлаштириш мумкин эмас.

2. $\bar{x}_1\bar{x}_2x_3$ конъюнкцияни ҳам четлаштириш мумкин эмас. Бу конъюнкциядан \bar{x}_1 күпайтувчини четлаштириш мумкин эмаслигини осонгина қўриш мумкин, лекин \bar{x}_2 күпайтувчига нисбатан уни четлаштириш операциясини кўллаш мумкин. \bar{x}_1x_3 конъюнкцияни ҳосил қиласиз. Кўпайтувчини четлаштириш операциясини ишлатиб, соддалаштириш мумкин эмас.

3. $\bar{x}_1x_2x_3$ конъюнкцияни четлаштириш мумкин, чунки

$$\bar{x}_1x_3 = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3.$$

4. $x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$ конъюнкцияни ҳам четлаштириш мумкин, чунки

$$\bar{x}_2\bar{x}_3 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3.$$

5. $x_1x_2\bar{x}_3$ конъюнкцияни четлаштириш мумкин эмас, бироқ x_2 кўпайтувчини ташлаб юбориш мумкин. Натижада $x_1\bar{x}_3$ конъюнкцияга эга бўламиз. Бу конъюнкцияга нисбатан кўпайтувчини четлаштириш операциясини ишлатиб, уни соддалаштириш мумкин эмас.

6. $x_1x_2x_3$ конъюнкцияни ҳам четлаштириш мумкин эмас, аммо ундан x_1 кўпайтувчини четлаштириш мумкин. Натижада, x_1x_3 конъюнкцияни ҳосил қиласиз ва уни бошқа соддалаштириш мумкин эмас.

Шундай қилиб, $\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_1\bar{x}_3 \vee x_1x_3$ ДНШ ни ҳосил қиласиз. Бу ДНШ га нисбатан конъюнкцияни четлаштириш операциясини ишлатиш натижа бермайди.

Демак, соддалаштириш алгоритмини ишлатиш натижа сида

$$D = \bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_1\bar{x}_3 \vee x_1x_3 \quad (2)$$

дизъюнктив нормал шаклни ҳосил қиласиз. Келтирилган ҳисоблар 2- жадвалда акс эттирилган.

2-жадвал

Қадам т.р.	ДНШ ва кўрилаётган тартиб	Текшири- лаётган конъюнкция	Операция тури
1	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee$ $\vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$	\bar{x}_1 ни четлаш- тириш
2	$\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee$ $\vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$	\bar{x}_2 ни четлаш- тириш
3	$\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee$ $\vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$	$\bar{x}_1 x_2 x_3$	$\bar{x}_1 x_2 x_3$ ни чет- лаштириш
4	$\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee$ $\vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$	$x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$	$x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$ ни чет- лаштириш
5	$\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee$ $\vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$	$x_1 x_2 \bar{x}_3$	x_2 ни чет- лаштириш
6	$\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee$ $\vee x_1 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$	$x_1 x_2 x_3$	x_1 ни чет- лаштириш
7	$\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee$ $\vee x_1 \bar{x}_3 \vee x_2 x_3$		
	Иккинчи кўриш ҳеч нарса бермайди	Алгоритм тамом бўлди	

Агарда соддалаштириш алгоритмини D^H га нисбатан иш-
латсак, у ҳолда

$$D_2 = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee x_1 x_2 \quad (3)$$

дизъюнктив нормал шаклга эга бўламиз.

3- жадвалда D^n га нисбатан ишлатилган соддалаштириш алгоритми ишининг асосий босқичлари келтирилган.

Ушбу мисолдан кўриниб турибдики, соддалаштириш алгоритми татбиқининг натижаси дастлабки ДНШ ни қандай тартиблашга боғлиқ бўлар экан.

Масалан, $L_B(D_1) = 8$, $L_B(D_2) = 6$, $L_K(D_1) = 4$, $L_K(D_2) = 3$, $L_0(D_1) = 4$, $L_0(D_2) = 3$ ва бу ердан $L_B(D_1) \neq L_B(D_2)$, $L_K(D_1) \neq L_K(D_2)$, $L_0(D_1) \neq L_0(D_2)$ муносабатлар келиб чиқади.

3- жадвал

Қадам т.р.	ДНШ ва кўрилаётган тартиб	Текшири- лаётган конъюнкция	Операция тури
1	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_3\bar{x}_1\bar{x}_2 \vee x_2\bar{x}_1x_3 \vee x_1x_2x_3 \vee \bar{x}_3x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	\bar{x}_1 ни чет- лаштириш
2	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_3\bar{x}_1\bar{x}_2 \vee x_2\bar{x}_1x_3 \vee x_1x_2x_3 \vee \bar{x}_3x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$x_3\bar{x}_1\bar{x}_2$	x_3 ни чет- лаштириш
3	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee x_2\bar{x}_1x_3 \vee x_1x_2x_3 \vee \bar{x}_3x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$x_2\bar{x}_1x_3$	x_2 ни чет- лаштириш
4	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_1x_2x_3 \vee \bar{x}_3x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$x_1x_2x_3$	x_1 ни чет- лаштириш
5	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3 \vee \bar{x}_3x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$\bar{x}_3x_1x_2$	\bar{x}_3 ни чет- лаштириш
6	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3 \vee x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$ ни чет- лаштириш
7	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3 \vee x_1x_2$	$\bar{x}_2\bar{x}_3$	Кўлланил- майди
8	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3 \vee x_1x_2$	$\bar{x}_1\bar{x}_2$	$\bar{x}_1\bar{x}_2$ ни чет- лаштириш

1	2	3	4
9	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3 \vee x_1x_2$	\bar{x}_1x_3	Кўлланил-майди
10	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3 \vee x_1x_2$	x_2x_3	x_2x_3 ни четлаштириш
11	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_1x_2$	x_1x_2	Кўлланил-майди
12	$\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_1x_2$	Алгоритм тамом бўлди	

Исталган $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция учун бирор тартиблаш оқибатида соддалаштириш алгоритмини татбиқ этиб, минимал ДНШни ҳосил этиш мумкинми ёки йўқми деган савол туғилади. Бу саволга қўйидаги теорема жавоб беради.

2-теорема. $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ математик мантиқ алгебрасининг ихтиёрий функцияси ($f \neq 0$) ва $D = \bigvee_{i=1}^n K_i$ унинг ихтиёрий тупикии ДНШ (I ва II алмаштиришларга нисбатан) бўлсин. У ҳолда мукаммал дизъюнктив нормал шакни шундай тартиблаши мавжуд бўладики, ундан соддалаштириш алгоритми ёрдами билан D тупикии ДНШ ни ҳосил қилиш мумкин.

Натижা. Тупикии ДНШлар орасида албатта L индексга нисбатан минимал ДНШлар (ҳаммаси бўлиши шарт эмас) мавжуд бўлганлиги учун, соддалаштириш алгоритми, МДНШ ни маълум равишда тартиблаш натижасида минимал ДНШ ни ҳам топишга имкон яратади.

Шундай қилиб, минимал ДНШ ни топиш учун МДНШ ни тартиблаш ва унга нисбатан соддалаштириш алгоритмини ишлатиш керак.

Теореманинг исботидан ([56], 213- бетга қ.) шу нарса келиб чиқадики, соддалаштириш алгоритми ёрдами билан тупикии ДНШ ларни мукаммал ДНШ дан ясаш учун фақат конъюнкциялар ифодасида кўпайтувчилар жойлашишини вариацияламоқ етарли.

Ҳозирги вақтда конъюнкцияларни ДНШ ифодасидан четлаштириш ва кўпайтувчиларни конъюнкциялар ифодасидан четлаштириш мумкинлигини текшириш сони (МДНШ ни тартиблашнинг ҳамма тури бўйича)

$$2^{\left(n \log_{\frac{n}{2}+1}\right) 2^n} \cdot (n+2) \cdot 2^n$$

дан ортиқ эмаслиги исботланган. Бу сон 2^{3^n} сонидан анча камдир, яъни соддалаштириш алгоритми «бирма-бир кўздан кечириш» алгоритмидан яхшироқ эканлиги маълум бўлади.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Куйидаги функцияларни мукаммал конъюнктив нормал шаклга келтириб, L_B , L_K , L_0 содалик индексларининг миқдорини топинг:

$$f_1 = ((x \vee y) \vee z) \rightarrow ((x \vee y)(x \vee z));$$

$$f_2 = x \leftrightarrow z;$$

$$f_3 = (x \rightarrow y) \rightarrow z;$$

$$f_4 = x \rightarrow (y \rightarrow z).$$

2. Куйидаги функцияларни соддалаштириш алгоритмидан фойдаланиб, минимал дизъюнктив нормал шаклга келтиринг:

$$f_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_3 x_4 \vee x_2 \bar{x}_3 x_4;$$

$$f_2 = x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_4 \vee x_3 x_4;$$

$$f_3 = x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4.$$

3. Дизъюнктив нормал шаклда берилган қуйидаги функцияларнинг тупикли дизъюнктив нормал шаклини топинг:

$$1) (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3);$$

$$2) (x_1 \vee x_4)(x_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3);$$

$$3) (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_4)(x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_4).$$

4. З-бандда берилган функцияларнинг минимал дизъюнктив нормал шаклини топинг.

5. Математик мантиқ функцияларини минималлаштириш муаммосининг амалий аҳамиятини тушунтириб беринг. Бу масала ечимининг тривиал алгоритмининг нокулайлиги нимадан иборат?



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Математик мантиқ функцияларини минималлаштириш муаммоси нимадан иборат?
2. Соддалик индекси ва унинг хусусиятлари.
3. Минимал ва энг қисқа ДНШ.
4. Тривиал алгоритм тушунчаси. «Бирма-бир кўздан кечириш» алгоритми.
5. ДНШни соддалаштиришининг икки хил йўли. Элементар конъюнкцияни ва кўпайтuvчини четлаштириш жараёнларини тушунтириб беринг.
6. Тупикили ДНШ. Минимал ДНШга келтириш муаммолари.

3- §. Минималлаштириш масаласининг геометрик тарзда қўйилиши


Бирлик кубнинг ҳамма чўққилари тўплами. Уч ўлчовли ёқ. N_r тўплами ҳақида. Интервал. Тўплам қобиги. Тўплам қобиги билан функция орасидаги муносабат.

Ҳамма $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ мажмуа тўпламини E^n билан белгилаймиз. E^n тўпламни бирлик кубнинг ҳамма чўққилари (учлари) тўплами сифатида қараш мумкин. Шу сабабли E^n тўплам n ўлчовли куб, $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ эса куб чўққилари деб аталади.

1-таъриф. $\sigma_{i_1}, \sigma_{i_2}, \dots, \sigma_{i_r}$ шундай 0 ва 1 сонларидан иборат тайинланган сонлар системаси бўлиб, $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n$ учун

$$\alpha_{i_1} = \sigma_{i_1}, \alpha_{i_2} = \sigma_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r} = \sigma_{i_r}$$

бажарилганда E^n кубнинг чўққиларидан тузилган тўплам ($n - r$) ўлчовли ёқ деб аталади.



VIII.1- шакл.

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ мантиқ алгебрасининг функцияси бўлсин. E^n кубининг $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 1$ бўладиган ҳамма чўққиларидан иборат тўпламни N_f билан белгилаймиз, яъни $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 1$ бажарилганда ва фақат шунда $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in N_f$ бўлади. Масалан, 1- жадвалда берилган функцияга

$N_f = \{0, 0, 0\}, \{0, 0, 1\}, \{0, 1, 1\}, \{1, 0, 0\}, \{1, 1, 0\}, \{1, 1, 1\}$ тўплам мос келади.

Аниқки, $N_f \subseteq E^n$. Агар N_f тўплам берилган бўлса, у ҳолда унга мос бўлган f нинг аналитик кўринишини ёзиш мумкин (VIII.1- шакл).

1- мисол. а) $N_{f_1} = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (1, 0, 1)\}$;

б) $N_{f_2} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 0, 1)\}$ тўпламларга мос келадиган функцияларнинг аналитик кўриниши қўйидаги-ча бўлади:

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 ;$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 .$$

Демак, N_f берилган бўлса, у ҳолда унга мос бўлган f ни, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ берилганда эса N_f ни топиш мумкин.

Дастлабки функция сифатида r рангли $K(x_1, \dots, x_n)$ элементар конъюнкцияни олайлик, яъни

$$K(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_{i_1}^{\sigma_1} x_{i_2}^{\sigma_2} \dots x_{i_r}^{\sigma_r}.$$

2-таъриф. K конъюнкцияга мос N_k тўплам r рангли интервал деб аталади.

Ўз-ўзидан равшанки, r рангли N интервал ($n - r$) ўлчовли ёқни ифодалайди.

2-мисол. $K_1(x_1, x_2, x_3) = x_2 x_3$, $K_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2$, $K_3(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1$ конъюнкцияларга $N_{k_1} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1)\}$, $N_{k_2} = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1)\}$, $N_{k_3} = \{(0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ интерваллар мос келади. Бу интерваллар мос равишда 2, 2 ва 1 рангли ҳамда ва 1-ўлчовли ёқ (қирра), 1-ўлчовли ёқ (қирра) ва 2-ўлчовли ёқдир.

Агар $f(x_1, x_2, \dots, x_n)g(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ бўлса, у ҳолда:

$$\text{1)} N_g \subseteq N_f, N_h \subseteq N_f; \quad \text{2)} N_f = N_g \cup N_h$$

бўлади.

Умуман, агар $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = D$ ва $D = K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_s$ бўлса, у ҳолда юқоридаги хоссаларга асосан

$$N_{k_i} \subseteq N_f \quad (i = 1, 2, \dots, s) \quad \text{ва} \quad N_f = N_{k_1} \cup N_{k_2} \cup \dots \cup N_{k_s},$$

яъни f функцияга N_f тўпламнинг $N_{k_1}, N_{k_2}, \dots, N_{k_s}$ интерваллардан иборат қобиқ мос келади ва ҳар бир $N_{k_1}, N_{k_2}, \dots, N_{k_s}$ интерваллардан иборат N_f тўпламнинг қобигига D дизъюнктив нормал шаклда ифодаланган f функция мос келади.

Демак, мантиқ алгебрасининг ҳар бир $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциясига битта N_f тўпламнинг $N_{k_1}, N_{k_2}, \dots, N_{k_n}$ интерваллардан ($N_{k_j} = N_f$) иборат қобиги ва, аксинча, ҳар бир N_f тўпламнинг $N_{k_1}, N_{k_2}, \dots, N_{k_n}$ интерваллардан иборат қобигига битта ягона $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция мос келади, яъни N_f нинг қобиги билан $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция орасида ўзаро бир қийматли мослик мавжуд.

3-мисол. 1-жадвал билан берилган $f(x_1, x_2, x_3)$ функцияниң дизъюнктив нормал шакллари қўйидатича эди:

$$D_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 ,$$

$$D_2 = x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 .$$

Бу ДНШларга $N_f = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ тўпламнинг иккита қопламаси мос келади:

$$N_f = N_{k_1} \cup N_{k_2} \cup N_{k_3} \cup N_{k_4} \cup N_{k_5} ,$$

$$N_f = N_{k_1^0} \cup N_{k_2^0} ,$$

бу ерда

$$N_{k_1} = \{(0, 0, 0)\}, \quad N_{k_2} = \{(1, 0, 0)\}, \quad N_{k_3} = \{(1, 0, 1)\},$$

$$N_{k_4} = \{(1, 1, 0)\}, \quad N_{k_5} = \{(1, 1, 1)\},$$

$$N_{k_1^0} = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0)\},$$

$$N_{k_2^0} = \{(1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}.$$

Биринчи қоплама бешта нуқтадан, иккинчиси эса қирра ва икки ўлчовли ёқдан иборат.

N_{k_i} интервалнинг ранги r_i бўлсин (у K_i конъюнциянинг рангига тенг). У ҳолда

$$r = \sum_{i=1}^s r_i \tag{4}$$

қопламанинг ранги деб аталади.

Мантиқ алгебраси функцияси $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ни минималлаштириш (минимизациялаш) муаммосига эквивалент бўлган қопламалар ҳақидаги геометрик масала қўйидатича қўйилади; берилган $N_f = N_{k_1} \cup N_{k_2} \cup \dots \cup N_{k_s}$ тўпламнинг $N_{k_1}, N_{k_2}, \dots, N_{k_s}$ ($N_{k_j} \subseteq N_f, j = 1, 2, \dots, s$) интерваллардан иборат шундай қобигини топиш керакки, унинг r ранги энг кичик бўлсин, яъни бизни қизиқтирувчи

$$\min r = \min \sum_{i=1}^s r_i \tag{5}$$

топиш масаласига келади.

Демак, мантиқ алгебраси функциясини минималлаштириш масаласини икки формада күриш мумкин: биринчи – аналитик формада, иккинчиси – геометрик формада. Шунинг учун адабиётларда икки тил ишлатилади: аналитик ва геометрик. Айрим ҳолларда икки тилнинг қомбинациясидан фойдаланилади. Масалан, конъюнкцияни интервал ва ДНШ ни қоплама деб айтиласди.

4- §. Жоиз (рухсат этилган) конъюнкциялар

Жоиз конъюнкциялар. Тривиал алгоритмни соддалашириш.

Маълумки, x_1, x_2, \dots, x_n ўзгарувчилардан 3^n та элементар конъюнкция ва 2^{3^n} та дизъюнктив нормал шакл тузиш мумкин. Масалан, $n = 3$ та тенг бўлса, яъни x_1, x_2, x_3 ўзгарувчилардан
 $1, x_1, x_2, x_3, \bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3, x_1\bar{x}_2,$
 $x_1\bar{x}_3, x_2\bar{x}_3, \bar{x}_1x_2, \bar{x}_1\bar{x}_3, \bar{x}_1\bar{x}_2, \bar{x}_2\bar{x}_3, \bar{x}_1x_3,$ (1)
 $\bar{x}_2x_3, \bar{x}_1x_2x_3, x_1\bar{x}_2x_3, x_1x_2\bar{x}_3, \bar{x}_1\bar{x}_2x_3,$
 $\bar{x}_1x_2\bar{x}_3, x_1\bar{x}_2\bar{x}_3, \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3, x_1x_2x_3.$

Элементар конъюнкциялар тузиш мумкин. Аммо бу элементар конъюнкцияларнинг ҳаммаси ҳам берилган ихтиёрий $f(x_1, x_2, x_3)$ функцияни реализация қиласидан дизъюнктив нормал шаклларнинг ифодасида иштирок этавермайди. Шунинг учун 3^n та конъюнкцияларнинг қайси бири $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функциянинг ДНШ да иштирок этади деган масалани ечишга тўғри келади. Бунинг учун, биринчи навбатда, $E_n \setminus N_f$ тўпламнинг элементларида I қиймат қабул қиласидан конъюнкцияларни топиш керак бўлади. Масалан,

$$f_1(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee \bar{x}y\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xyz, \quad (2)$$

бўлсин, у ҳолда

$$N_{f_1} = \{(0, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\} \quad (3)$$

бўлади. Демак, ушбу 1- жадвалга эта бўламиз.

I- жадвал

$E_n \setminus N_f$	I қиймат қабул қиласынан конъюнкциялар
(0, 0, 0)	1, \bar{x} , \bar{y} , \bar{z} , $\bar{x}\bar{y}$, $\bar{x}\bar{z}$, $\bar{y}\bar{z}$, $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$
(0, 0, 1)	1, \bar{x} , \bar{y} , z , $\bar{x}y$, $\bar{x}z$, $\bar{y}z$, $\bar{x}\bar{y}z$

Иккинчи навбатда, (1) конъюнкциялар орасидан I- жадвалдаги конъюнкцияларни четлаштирамиз, чунки $f(x, y, z)$ функцияга N_f ((3) га қаранг) түплам мос келгандыктын учун I- жадвалдаги конъюнкциялар (2) функцияни реализация қиласынан дизьюнктив нормал шакллар ифодасыда умуман қатнашмайды. Бу операция натижасыда биз $f_1(x, y, z)$ функцияни реализация қиласынан ДНШ лар ифодасыда қатнашиши мүмкін бўлган (қатнашишга рухсат этилган, қатнашишга жоиз) конъюнкцияларга эга бўламиз:

$$x, y, xy, xz, x\bar{y}, x\bar{z}, yz, \bar{x}y, y\bar{z}, xyz, \\ xy\bar{z}, \bar{x}yz, x\bar{y}z, \bar{x}\bar{y}\bar{z}. \quad (4)$$

Шундай қилиб, $3^3 = 27$ конъюнкциядан 15 тасининг берилган $f_1(x, y, z)$ функцияни реализация қиласынан ДНШ лар ифодасыда қатнашиши жоиз экан.

1-таъриф. *Ихтиёрий $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция ва унга мос бўлган N_f түплам берилган бўлсин. $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни реализация қиласынан ДНШ лар ифодасыда қатнашиши мүмкін бўлган конъюнкциялар, яъни $E_n \setminus N_f$ түпламнинг нуқталарида I қийматга эга бўлган конъюнкциялардан ташқари қолган ҳамма конъюнкциялар жоиз конъюнкциялар деб аталади.*

Масалан, (4) даги ҳамма конъюнкциялар жоиз конъюнкциялар бўлади.

1-мисол. Берилган

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \\ \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \quad (2a)$$

ва унга мос

$N_{f_2} = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$ (3a)
түплем берилган бўлсин.

Жоиз конъюнкцияларни топиш учун ушбу 2- жадвални тузамиз.

2- жадвал

$E_n \setminus N_f$	1 қиймат қабул қиласидаган конъюнкциялар
(1, 0, 0)	1, $x_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, x_1\bar{x}_2, x_1\bar{x}_3, \bar{x}_2\bar{x}_3, x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$
(0, 1, 1)	1, $\bar{x}_1, x_2, x_3, \bar{x}_1x_2, \bar{x}_1x_3, x_2x_3, \bar{x}_1x_2x_3$

У ҳолда (1) даги конъюнкциялардан 2- жадвалдаги конъюнкцияларни четлаштириш натижасида қуидаги жоиз конъюнкцияларга эга бўламиз:

$$x_1, x_2, x_1x_3, x_2\bar{x}_3, \bar{x}_2x_3, \bar{x}_1\bar{x}_2, \bar{x}_1\bar{x}_3, x_1x_2x_3, \\ x_1x_2\bar{x}_3, x_1\bar{x}_2x_3, \bar{x}_1x_2\bar{x}_3, \bar{x}_1\bar{x}_2x_3, \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3. \quad (5)$$

Ўзгарувчилар сони n та бўлганда, 3^n та конъюнкция ва улардан 2^{3^n} та $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни реализация қилиши мумкин бўлган ДНШ тузиш мумкинлигини айтган эдик. Демак, берилган ихтиёрий $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияни реализация қиласидаган тупикили (минимал) ДНШларни 2^{3^n} та ДНШлар орасидан изламасдан, балки 2^{λ} ДНШлар ичидан излаш керак деган натижага келдик, бу ерда λ – жоиз конъюнкциялар сони.

5- §. Қисқартирилган дизъюнктив нормал шакл

Максимал интервал. Оддий импликант. Қисқартирилган ДНШ. Мисоллар.

1-таъриф. Агар N_f тўпламнинг қисм тўплами бўлган N_k интервал учун:

$$1) N_k \subseteq N_k^! \subseteq N_f;$$

2) N_k^1 интервалнинг ранги N_k интервалнинг рангидан кичик шартини қаноатлантирувчи N_k^1 интервал мавжуд бўлмаса, у ҳолда N_k (N_f га нисбатан) **максимал интервал** деб аталади.

1- мисол. $K_1(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1x_2$, $K_2(x_1, x_2, x_3) = x_1\bar{x}_2$, $K_2(x_1, x_2, x_3) = x_2$ бўлсин. У ҳолда N_{k_2} , N_{k_3} максимал интерваллар бўлиб, N_{k_1} интервал эса N_f нинг максимал интервали бўлмайди, чунки $N_{k_1} \subset N_{k_3}$ ва N_{k_3} нинг ранги N_{k_1} нинг рангидан кичик.

2- мисол. 4- §, (4) даги жоиз конъюнкцияларга мос келган 15 та интервалдан фақат N_{x_1} ва N_{x_2} интерваллар ҳамда 4- §, (5) даги 12 та интервалдан фақат $N_{x_1x_2}$, $N_{x_1x_3}$, $N_{x_2\bar{x}_3}$, $N_{\bar{x}_2x_3}$, $N_{\bar{x}_1\bar{x}_2}$, $N_{\bar{x}_1\bar{x}_3}$ интервалларгина мос равища N_{f_1} ва N_{f_2} тўпламларга нисбатан максимал интерваллар бўладилар.

2- таъриф. N_f тўпламнинг N_k максимал интервалига мос келган K конъюнкция f функцияниң **оддий импликанти** деб аталади.

Агар K^1 конъюнкциянинг ҳамма кўпайтувчилари K конъюнкцияда ҳам мавжуд бўлса, у ҳолда $N_k \subseteq N_k^1$ деб ёзиш мумкин. У ҳолда, маълум маънода, f функцияниң K оддий импликанти ифодасидан бирорта ҳам кўпайтувчини четлаштириш мумкин эмас, чунки кўпайтувчини четлаштириш натижасида $N_k^1 \not\subseteq N_f$ муносабатда бўлган K^1 конъюнкцияга эга бўламиз.

Ҳар қандай N_k интервални ($N_k \subseteq N_f$) максимал интервалгача кентгайтириш мумкин.

N_f тўпламнинг ҳамма максимал интерваллари

$$N_{k_1^0}, N_{k_2^0}, \dots, N_{k_m^0}, \quad (1)$$

лардан иборат бўлсин. У ҳолда

$$N_f = N_{k_1^0} \cup N_{k_2^0} \cup \dots \cup N_{k_m^0}, \quad (2)$$

бўлади, чунки $N_{k_i^0} \subseteq N_f$ ($i = 1, 2, \dots, m$) ва N_f нинг ҳар бир нуқтаси (1) даги максимал интервалларнинг бирор тасининг элементи бўлади. (2) тенглик қуйидаги муносабатга эквивалентdir:

$$f = K_1^0 \vee K_2^0 \vee \dots \vee K_m^0. \quad (3)$$

3-таъриф. f функцияning ҳамма оддий импликантларининг дизъюнкцияси (3) қисқартирилган ДНШ деб аталади.

Демак,

$$D_s(f) = K_1^0 \vee K_2^0 \vee \dots \vee K_m^0 \quad (4)$$

f функцияning қисқартирилган ДНШ бўлади. $D_s(f)$ қисқартирилган ДНШ f функция орқали бир қиймати аниқланади ва f функцияни реализация қилади.

3-мисол. 4-§, (2) да берилган $f_1(x_1, x_2, x_3)$ учун максимал интерваллардан иборат

$$N_{f_1} = N_{k_1^0} \cup N_{k_2^0} \quad (5)$$

қобиққа ва 4-§, (2a) да берилган $f_2(x_1, x_2, x_3)$ функция учун

$$N_{f_2} = N_{k_1} \cup N_{k_2} \cup N_{k_3} \cup N_{k_4} \cup N_{k_5} \cup N_{k_6} \quad (6)$$

қобиққа эга бўламиз. Бу ерда

$$K_1^0 = x_1, \quad K_2^0 = x_2, \quad K_1 = x_1 x_2, \quad K_2 = x_1 x_3, \quad K_3 = x_2 \bar{x}_3,$$

$$K_4 = \bar{x}_2 x_3, \quad K_5 = \bar{x}_1 \bar{x}_2, \quad K_6 = \bar{x}_1 \bar{x}_3.$$

Бу қобиқларга қуйидаги қисқартирилган ДНШлар мос келади:

$$D_c(f_1) = x_1 \vee x_2,$$

$$D_c(f_2) = x_1 x_2 \vee x_1 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3. \quad (7)$$

6- §. Қисқартырған дизъюнктив нормал шақлни ясаш алгоритми

Функцияни қисқартырған ДНШга келтириш алгоритми.
Мисоллар.

Ихтиёрий $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияның қисқартырған дизъюнктив нормал шақлни ясаш учун қуйидаги операцияларни бажарамиз:

- 1) $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функцияның исталған конъюнктив нормал шақлни оламиз, масалан, мұкабмал КНШ;
- 2) кейин қавсларни очиб чиқамиз, яғни

$$\wedge \vee \rightarrow \vee \wedge$$

турдаги алмаштиришни ўтказамиз;

- 3) бундан кейин ҳосил қилингандык ифодадан 0 га тенг ҳадларни четлаштирамиз ва

$$K_1 K_2 \vee K_2 = K_1, \quad K_1 \vee K_1 = K_1,$$

формулалардан фойдаланиб уни соддалаштирамиз. Натижада, қисқартырған ДНШ га келамиз.

1- мисол. $N_{f_2} = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$ түплемга мес $f_2(x_1, x_2, x_3)$ функцияның МКНШ ни

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=0}} (x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee x_2^{\bar{\sigma}_2} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n}), \quad (1)$$

формуладан фойдаланиб ёзамиз:

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3).$$

Алгоритмнинг 2 ва 3- қадамларини ишлатамиз:

$$(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) = x_1 \bar{x}_1 \vee x_1 x_2 \vee x_1 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee \\ \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_3 \bar{x}_3 = x_1 x_2 \vee x_1 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3.$$

Қисқартирилган ДНШ куйидаги күринишда бўлади:

$$D_c(f_2) = x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_2\bar{x}_3. \quad (2)$$

2-мисол.

$f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$ функция берилган бўлсин. Бу функцията

$N_{f_1} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ тўплам мос келади. Функцияниң МКНШ кўриниши

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3).$$

Алгоритмнинг 2 ва 3-қадамларини бажарамиз:

$$\begin{aligned} (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) &= \bar{x}_1\bar{x}_1 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_2\bar{x}_2 \vee \\ &\vee \bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_3\bar{x}_3 = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_1x_2 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_2x_3 \vee \\ &\vee \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3 = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \\ &\vee \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2. \end{aligned}$$

Демак, функцияниң қисқартирилган ДНШ куйидагича бўлади:

$$D_c(f_1) = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2. \quad (3)$$



Муаммоли масала ва топшириклар

- $N_{f_1} = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$,
 $N_{f_2} = \{(1, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$ тўпламларга мос f_1 ва f_2 функцияларнинг аналитик кўринишини ёзинг.
- $N_{K_1} = \{(0, 0, 0), (0, 1, 1)\}$, $N_{K_2} = \{(1, 1, 1), (1, 0, 0)\}$,
 $N_{K_3} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ интервалларга мос конъюнкцияларнинг аналитик кўринишини ёзинг.
- Ҳар бир N_{K_1} , N_{K_2} , ..., N_{K_s} интерваллардан иборат N_f тўпламнинг қобигига D дизъюнктив нормал шаклда ифодаланган f функция мос келишини исботланг.

4. Күйида берилген функцияларнинг жоиз конъюнкцияларини топинг:

$$f_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_3 x_4 \vee x_2 \bar{x}_3 x_4;$$

$$f_2 = x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_4 \vee x_3 x_4;$$

$$f_3 = x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4;$$

$$f_4 = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3);$$

$$f_5 = (x_1 \vee x_4)(x_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3);$$

$$f_6 = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_4)(x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_4).$$

5. 4- бандда келтирилган функцияларни қисқартирилган ДНШ га келтииринг.

6. Қисқартирилган ДНШ ни ясаш алгоритми асосида күйидаги функцияларни қисқартирилган ДНШ кўринишга келтииринг:

$$f_1 = x_1 x_2 \vee \bar{x}_2;$$

$$f_2 = \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_2 x_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3;$$

$$f_3 = x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee x_2 x_3.$$



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

- Интервал. Тўплам қобиги. Тўплам қобиги билан функция орасидаги муносабат.
- Жоиз (руҳсат этилган) конъюнкциялар. Тривиал алгоритмни соддалаштириши.
- Максимал интервал ва оддий импликант ҳақида тушунчалар.
- Қисқартирилган дизъюнктив нормал шакл.
- Функцияни қисқартирилган дизъюнктив нормал шаклга келтириш алгоритми.

7- §. Тупикли дизъюнктив нормал шаклларни геометрик асосда ясаш усувлари

- Тупикли ДНШга келтириши алгоритми. Айрим максимал интервалларни четлаштириши. Келтирилмайдиган қопламалар (қобиқлар). Қисқартирилган, тупикли ва минимал ДНШлар орасидаги муносабатлар.

4- §, (2a) формула билан берилған $f_2(x_1, x_2, x_3)$ функция учун $N_{k_1}, N_{k_2}, \dots, N_{k_6}$ максимал интерваллардан N_{f_2} иборат қолпама

$$N_{f_2} = N_{k_1} \cup N_{k_2} \cup N_{k_3} \cup N_{k_4} \cup N_{k_5} \cup N_{k_6} \quad (1)$$

эканлыгіни юқорида күрсатған әдік. Бу ерда

$$N_{f_2} = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$$

$$N_{k_1} = \{(1, 1, 0), (1, 1, 1)\}, \quad N_{k_2} = \{(1, 0, 1), (1, 1, 1)\},$$

$$N_{k_3} = \{(0, 1, 0), (1, 1, 0)\}, \quad N_{k_4} = \{(0, 0, 1), (1, 0, 1)\},$$

$$N_{k_5} = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1)\}, \quad N_{k_6} = \{(0, 0, 0), (0, 1, 0)\}. \quad (2)$$

Олдимизга бундай саволга жавоб топиш масаласини күйемиз: N_{f_2} түпламнинг N_{k_1}, \dots, N_{k_6} максимал интерваллардан иборат бўлган қолпамадан айрим максимал интервалларни четлаштирганимизда, қолган қисми яна N_{f_2} нинг қобиғи бўладими ёки йўқм?

(1) ва (2) муносабатлардан қуйидагилар келиб чиқади:

$$N_{f_2} = N_{k_2} \cup N_{k_3} \cup N_{k_5} \cup N_{k_6},$$

$$N_{f_2} = N_{k_1} \cup N_{k_4} \cup N_{k_6},$$

$$N_{f_2} = N_{k_1} \cup N_{k_2} \cup N_{k_5} \cup N_{k_6},$$

$$N_{f_2} = N_{k_5} \cup N_{k_2} \cup N_{k_3},$$

$$N_{f_2} = N_{k_4} \cup N_{k_2} \cup N_{k_3} \cup N_{k_6}. \quad (3)$$

N_{f_2} түпламнинг (3) да күрсатилған қолпамаларидан бошқа қолпамалари мавжуд эмас. Бу қобиқлар (1) келтирилган қобиқдан айрим максимал интервалларни четлаштириш нағијасида ҳосил қилинган. Шундай қилиб, қўйилған саволнинг биринчи қисмiga ижобий жавоб бердик.

(3) да келтирилған N_{f_2} түпламнинг исталған қолпамадан ихтиёрий бирорта максимал интервални четлаштирганимизда, қолган максимал интерваллар N_{f_2} түпламнинг

қопламаси бўла олмайди. Бундай қопламалар N_{f_2} тўпламнинг келтирилмайдиган қопламалари деб аталади. Шундай қилиб,

- 1) $N_{k_2}, N_{k_3}, N_{k_5}, N_{k_6}$; 2) $N_{k_1}, N_{k_4}, N_{k_6}$;
 - 3) $N_{k_1}, N_{k_2}, N_{k_5}, N_{k_6}$; 4) $N_{k_2}, N_{k_3}, N_{k_5}$;
 - 5) $N_{k_2}, N_{k_3}, N_{k_4}, N_{k_6}$
- (4)

қобиқлар N_{f_2} тўпламнинг келтирилмайдиган қопламалари бўлади.

1-таъриф. Агар $N_{k_1}, N_{k_2}, \dots, N_{k_m}$ максимал интерваллардан иборат қобиқ унинг таркибидан исталган максимал интервални ($N_{k_j}, j = 1, 2, \dots, m$) четлаштирганимизда, қолган қисми N_j нинг қобиги бўла олмаса, у ҳолда бу қобиқ N_{f_2} тўпламнинг келтирилмайдиган қоплами деб аталади.


2-таъриф. N_j тўпламнинг келтирилмайдиган қобигига мос бўлган ДНШ тупикли дизъюнктив нормал шакл деб аталади (геометрик маънода).

1-мисол. N_{f_2} тўпламнинг (4) да ифодаланган келтирилмайдиган қобиқларига мос қуйидаги ДНШ лар

$$\begin{aligned} D_1 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2 \vee x_2 \bar{x}_3, \\ D_2 &= \bar{x}_2 x_2 \vee x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3, \\ D_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \vee x_2 \bar{x}_3, \\ D_4 &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_3 \vee x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3, \\ D_5 &= \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \end{aligned} \quad (5)$$

f_2 функцияning тупикли дизъюнктив нормал шакллари бўлади.

Теорема. I ва II алмаштиришларга нисбатан тупикли ДНШ тушунчаси билан геометрик маънодаги тупикли ДНШ тушунчаси эквивалентdir.



VIII.2- шақ.

Биз таърифлаган қисқартырған, тупикли ва минимал ДНШлар қуидаги муносабатда бўлади.

Тупикли ДНШ қисқартырған ДНШдан айрим конъюнкцияларни четлаштириш йўли билан ҳосил қилинади.

L_g га нисбатан минимал ДНШ тупикли бўлади.

Тупикли ДНШ лар орасида L_g га нисбатан минимал ДНШ лар мавжуд бўлади.

Масалан,

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$$

функцияниянг (4- §, (2a) га к.) $D_c(f_2)$ қисқартырған ДНШ ни топдик (6- §, (2) га к.):

$$D_c(f_2) = x_1 x_2 \vee x_1 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_2 \bar{x}_3.$$

Үндән кейин (5) да ифодаланган тупикли ДНШларни ҳосил қылдик. У ердан күриниб турибдики,

$$L_B(D_1) = L_B(D_2) = 6 \text{ ва } L_B(D_3) = L_B(D_4) = L_B(D_5) = 8.$$

Демак,

$$D_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \text{ ва } D_2 = \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3.$$

тупикли ДНШлар $f_2(x_1, x_2, x_3)$ функцияның минимал дизъюнктив нормал шакллари бўлади. Равшанки, бу ДНШлар ўз навбатида $f_2(x_1, x_2, x_3)$ нинг энг қисқа ДНШлари ҳам бўлади.

МДНШ асосида минимал ДНШ ясаш жараёнининг схемаси VIII.2-шаклда ифодаланган.

8- §. Тупикли дизъюнктив нормал шаклларни ясаш алгоритми

Ҳамма тупикли ДНШларни топишнинг геометрик ғояларга асосланган алгоритми. Мисоллар.

Ҳамма тупикли ДНШларни топишнинг геометрик ғояларга асосланган алгоритмини келтирамиз. N_f тўпламнинг ҳамма максимал интерваллар системаси

$$N_{k_1}^0, N_{k_2}^0, \dots, N_{k_m}^0$$

бўлсин. $N_f = \{P_1, P_2, \dots, P_\lambda\}$ ва $P_0 \notin N_f$ ихтиёрий нуқта бўлсин. f функция айнан 1 га teng бўлмаган функция бўлсин. 1- жадвални тузамиз, бу ерда

$$\sigma_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{агар } P_j \notin N_{k_i^0} \text{ бўлса, } (i = 1, \dots, m), \\ 1, & \text{агар } P_j \in N_{k_i^0} \text{ бўлса, } (j = 0, 1, \dots, \lambda). \end{cases}$$

Жадвалнинг биринчи устуни 0 лардан иборат бўлади, чунки $P_0 \notin N_f$. Ҳар бир қолган устунларида ҳеч бўлмаганда битта 1 мавжуд бўлади. Демак, биринчи устун қолган ҳамма устунлардан фарқ қиласди.

I-жадвал

	P_0	P_1	...	P_j	...	P
$N_{k_i^0}$	σ_{i0}	σ_{i1}	...	σ_{ij}	...	σ_{ik}
...
$N_{k_i^0}$	σ_{i0}	σ_{i1}	...	σ_{ij}	...	σ_{ik}
...
$N_{k_m^0}$	σ_{m0}	σ_{m1}	...	σ_{mj}	...	σ_{mk}

Хар бир j ($0 \leq j \leq \lambda$) учун ҳамма сатрлар рақамлари (номерлари) түплами E_j ни топамиз, бу ерда P_j устунда I мавжуд бўлади.

$$E_j = \{e_{j1}, e_{j2}, \dots, e_{j\mu(j)}\}$$

бўлсин.

$$\bigwedge_{j=1}^{\lambda} (e_{j1} \vee \dots \vee e_{j\mu(j)})$$

ифодани тузамиз ва

$$\wedge \vee \rightarrow \vee \wedge$$

турдаги алмаштиришни ўтказамиз. Бу алмаштириш вақтида e символини буль қийматли деб биламиз. Ҳосил қилинган ифодани

$$\begin{aligned} AB \vee A &= A, \\ A \vee A &= A \end{aligned}$$

тeng кучли формулалардан фойдаланиб соддалаштирамиз. Бунинг натижасида $\vee \wedge$ ифоданинг қисми бўлган $\vee \wedge'$ ифодани ҳосил қиласиз. Равшанки, $\vee \wedge'$ ифодадаги ҳар бир қўшилувчи ҳад келтирилмайдиган қобиқни ифодалайди.

1-мисол. Қўйидаги чинлик жадвалида берилган $f_2(x_1, x_2, x_3)$ функцияни кўрайлик:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$	x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1


Бу функция учун $N_f = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ түплем 6 та учдан (чүққидан) иборат. Уларни I, II, ..., VI сонлари билан белгилаймиз. Максимал интерваллари қирралардан иборат, уларни 1, 2, ..., 6 сонлари билан номерлаймиз (VII.3- шакл). 2- жадвални тузамиз.

2- жадвал

	0	I	II	III	IV	V	VI
1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	1	1	0
5	0	0	0	0	1	1	1
6	0	1	0	0	0	0	1

Бу ердан, $E_I = \{1, 6\}$, $E_{II} = \{1, 2\}$, $E_{III} = \{2, 3\}$, $E_{IV} = \{3, 4\}$, $E_V = \{4, 5\}$, $E_{VI} = \{5, 6\}$. Ү ҳолда

$$\begin{aligned}
 \vee \wedge &= (1 \vee 6)(1 \vee 2)(2 \vee 3)(3 \vee 4)(4 \vee 5)(5 \vee 6) = \\
 &= (1 \vee 2 \cdot 6)(3 \vee 2 \cdot 4)(5 \vee 4 \cdot 6) = \\
 &= (1 \cdot 3 \vee 2 \cdot 3 \cdot 6 \vee 1 \cdot 2 \cdot 4 \vee 2 \cdot 4 \cdot 6)(5 \vee 4 \cdot 6) = \\
 &= 1 \cdot 3 \cdot 5 \vee 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \vee 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 \vee 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \vee 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 \vee \\
 &\quad \vee 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 \vee 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \vee 2 \cdot 4 \cdot 6 = \\
 &= 3 \cdot 5 \vee 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \vee 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 \vee 1 \vee 3 \cdot 4 \cdot 6 \vee 2 \cdot 4 \cdot 6.
 \end{aligned}$$



Натижада 5 та келтирилмайдыган қобиққа ва уларга мөс 5 та тупикли ДНШга эга бўламиш:

$$\begin{aligned} D_1 &= \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_3, & D_2 &= \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3, \\ D_3 &= \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_3, & D_4 &= \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee x_2x_3 \vee x_1x_2 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3, \\ D_5 &= \bar{x}_1x_3 \vee x_1x_2 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3. \end{aligned}$$

Булардан D_1 ва D_5 минимал ДНШ бўлади.

Бу алгоритм кўп аргументли функциялар учун кўп меҳнат талаб қиласди ва амалда деярли ишлатилмайди.

9-§. Айрим ягона тарзда ҳосил қилинадиган дизъюнктив нормал шакллар

- Тупикли ДНШларни ясашини соддалаштириши. Икки ҳолат. Ягона тарзда тупикли ДНШни ҳосил қилиш алгоритми. Асосий қисми. Ядро. Квайн дизъюнктив нормал шакли. Теорема. ΣТ турдаги ДНШ. $D_{ΣT}$. Даста. Регуляр нуқта. Регуляр максимал интервал. Ю.Журавлев теоремаси. Теорема. Функцияни минималлаштириши жараёнининг схемаси.

Мукаммал дизъюнктив нормал шаклдан минимал дизъюнктив нормал шаклни ҳосил қилиш жараёнининг схемасини VIII.2- шаклда келтирган эдик.

Аввал қисқартирилган ДНШ олинади. Кейин ягона тарздағи жараён бутоқланишга ўтади, яғни ҳамма тупикли ДНШ ларни ясаш жараёнига ўтилади. Охири тупикли ДНШ лардан минимал ДНШ лар ажратыб олинади. Бу жарайённинг энт оғир қисми тупикли ДНШларни ясаш қисмидир (бутоқланиш қисми). Уни икки ҳолатда соддалаштириш мүмкін.

1. Тупикли ДНШ лар ясаш жараёнида қатнашмайдыган қисқартирилган ДНШ нинг айрим ҳадларини олдиндан четлаштириш керак. Натижада қисқартирилган ДНШнинг қолған ҳадларини бирма-бир күриш камаяди.

2. Қисқартирилган ДНШ нинг айрим ҳадларини шундай четлаштириш керакки, қолған қисмидан ҳеч бўлмагандан битта минимал ДНШ ясаш мүмкін бўлсин. Ушбу қадам ягона тарзда амалга ошиши мақсадга мувофиқ келади.


Ушбу параграфда шундай ягона тарзда тупикли ДНШни ҳосил қилишнинг иккита алгоритмини келтирамиз.

N_k интервал N_f тўпламнинг максимал интервали бўлсин.

1- таъриф. Агар N_f тўпламнинг шундай α нуқтаси мавжуд бўлсанки, $\alpha \in N_k$ ва α нуқта N_f нинг бошқа максимал интервалларининг элементи бўлмаса, у ҳолда N_k максимал интервал N_f нинг асосий қисми деб аталади.

1-мисол. Куйидаги жадвалда берилган $f_1(x_1, x_2, x_3)$ функцияни кўрайлик. VIII.4- шаклда N_f тўплам ва унинг N_1, N_2, N_3 максимал интерваллари (қирралари) акс эттирилган:

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



VIII.4- шакл.

Бу ерда $N_1 = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1)\}$, $N_2 = \{(0, 0, 1), (1, 0, 1)\}$ ва $N_3 = \{(1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ нүкта фақат N_1 интервал билан $(1, 1, 1)$ нүкта фақат N_3 интервал билан қопланғанлығы күриниб турибди. Демак, N_1 ва N_3 максимал интерваллар N , түплемнинг асосий қисмлари бўлади.

2-тaъриф. N_j түплемнинг ҳамма асосий қисмларидан (ёқларидан) тузилган түплем ядро деб аталади.

Келтирилган мисолда $\{N_1, N_3\}$, ядро бўлиши равшандир. Ядро ҳар бир келтирилмайдиган қобиқقا киради. Бу ердан ядро билан қопланадиган ёқ (қирра) ҳеч бир келтирилмайдиган қобиқقا кирмаслиги келиб чиқади.

3-тaъриф. Ядро билан қопланган максимал ёқларга (қирраларга) мос ҳамма оддий имплекантларни мукаммал ДНШдан (қисқартирилган ДНШдан) четлаштириши натижасида ҳосил қилинадиган ДНШ Квайн дизъюнктив нормал шакли деб аталади ва $D_{\text{кв}}$ деб белгиланади.

Америка олимси Квайн исбот қилган (1959) қуйидаги теоремани келтирамиз.

1-теорема. Ҳар бир айнан 0 га teng бўлмаган $f(x_1, \dots, x_n)$ функцияниң ягона Квайн дизъюнктив нормал шакли мавжуд бўлади.

2- мисол. 1- жадвалда берилган $f(x_1, x_2, x_3)$ функциянынг қисқартирилган ДНШ қуидагича бўлади:

$$D_c = \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee \bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2.$$

$\{N_1, N_3\}$ ядро N_2 ёкни (қиррани) қоплайди. N_2 га \bar{x}_2x_3 оддий импликант мос келади. Таърифга асосан, бу оддий импликантни қисқартирилган ДНШ ифодасидан четлаштирсак, Квайн ДНШ келиб чиқади:

$$D_{\text{кв}} = \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee x_1x_3.$$

Демак, қисқартирилган ДНШ дан айрим оддий импликантларни четлаштириш йўли билан ягона тарзда аниқланган Квайн ДНШга ўтиш мумкин. Квайн ДНШ ўша функцияни реализация қиласди ва бу функциянынг ҳамма тупикили ДНШларини ўз ичига олган бўлади.


4-таъриф. Ҳеч бўлмагандага бирорта келтирилмайдиган қобиқча кирувчи шундай максимал ёқлар мажмуаси билан қопланган N_f тўпламга мос дизъюнктив нормал шакл ΣT турдаги ДНШ деб аталади ва у $D_{\Sigma T}$ орқали белгиланади.

$f(x_1, \dots, x_n)$ функциянынг ҳамма тупикили ДНШларининг дизъюнкцияси (мантикий йигиндиси) ва уни соддалаштириш натижасида $D_{\Sigma T}$ дизъюнктив нормал шакл ҳосил бўлади.

Таърифга асосан, ҳар бир $f(x_1, \dots, x_n)$ функция учун ягона $D_{\Sigma T}$ ДНШ мавжуд ва у $f(x_1, \dots, x_n)$ ни реализация қиласди. $D_{\Sigma T}$ ДНШ қисқартирилган ДНШдан айрим ҳадларини четлаштириш йўли билан ҳосил қилинади.

5-таъриф. $\alpha \in N_f$ бўлсин. У ҳолда α нуқтани ўз ичига олган ҳамма N_f га нисбатан максимал ёқларнинг (қирраларнинг) P_α мажмуаси α нуқтадан ўтувчи даста (туташ) деб аталади.

6-таъриф. $\alpha \in N_f$ ва $\alpha \in N_k^0$ бўлсин. N_k^0 шу N_f тўпламнинг максимал ёғи (қирраси). Агар $\beta \in N_f \setminus N_k^0$ ва $P_\beta \in P_\alpha$ бўлса, у ҳолда α нуқта (N_k^0 ва N_f га нисбатан) регуляр нуқта деб аталади.



VIII.5- шакл.

3- мисол. 1- жадвалда берилген $f(x_1, x_2, x_3)$ функция үчун (VIII.4- шаклға к.) α нүкта сифатида $(0, 0, 1)$ ни ва N_2 максимал ёқни оламиз. Равшанки, $\alpha \in N_2 = \{(0, 0, 1), (1, 0, 1)\}$. α регуляр нүкта (N_2 ва N_3 га нисбатан) эканлигини күрсатамиз. $\beta = (0, 0, 0)$ бўлсин. У ҳолда ($N_1 = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1)\}$)

$$\Pi_\alpha = \{N_1, N_2\}, \quad \Pi_\beta = \{N_1\} \text{ ва } \Pi_\beta \subseteq \Pi_\alpha.$$

Демак, α нүкта регуляр нүкта бўлади.

7-таъриф. Агар N_k^0 максимал интервалнинг ҳар бир нуқтаси (N_k^0 ва N_f га нисбатан) регуляр нуқта бўлса, у ҳолда N_f учун N_k^0 **регуляр максимал интервал** деб аталади.

Ю.И.Журавлёв теоремаси. $f(x_1, x_2, x_3)$ функция-нинг K^0 оддий импликанти D_{Σ} турдаги ДНШнинг ифодасида бўлмаслиги учун унга мос N_k^0 интервал регуляр максимал интервал бўлиши етарли ва зарурдир.

5-мисол. 1-жадвалда берилган $f(x_1, x_2, x_3)$ функция учун битта N_2 регуляр интервал мавжуд. Уни четлаштирасак, у ҳолда $N_1 \cup N_3$ га эга бўламиз. Бу ердан $\bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_3$ келиб чиқади ва у D_{Σ} турдаги ДНШ бўлади. Бу ДНШ функциянинг ягона тупики ДНШ ҳам бўлади.

3-теорема. $f(x_1, x_2, x_3)$ функциянинг Σ турдаги ДНШ шу функциянинг Квайн ДНШдан айрим оддий импликантларни четлаштириши йўли билан ҳосил қилинishi мумкин.

Шундай қилиб, $f(x_1, x_2, x_3)$ функцияни минималлаштириш жараёнини VIII.5-шаклда акс эттирилган схема орқали ифодалаш мумкин.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Куйидаги жадвал билан берилган $f(x_1, x_2, x_3)$ функцияларнинг мукаммал, қисқартирилган, Квайн, Σ турдаги, тупикили ва минимал дизъюнктив нормал шаклларини топинг.

x_1	x_2	x_3	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0

2. Берилган ДНШларнинг мукаммал, қисқартирилган, тупикли ва минимал дизъюнктив нормал шаклларини топинг:
 - а) $D = \bar{x}_1\bar{x}_2 \vee x_1\bar{x}_3x_4 \vee x_2\bar{x}_3x_4$; б) $D = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2x_4 \vee x_3x_4$.
3. Берилган КНШ ларнинг мукаммал, қисқартирилган, тупикли ва минимал дизъюнктив нормал шаклларини топинг:
 - а) $(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$;
 - б) $(x_1 \vee x_4)(x_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.
4. Куйидаги функцияларнинг ҳамма тупикли ДНШ ларини топинг:
 - а) $f(x_1, x_2, x_3) = (01111110)$; б) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1110011000010101)$;
 - в) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0110101110101011)$.
5. Куйидаги дизъюнктив нормал шакллар тупикли, энг қисқа ва минимал ДНШ бўладими ёки йўқми эканлитини кўрсатинг:
 - а) $x_1x_2 \vee \bar{x}_2$; б) $\bar{x}_3\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2x_4 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3$;
 - в) $x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3x_4 \vee x_2x_3$.
6. а) $f_1(x, y, z) = x + y + z$; б) $f_2(x, y, z) = (x \rightarrow y) \leftrightarrow z$;
 в) $f_3(x, y, z, t) = (xy \vee \bar{z}) \rightarrow t$; г) $f_4(x, y, z) = x \rightarrow y \rightarrow z$;
 д) $f_5(x, y, z) = (x \vee y) \leftrightarrow z$; е) $f_6(x, y, z) = xz \rightarrow y$;
 ж) $f_7(x, y, z) = (x \leftrightarrow y) \rightarrow z$; з) $f_8(x, y, z) = (x \leftrightarrow y) \leftrightarrow z$;
 и) $f_9(x, y, z) = (x \rightarrow y) \vee z$

Функцияларга мос N_{f_i} ($i = \overline{1, 9}$) тўпламларни топинг ва уларни тупикли ДНШ кўринишига келтиринг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Тупикли дизъюнктив нормал шаклга келтириш алгоритми.
2. Келтирилмайдиган қопламалар ҳақида тушунча.
3. Қисқартирилган, тупикли ва минимал ДНШ лар орасидаги муносабатлар.
4. Ҳамма тупикли ДНШларни топишнинг геометрик ғояларга асосланган алгоритми.
5. Тупикли ДНШларни ясашни соддалаштириш. Ягона тарзда тупикли ДНШни ҳосил қилиш алгоритми.
6. Қвайн дизъюнктив нормал шакли. Ю.Журавлёв теоремаси.
7. Функцияни минималлаштириш жараёнининг схемаси.

Бу бобда графлар назариясининг элементлари ёритилган. Бу ерда оддий графлар, графларнинг изоморфлиги, маршрутлар, занжирлар, циклар, боғлиқлилик, дараҳтлар, мультиграфлар, Эйлер графлари, хроматик сон ва хроматик синф, түрлар ва түрдаги оқимлар, Форд–Фалкерсон теоремаси каби масалалар қараб чиқилган.

1- §. Оддий графлар. Таъриф ва мисоллар¹


- Граф. Қирралар. Учлар. Йўналтирилган, йўналтирилмаган қирралар. Инцидент. Оддий графлар. Графнинг тўлдирувчиси. Қисм граф. Суграф.*

Графлар назарияси ҳозирги замон математикасининг асосий қисмларидан биридир. Кейинги пайтларда турли хил АБТ ва дискрет характерга эга бўлган ҳисоблаш қурилмаларини лойиҳалашда (ясашда) графларнинг роли янада ошиди.

Графнинг ўзи нима? Таъриф беришдан аввал уни куйидаги мисолда тушунтирамиз.

IX.1- шакл учлари 1, 2, 3, 4, 5 рақамлари билан белгиланган доирачалардан, қирралари (йўналишга эга ёки йўналишсиз) эса бу доирачаларнинг баъзи бирларини туташтирувчи $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k$ чизиклардан иборат. a қирра йўналтирилган бўлиб, 1 ва 2 учларни туташтиради (лекин 2 ва 1 учларни туташтиrmайди); $\{j\}$ деб аталувчи бу қирраларга e, f, g лар ҳам мисол бўла олади. h қирра йўналтирилмаган бўлиб, у 1 ва 4 ҳамда 4 ва 1 учларни туташтиради; звенолар деб аталувчи бундай қирраларга i ва j лар ҳам кира-

¹ Ушбу боб доцент F.Э.Эргашевнинг маъruzалар матнидан фойдаланиб ёзилди.



IX.1- шакл.

ди. Нихоят, b , c , d , k қирралар сиртмоқлар деб аталади ва баъзи учни унинг ўзи билан туташтиради (бу қирралар ҳам йўналишга эга эмас).


Одатда a , b , e , f , g , h қирраларни 1 учга инцидент деб атайдилар, ўз навбатида бу уч шу қирраларнинг ҳар бирига инцидентдир. Шу билан бирга e , f ёйлар 1 учдан 4 га қараб йўналтирилган, g эса, аксинча, 4 дан 1 га қаратада йўналтирилган. 3 ва 5 учлар яккаланган дейилади (улар кўпи билан сиртмоқларга инцидент бўлиши мумкин).

Бу мисолдаги граф чеклидир: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ учлар ва $\{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k\}$ қирралар тўпламларининг иккаласи ҳам чекли.

Келгусида *оддий графлар* муҳим ўрин тутади. Бу синфнинг графлари қуйидаги хоссаларга эга: у чекли, барча қирралари ориентиранмаган, сиртмоқлари ва каррали қирралари йўқ (исталган иккита уч биттадан кўп звено билан туташтирилмайди).

Бундай графларга қуйидагилар мисол бўла олади (IX.2- шакл).

Петерсен номи билан аталувчи ўнг томондаги граф қирраларининг дойирачалар билан белгиланмаган кесишган жойлари унинг учлари эмасдир.



IX.2- шакл.

1-таъриф. Бўш бўлмаган X учлар тўплами ва $U \subseteq X^{(2)}$ қирралар тўпламидан тузилган тартибланганди $G = (X, U)$ жуфтлик оддий граф дейилади.

Агар $x, y \in X$ учлар учун $xy \in U$ бўлса, учлар қўшни, агар $xy \notin U$ бўлса, бу учлар қўшнимас дейилади.

Таърифдан бевосита кўринадики, агар учлар сони $|X| = n(G)$ бўлса, у ҳолда қирралар сони $m(G)$ учун қуйидаги тенгсизлик ўринлидир:


$$0 \leq m(G) \leq \left(\frac{n(G)}{2} \right).$$

Оддий графларнинг қуйидаги иккита ҳолини алоҳида айтиб ўтамиш:

E_n – n учли бўш граф: $U(E_n) = \emptyset$;

F_n – n учли тўлиқ граф: $U(F_n) = X^{(2)}$.


IX.3- шаклда E_5 ва F_5 графлар келтирилган.



IX.3- шакл.

2-тәріф. Учлари $G = (X, U)$ графнинг учларидан, қирралары эса $U \subseteq X^{(2)} \setminus U$ түпнамдан иборат бўлган граф $\bar{G} = (X, \bar{U})$ берилган графнинг тўлдирувчиси дейилади.


Равшанки, $\bar{\bar{G}} = G$. IX.3- шаклдаги E_5 ва F_5 бир-бирини тўлдирувчи графлардир. Уларга яна мисол келтирамиз (IX.4- шакл).



IX.4- шакл.

3-тәріф. Агар $G = (X, U)$ ва $G' = (X', U')$ графлар учун $X' \subseteq X$, $U' \subseteq U$ бўлса, у ҳолда G' граф G нинг бўлаги дейилади.

Масалан, IX.5- шаклдаги графлар IX.4- шаклдаги биринчи графнинг бўлакларидир.



IX.5- шакл.

4-тәріф. Агар $G = (X, U)$ графнинг бўлаги $G' = (X', U')$ учун $U' = \{xy/x, y \in X\}$ бўлса, у ҳолда у қисм граф дейилади.

Бошқача қилиб айтганда, қисм графни ҳосил қилиш учун $X \setminus X'$ учлар тўплами билан уларнинг камидаги биттасига инцидент бўлган қирралар олиб ташланади.


Масалан, IX.4- шаклда келтирилган графнинг қисм графларидан баъзилари IX.6- шаклдаги графлардан иборат.



IX.6- шакл.

5- таъриф . Агар $G = (X, U)$ графнинг бўлаги $G' = (X', U')$ учун $X' = X$ бўлса, у ҳолда у суграф дейилади, яъни суграфларни ҳосил қилиш учун фақат қирраларни олиб ташлаш кифоя.

Яна IX.4- шаклдаги мисолга мурожаат қиласиз. Куйидаги графлар унинг суграфларидир (IX.7- шакл).



IX.7- шакл.

2- §. Графларнинг изоморфлиги

Графлар изоморфизми. Изоморф графлар. Кўшилилк муносабати.

$G = (X, U)$ ва $G' = (X', U')$ графлар берилган бўлсин. Қайси ҳолда уларнинг иккаласи битта графни ифодалайди деган саволга жавоб беришга уринамиз. Бу масала графларнинг изоморфизми тушунчаси билан чамбарчас боғлиқдир.


Таъриф. Агар G ва G' графлар учлари түп搭乘лари X ва X' орасида ўзаро бир қийматли ва учларнинг қўшинилик муносабатини сақладиган мосликни (\Leftrightarrow) ўрнатиш мумкин бўлса, яъни $\forall x, y \in X$ ва уларга мос $x', y' \in X'$ ($x \Leftrightarrow x', y \Leftrightarrow y'$) учун $x y \in U \Leftrightarrow x' y' \in U'$ бўлса, у ҳолда бу графлар изоморф дейилади.

Куйидаги графлар берилган бўлсин (IX.8- шакл):

$$G_i = (X_i, U_i), (i = 1, 2, 3, 4),$$

бу ерда

$$\begin{array}{ll} X_1 = \{1, 2, 3, 4\}, & U_1 = \{12, 13, 23, 34\}; \\ X_2 = \{a, b, c, d\}, & U_2 = \{ab, ac, bc, cd\}; \\ X_3 = \{1, 2, 3, 4\}, & U_3 = \{12, 23, 34, 14\}; \\ X_4 = \{1, 2, 3, 4\}, & U_4 = \{13, 23, 14, 24\}; \end{array}$$



IX.8- шакл.

Умуман олганда, бу графларнинг тўрталаси ҳар хилдир. $G_1 \neq G_2$, чунки $X_1 \neq X_2$; $G_3 \neq G_4$, чунки $U_3 \neq U_4$. Лекин кўриниб турибдики, G_1 ва G_2 бир хил тузилишга (структурага) эта, шу жумладан, G_3 ва G_4 ҳам бир хил тузилишга эга. Агар изоморфликни \approx билан ва изоморф эмасликни \neq билан белгиласак: $G_1 \approx G_2$, $G_3 \approx G_4$, $G_1 \neq G_3$, $G_1 \neq G_4$, $G_2 \neq G_3$, $G_2 \neq G_4$ эканлигини кўрамиз.

Масалан, $G_1 \approx G_2$ ни қуйидагича аниқлаш мумкин:

$$1 \Leftrightarrow a, 2 \Leftrightarrow b, 3 \Leftrightarrow c, 4 \Leftrightarrow d;$$

у ҳолда

$$\begin{array}{ll} 12 \in U_1 \text{ ва } ab \in U_2, & 13 \in U_1 \text{ ва } ac \in U_2, \\ 14 \notin U_1 \text{ ва } ad \notin U_2, & 23 \in U_1 \text{ ва } bc \in U_2, \\ 24 \notin U_1 \text{ ва } bd \notin U_2, & 34 \in U_1 \text{ ва } cd \in U_2, \end{array}$$

яъни $xy \in U_1 \Leftrightarrow x'y' \in U_2$ шарт бажарилади.

Ўқўчига

$$1 \Leftrightarrow b, 2 \Leftrightarrow a, 3 \Leftrightarrow c, 4 \Leftrightarrow d$$

мослик ҳам G_1 ва G_2 графларнинг изоморфизми эканлигини текширишни тавсия қиласиз. Шу билан бирга учларнинг қолган $4! - 2 = 22$ та мосликлари изоморфизм эмаслигини айтиб ўтамиш.

G_3 ва G_4 графларнинг изоморфизмини масалан, куйидагича ўрнатиш мумкин:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & - & G_3 \text{ графда} \\ \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & & \\ 1 & 3 & 2 & 4 & - & G_4 \text{ графда} \end{array}$$

(бу графларнинг бошқа изоморфизмларини аниқланг).

$G_1 \neq G_3$ эканлигини осонгина аниқлаш мумкин. Масалан, G_1 графнинг 4 учи фақат битта уч билан кўшни, G_3 да эса бундай уч умуман йўқ.

3- §. Мультиграфлар

Параллел қирралар. Сиртмоқ. Инцидентлик матрицаси. Мультиграф.

Энди умумий ҳолда чекли, ориентирлаштирилмаган графларни киритамиш.

Таъриф. Граф деб $G = (X, U, \psi)$ тартибланган учликка айтилади, бу ерда $X \neq \emptyset$ – учлар тўплами, U – қирралар тўплами (иккаласи ҳам чекли) ва $\psi: U \Rightarrow X^2$ акслантириши ҳар бир $u \in U$ қирра учун унинг x , $y \in X$ учларига тартибланмаган $\psi(u) = xy$


жуфтликни мос құяды. Агар $\psi(u) = xx$ бўлса, у ҳолда и қирра x учдаги сиртмоқ, $\psi(u) = x$, $u \wedge x \neq u$ бўлса, у звено дейилади. Агар x ва y учларнинг иккаласи камида битта умумий инцидент қиррага эга бўлса, улар қўшни дейилади. Ҳусусий ҳолда, агар x учда камида битта сиртмоқ бўлса, у ўз-ўзи билан қўшини дидир.

Агар u ва v қирралар учун $u \neq v \wedge \psi(u) = \psi(v)$ бўлса, у ҳолда улар параллел (карралы) дейилади.

Агар графнинг учлари $X = \{1, 2, \dots, n\}$ каби тартиблантган бўлса, у ҳолда уни $A(G) = (\alpha_{ij})$ қўшнилиқ матрицаси ёрдамида бериш мумкин, бу ерда $\alpha_{ij} =$ шу i ва j учларни туташтирувчи қирралар сони. Албаттa, бу матрица граф учларининг тартибланишига боғлиқ ва уни параллел қирраларни жойлашиш тартиби аниқлигигина тиклайди. Инцидентлик матрицаси $B(G) = (\beta_{ij})_m^n$ бўйича графни ятона равишда тиклаш мумкин:

$$B_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{агар } i \text{ уч ва } j \text{ қирра инцидент бўлса,} \\ 0, & \text{акс ҳолда.} \end{cases}$$

Бу ерда $i = 1, 2, \dots, n$; $j = 1, 2, \dots, m$ ва қирралар ҳам тартиблантган деб ҳисобланади: $U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$.



IX.9- шакл.

IX.9- шаклда учлари $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, қирралари $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ бўлган $G = (X, U, \psi)$ граф (мультиграф) берилган. Акслантириш ψ эса қуйидагича аниқланган:

$$\begin{aligned}\psi(a) &= \psi(b) = \psi(c) = 14, \quad \psi(d) = 12, \quad \psi(e) = \psi(f) = 22, \\ \psi(g) &= \psi(h) = 35.\end{aligned}$$

Бу граф учун

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4- §. Маршрутлар, занжирлар, цикллар. Боғлиқлилик

Маршрут. Циклик маршрут. Занжир. Цикл. Содда занжир. Туташтирилган учлар. Боғлиқли график. Кўшилилк матрицаси. Такомиллаштирилган кўшилилк матрицаси.

1-таъриф. *Оддий $G = (X, U)$ графикаги*


$$x_0 u_1 x_1 u_2 x_2 u_3 x_3 \dots x_{l-1} u_l x_l$$

кетма-кетлик (бу ерда $x_0, x_1, \dots, x_l \in X$; $u_1, u_2, \dots, u_l \in U$) узунлиги l тенг бўлган ва x_0, x_l учларни туташтирувчи маршрут дейилади.

Агар $x_0 = x_l$ ва $l \geq 1$ бўлса, маршрут циклик дейилади. $l = 0$ маршрут битта x_0 учдан иборат бўлади ва у циклик хисобланмайди.

Маршрутда учлар ва қирраларнинг ҳар хил бўлиши талаб қилинмайди. Битта уч ёки қирра бир неча марта тақорроланиши мумкин.

2-таъриф. *Қирралари ҳар хил бўлган маршрут занжир деб аталади. Циклик занжир эса цикл дейилади. Агар занжирда (циклда) x_0 ва x_l лардан ташқари барча учлари ҳар хил бўлса, у ҳолда у содда занжир (цикл) дейилади.*



IX.10- шакл.

IX.10- шаклдаги графда $3w2u1w3p4t5t4t5$ ва $3w1u2v3p4t5t4t5$ маршрутлар бир хил элементлардан түзилген бўлса-да, лекин ҳар хиллар. Улар циклик эмас ва занжир ҳам эмасдир. $3w1u2v3p4$ маршрут занжир, лекин содда эмас ва циклни ташкил этмайди. $3w1u2v3p4s6r7q3$ ва $3v2u1w3p4s6r7q3$ ҳар хил содда бўлмаган цикллар. $3q7r6s4p3$ маршрут содда циклдир. $1u3v2$ кетма-кетлик умуман маршрут эмас.

3- таъриф. Агар G графнинг x ва y учлари орасида ҳеч бўлмаганда битта занжир мавжуд бўлса, у ҳолда улар туташтирилган дейилади.

Равшанки, графнинг учлари тўпламида берилган «туташтирилганлик» муносабати рефлексивлик, симметриклик ва транзитивлик хоссаларига эта. Демак, бу муносабат эквивалентликдир ва графнинг X учлари тўпламини X_1, X_2, \dots, X_k синфларга ажратади. Ҳар бир синфга тегишли бўлган учлар ўзаро туташтирилгандир (турли синфларга тегишли бўлган учлар орасида занжирлар йўқ).

$G = (X, U)$ графнинг $G_i = (X_i, V_i)$ ($i = 1, 2, \dots, k$) қисм графи унинг бөглиқли компонентаси дейилади. Агар $k(G) = 1$ бўлса, граф бөглиқли дейилади.

Бөглиқли G графнинг учлари тўплами X да масофа тушунчасини киритиш мумкин: i ва j учлар орасидаги масофа деб

$$d(i, j) = \min l_{i,j}$$

га айтилади, бу ерда $l_{[i,j]}$ шу $[i, j]$ занжирнинг узунлиги ва минимум барча $[i, j]$ занжирлар бўйича олинади (албатта, бу минимум содда занжирларда эришилади).

Киритилган $d(i, j)$ учун масофанинг барча хоссалари (аксиомалари) бажарилади:

- 1) $d(i, i) = 0, d(i, j) > 0 \ (i \neq j);$
- 2) $d(i, j) = d(j, i);$
- 3) $d(i, j) + d(j, k) \geq d(i, k).$

Демак, X тўплам метрик фазони ташкил этади.


$G = (X, U, \psi)$ мультиграф берилган бўлсин, бу ерда $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ ва $A(G) = (\alpha_{ij})$ қўшнилик матрицаси. Графнинг x_i ва x_j учларини туташтирувчи узунлиги $l \geq 1$ бўлган турли хил маршрутлар сонини ва уларнинг ўзларини аниқлаш масаласини қараймиз. Бу сон $[A(G)]^l = (\alpha_{ij}^{(l)})$ матрицанинг $\alpha_{ij}^{(l)}$ элементига тенг.

Ҳақиқатан ҳам, $l = 1$ бўлганда, бу ўз-ўзидан равшан. Фарз қиласилик, $\alpha_{ik}^{(l)}$ берилган x_i ва x_k учларни туташтиручи l узунликдаги маршрутлар сони бўлсин. Унда x_i ва x_j учларни туташтирувчи ва узунликлари $l+1$ бўлган (охирдан олдинги x_k учни танлаб олган ҳолда) маршрутлар сони $\alpha_{ik}^{(l)} \alpha_{kj}^{(l)}$ га тенг, умумий ҳолда эса барча маршрутлар сони матрица-

лар кўпайтмаси қоидасига асосан $\sum_{k=1}^n \alpha_{ik}^{(l)} \alpha_{kj}^{(l)} = \alpha_{ij}^{(l+1)}$ га тенг.

IX.11- шаклдаги граф учун


$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & 14 & 1 & 3 & 0 \\ 6 & 1 & 5 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 42 & 3 & 9 & 0 \\ 42 & 15 & 31 & 18 & 0 \\ 3 & 31 & 5 & 9 & 0 \\ 9 & 18 & 9 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}, \dots;$$



IX.11- шакл.

масалан, x_1 уч билан x_4 учни туташтирувчи узунліктари 2 га тенг бўлган учта маршрут $(x_1u_1x_2u_8x_4, x_1u_2x_2u_8x_4, x_1u_3x_2u_8x_4)$ бор ва бу учларни туташтирувчи узунліктари 3 га тенг тўққизта маршрут $(x_1u_1x_2u_4x_3u_6x_4, x_1u_1x_2u_5x_3u_6x_4, x_1u_2x_2u_4x_3u_6x_4, x_1u_2x_2u_5x_3u_6x_4, x_1u_3x_2u_4x_3u_6x_4, x_1u_3x_2u_5x_3u_6x_4, x_1u_1x_2u_8x_4u_7x_4, x_1u_2x_2u_8x_4u_7x_4, x_1u_3x_2u_8x_4u_7x_4)$ мавжуд, x_5 учни ўзи билан бөғловчи узунлиги 2 га тенг тўртта маршрут $(x_1u_9x_5u_9x_5, x_5u_9x_5u_{10}x_5, x_5u_{10}x_5u_{10}x_5, x_5u_{10}x_5u_9x_5)$ бор ва ҳоказо.

Маршрутларнинг ўзларини аниқлаш усулини (ҳисоблашлари кўплиги сабабли) содда мисолда кўрсатамиз (IX.12- шакл).



IX.12- шакл.

Бу графнинг такомиллаштирилган қүшнилик матрицасини тузамиз:

$$A(u) = (a_{ij}(u)) = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & 0 & c+d \\ 0 & c+d & 0 \end{pmatrix},$$

бу ерда $a_{ij}(u)$ – шу i ва j учларни туташтирувчи қирраларнинг шартли йифиндиси. Қирралар белгиларини (a, b, c, d) нокоммутатив (лекин ассоциатив) ярим ҳалқанинг ясовчилари деб қабул қиласиз.

$A(u)$ матрицанинг кетма-кет даражаларини топамиз:

$$[A(U)]^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ab & bc + cd \\ ba & b^2 + c^2 + d^2 + cd + dc & 0 \\ cd + db & 0 & c^2 + d^2 + cd + dc \end{pmatrix},$$

$$[A(U)]^3 = \begin{pmatrix} a^3 + b^2a + ab^2 & a^2b + b^3 + bc^2 + & abc + abd \\ & bcd + bdc + bd^2 & \\ ba^2 + b^3 + c^2b + & bab & b^2c + c^3 + d^2c + cdc + \\ d^2b + cdb + dc & & + dc^2 + b^2d + c^2d + \\ & cd^2 + db^2 + c^3 + d^2c + & + d^3 + cd^2 + dc \\ cba + dba & + cdc + dc^2 + c^2d + & 0 \\ & + d^3 + cd^2 + dc & \end{pmatrix},$$

Масалан, $[A(U)]^3$ матрицанинг $a_{21}^{(3)}(U) = ba^2 + b^3 + c^2b + d^2b + cdb + dc$ элементи x_2 билан x_1 ни туташтирувчи узунлиги 3 га тенг бўлган олтита маршрутни аниқлайди:

$$\begin{array}{lll} x_2bx_1ax_1ax_1, & x_2bx_1bx_2bx_1, & x_2cx_3cx_2bx_1, \\ x_2dx_3dx_2bx_1, & x_2cx_3dx_2bx_1, & x_2dx_3cx_2bx_1. \end{array}$$

Агар бизни x_i дан x_j га I қадамлар билан ўтиш масаласи көзіңдірса, бутун мусбат сонлар ярим ҳалқасига $2 = 1$ буль муносабатини киритамиз. У ҳолда, агар x_i дан x_j гача камида битта узунлиги I га тенг бўлган маршрут бўлса, $[A(G)]^I$ матрицанинг $\alpha_{ij}^{(I)}$ элементи 1 га, акс ҳолда 0 га тенг. IX.11-шаклдаги граф учун

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^4 = A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Агар x_i дан x_j гача I дан кўп бўлмаган қадамлар билан ўтиш масаласини кўрсак, у ҳолда $A + E$ (E_n^n – бирлик матрица) матрицанинг даражаларини қараймиз. Юқоридаги мисолда

$$A + E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


$$(A + E)^2 = (A + E)^3 = \dots = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Бу усул билан графнинг барча боғлиқлик компоненталарини ҳам топиш мумкин.



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. IX.13- шаклда кўрсатилган иккита графнинг изоморфлигини исботланг.



IX.13- шакл.

2. Бир-бiri билан аразлаган учта қўшнининг учта умумий қудуқлари бор. Ҳар бир уйдан ҳар бир қудуққа бир-бiri билан кесишибайдиган йўл ўтказиш мумкинми? Жавобини изоҳланг.
3. Бешта тўғри кўп қиррали графлар учларининг сони ва даражасини аниқланг.
4. Тўғри кўп қиррали графлар учун қўшнилик ва инцидентлик матрицаларини тузинг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқтар

1. Оддий графлар. Қирралар, учлар. Йўналтирилган ва йўналтирилмаган қирралар. Инцидент.
2. Графнинг тўлдирувчиси. Қисм граф. Суграф.
3. Графлар изоморфизми. Изоморф графлар. Қўшнилик муносабати.
4. Мультиграфлар.
5. Маршрутлар, занжирлар, цикллар. Боелиқлилик.

5- §. Даражтлар

- Циклик ва ациклик қирра. Цикломатик сон. Даражт. Погона учлари. Графнинг асоси. Ватар. Чекли даражтда қирралар сони учлар сонидан битта камлиги ҳақида.

1-таъриф. Агар G графнинг и қирраси камида битта циклга тегишили бўлса, у циклик қирра, акс ҳолда ациклик қирра деб аталади. G граф учун

$$\lambda(G) = m(G) - n(G) + k(G)$$

(бу ерда $m(G)$ – берилган G нинг қирралари сони, $n(G)$ – учлари сони ва $K(G)$ – компоненталари сони) ифода унинг цикломатик сони деб аталади.

Осонгина кўрсатиш мумкинки:


$$K(G \setminus u) = \begin{cases} K(G), & \text{агар } u \text{ циклик қирра бўлса,} \\ K(G) + 1, & \text{агар } u \text{ ациклик қирра бўлса;} \end{cases}$$

$$\lambda(G \setminus u) = \begin{cases} \lambda(G) - 1, & \text{агар } u \text{ циклик қирра бўлса,} \\ K(G), & \text{агар } u \text{ ациклик қирра бўлса.} \end{cases}$$

Ўз-ўзидан равшанки, $n(G \setminus u) = n(G)$, $m(G \setminus u) = m(G) - 1$, $\lambda(G) \geq 0$ ва факат цикллари бўлмаган граф учун $\lambda(G) = 0$.

2-таъриф. Барча қирралари ациклик бўлган боелиқлик граф даражт деб аталади.

Дарахтнинг исталган иккита учи ягона занжир билан боғлангандир. Дарахтнинг исталган x_0 учини танлаб олиб, уни илдиз ёки нолинчи погонали уч деб атаймиз. x_0 га қўшни бўлган барча учларни биринчи погона учлари деймиз ва ҳоказо $i - 1$ погонадаги учларга қўшни (бошқа поғоналарга тегишли бўлмаган) учларни i погона учлари деб атаймиз (IX.14- шакл).



IX.14- шакл.

Дарахтнинг бундай тасвирланишидан келиб чиқадики, у четки (фақат битта қиррага инцидент бўлган) учларга эга. Масалан, охирги погонанинг учлари.

Боғлиқли G графдан кетма-кет барча циклик қирраларни олиб ташлаймиз. Натижада, ҳамма қирралари ациклик бўлган боғлиқли H графни – дарахтни ҳосил қиласиз. Бу дарахт G графикнинг асоси дейилади. Графнинг асоси ягона танланмайди, лекин барча ациклик қирралар исталган асосга киради. H асосга нисбатан $G \setminus H$ бўлакнинг барча қирралари *ватарлар* деб аталади.

H дарахтдан четки учни (автоматик тарзда қиррани) олиб ташласак, яна дарахтни ҳосил қиласиз. Агар H чекли бўлса, $n(H) - 2$ қадамдан кейин битта қирра ва иккита учга эга дарахтни ҳосил қиласиз. Дарахтдан олиб ташланган учлар ва қирралар сони бир хил бўлганлиги сабабли қуйидаги холосага келамиз: *ҳар қандай чекли дарахтда қирралар сони учлар сонидан битта кам*. Аксинчаси ҳам, яъни қуйидаги теорема ўринлидир.


Теорема. Чекли боғлиқли G граф дараҳт бўлиши учун унинг қирралари сони учлари сонидан биттага кам бўлиши зарур ва етарли.

Учлари $1, 2, 3, \dots, n$ рақамлари билан тартибланган n учли дараҳт берилган бўлсин. Дараҳтнинг четки учлари орасидағи энг кичик номерлisi i_1 ва у билан қўшни бўлган ягона уч j_1 бўлсин. Дараҳтдан i_1 учни, демак, $i_1 j_1$ қиррани олиб ташлаймиз. Ҳосил бўлган дараҳтда энг кичик номерли четки i_2 учни ва $i_2 j_2$ қиррани олиб ташлаймиз ва ҳоказо. Бу жараённи $n - 2$ марта такрорлаб, икки уч ва битта қиррали дараҳтни ҳосил қиласиз. Олиб ташланган учларни $I = \{i_1, i_2, \dots, i_{n-2}\}$ ва $J = \{j_1, j_2, \dots, j_{n-2}\}$ билан белгилаймиз. Бу иккала I ва J мажмуя берилган дараҳт бўйича ягона равишда аниқланади, шу билан бирга I нинг барча сонлари ҳар хил, J ники эса ҳар хил бўлиши шарт эмас (IX.15- шакл).

Бу дараҳт учун $I = \{2, 3, 5, 7, 8, 9, 1, 4\}$ ва $J = \{3, 4, 4, 8, 10, 1, 4, 6\}$.

Шу билан бирга ҳар қандай $J = \{j_1, j_2, \dots, j_{n-2}\}$ ($1 \leq j_k \leq n$) мажмуя битта дараҳтга мос келади. Уни қуйидагича қуриш мумкин.

$N = \{1, 2, \dots, n\}$ тўпламнинг J да қатнашмаган сонларининг энг кичигини i_1 билан белгилаймиз (бундай сон ҳамма вақт мавжуд, чунки J да $n - 2$ та сон бор). i_1 ва j_1 учларни



IX.15- шакл.

қирра билан туташтирамиз, j_1 ни J дан, i_1 ни эса N дан ўчирамиз ва жараённи такрорлаймиз: $J_1 = \{j_2, j_3, \dots, j_{n-2}\}$ мажмуада қатнашмаган $N_1 = N \setminus \{i_1\}$ нинг энг кичик сонини i_2 билан белгилаймиз; i_2, j_2 учларни қирра билан туташтирамиз ва уларни мос равишда N_1 ва J_1 дан ўчирамиз ва ҳоказо. Охирида N_{n-2} да қолган иккита учни қирра билан туташтирамиз.


Бундан кўринадики, ҳар қандай $k = 1, 2, \dots, n-2$ учун k қадамдан кейин ясалган қирралар ичida i_k га инцидент бўлғанлари йўқ, лекин j_k га инцидент бўлған камида битта қирра мавжуд. Буни назарда тутган ҳолда, жараённи тескари тартибда бажариб, k бўйича индукцияни қўллаб, ҳақиқатан ҳам дараҳт ҳосил бўлишини кўрсатамиз (чунки ҳар гал битта қирра янги, четки уч билан кўшилади).

Шунга ўхшашиб индукция бўйича, лекин тўғри тартибда куриб исботлаш мумкинки, ушбу дараҳтга айнан J мажмуа мос келади.

Юқоридаги жараёндан кўринадики, ҳар хил дараҳтларга турли хил (J, J) жуфтликлар мос келади. Агар $I \neq I'$ бўлса, у ҳолда $J' \neq J''$. Ҳақиқатан ҳам, $i'_k \neq i''_k$ ва $i'_k < i''_k$ бўлса, у ҳолда i'_k сон (j'_1, \dots, j'_{n-2}) га кирмайди, лекин у $(j''_1, \dots, j''_{n-2})$ га киради. Шунинг учун ҳар хил дараҳтларга ҳар хил J кўринишдаги мажмуалар мос келади. Шундай қилиб, куйидаги теорема исбот қилинди.

Теорема (Кэли). Учлар сони тартибланган n та бўлган дараҳтлар сони n^{n-2} га teng. (n та элементлардан $n-2$ тадан тузилган барча такрорий ўринлаштиришлар сони). Албатта булар ичida кўплари ўзаро изоморфдир.

Масалан, $n=3$ бўлганда, учала дараҳт ҳам ўзаро изоморфдир (IX.16- шакл).



IX.16- шакл.

6- §. Эйлер графлари

Характеристик вектор. Жуфт граф. Эйлер цикли. Эйлер графи. Цикломатик сон.

G графнинг барча учларини ўз ичига олувчи қисм графларни қараймиз. G нинг барча қирралари u_1, u_2, \dots, u_m каби тартибланган бўлсин. G графнинг ҳар қандай $H \subseteq G$ қисмига 0 ва 1 дан иборат m ўлчовли (a_1, a_2, \dots, a_m) векторни мос қўямиз:

$$a_i = \begin{cases} 1, & \text{агар } u_i \in H \text{ бўлса,} \\ 0, & \text{агар } u_i \notin H \text{ бўлса,} \end{cases}$$

(*Нинг характеристик вектори*). Бу мослик ўзаро бир қийматлидир, шу билан бирга қисм графларнинг 2 модул бўйича йигиндисига уларнинг характеристик векторларининг йигиндиси мос келади. Барча қисм графлар тўплами йигинди амалига нисбатан абелъ группасини ташкил этади. Бу группа $\{0, 1\}$ коэффициентлар майдони устида чизикли фазони ташкил этади (исталган H қисм графнинг 1 га кўпайтмаси H ни беради, 0 га кўпайтмаси эса бўш графdir).

Кўриниб турибдики, G граф қисмларининг фазоси уларнинг характеристик векторларининг фазосига изоморф ва m ўлчовли.

Агар графнинг барча учларининг даражалари (яъни уларга инцидент бўлган қирралар сони) жуфт бўлса, граф ҳам жуфт дейилади.

Жуфт графда исталган содда занжирни (циклдан фарқли ўлароқ) унга кирмаган қирра билан давом эттириш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, занжирда охирги учнинг даражаси 1 га teng, лекин граф жуфт бўлганлиги сабабли бу учга инцидент бўлган камида битта қирра мавжуд. Агар граф чекли бўлса, занжирни кетма-кет давом эттириб, аввал босиб ўтган учларнинг бирига келамиз, яъни содда циклни ҳосил қилалимиз. Бу циклнинг барча қирраларини графдан олиб ташлай-

миз. Унинг қолган қисми яна жуфт графдир, чунки учларнинг дарражалари 2 га камаяди (агар ундан занжир ўтса) ёки ўзгармайди (агар занжир ўтмаса). Бу графда яна циклни ажратамиз ва ҳоказо. Юқоридаги жараённи яна давом этамиз, токи унда бирорта ҳам цикл қолмасин (яъни бўш граф ҳосил бўлгунча). Шундай қилиб, чекли жуфт граф ўзаро қирралар бўйича кесишмайдиган содда цикллар йигиндисига ёйилади. Бундан унинг барча қирралари циклик эканлиги келиб чиқади.

Агар чекли жуфт граф боғлиқли бўлса, у ҳолда осонгина кўрсатиш (содда цикллар сони бўйича индукцияни қўллаб) мумкинки унда барча қирраларини ўз ичига олган содда цикл мавжуд. Бундай цикл Эйлер цикли, графнинг ўзи эса Эйлер графи дейилади. Юқорида айтилганлардан куйидаги теорема келиб чиқади.

Теорема. Чекли боғлиқли граф Эйлер графи бўлиши учун у жуфт бўлиши зарур ва етарли.

Исталган чекли жуфт графнинг ҳар бир боғлиқли компонентаси Эйлер графидир.

Ихтиёрий графнинг ҳар қандай иккита H_1 ва H_2 жуфт қисм графларининг йигиндиси яна жуфт қисм графдир. Ҳақиқатан ҳам, α учнинг $S(\alpha)$ даражаси $H_1 + H_2$ қисм графла $s_1 + s_2 - 2s_{12}$ га teng. Бу ерда s_1 ва s_2 – шу α учнинг мос равища H_1 ва H_2 даги дарражалари, s_{12} эса α нинг уларнинг $H_1 \cap H_2$ кесишмасидаги даражаси. Шундай қилиб, жуфт қисм графлар тўплами барча қисм графлар фазосининг қисм фазосидир. Бу қисм фазонинг ўлчови v ни аниқлаймиз.

G боғлиқли, m қиррали, n учли D граф унинг ихтиёрий асоси бўлсин. Ватарлар сони $m - n + 1$ га teng. Ҳар бир α ватар ягона содда $[\alpha, \beta] \subseteq D$ занжир билан содда циклни ҳосил қиласиди. Барча циклларнинг векторлари боғлиқмас Σ системани ҳосил қиласиди. Чунки ҳар бир цикл системанинг бошқа циклларига тегишли бўлмаган қиррага (ўзининг ватарига) эга. Демак, $v \geq m - n + 1$.

Иккинчи томондан, ҳар қандай жуфт қисм граф, хусусий ҳолда исталган содда цикл Σ системанинг цикллари орқали ифодаланади. Ҳақиқатан ҳам, жуфт H қисм графга ватарлари унга тегишли Σ системанинг циклларини кўшамиз. Ҳосил бўлган йиғинди бирорта ҳам ватарга эга эмас. Демак, бу йиғинди D дарахтнинг қисм графи, яъни у бўш графдир. Акс ҳолда содда циклларга эга жуфт қисм граф (H ва циклларнинг йиғиндиси) дарахтнинг қисм графи бўлар эди. Бундан $v \leq m - n + 1$ келиб чиқади ва юқоридаги тенгсизликни инобатга олган ҳолда $v = m - n + 1$ га эга бўламиз.

Боғлиқли бўлмаган k компонентали графнинг жуфт қисм графлари фазосининг базиси унинг барча боғлиқли компоненталари базисларининг йиғиндисидан иборат. Қирралар ва учлар сони ҳам компоненталар бўйича кўшилади. Агар i компонента m_i қиррага ва n_i учга эга бўлса, у ҳолда

$$v = m - n + k, \quad m = \sum_{i=1}^k m_i, \quad n = \sum_{i=1}^k n_i.$$

Демак, жуфт қисм графлар қисм фазосининг ўлчови v графнинг цикломатик сони $\lambda(G)$ га тенг.

Исталган граф учун $v \geq 0$ бўлганлиги сабабли $k \geq n - m$.

Цикломатик сони нолга тенг бўлган боғлиқли графлар – дарахтлардир.

7- §. Хроматик сон ва хроматик синф

- Тўғри бўялган граф. *Хроматик сон. Хроматик синф. Бихроматик граф. Бихроматик бўлишининг етарли ва зарурий шарти. Брукс теоремаси.*

Сиртмоқсиз G графнинг ҳар бир учига (қиррасига) берилган ранглардан биттасини мос кўймиз. Агар қўшни учларга (қўшни қирраларга) турли хил ранглар мос кўйилган бўлса, у ҳолда G граф тўғри бўялган дейилади. G графнинг учларини (қирраларини) тўғри бўяш учун керак бўлган энг кам миқдордаги турли хил ранглар сони $\chi(G)$ мос равишда унинг *хроматик сони (хроматик синфи)* дейилади.

Хар қандай оддий G граф учун $\chi(G) \leq n$ ($\chi(E_n) = 1$). Тенглик фақат E_n учун бажарилади.

Агар графда камида битта қирра бўлса, $\chi(G) \leq 2$. Демак, $2 \leq \chi(G) \leq n(G)$ тентсизлик ўринли.

Таъриф. Агар G граф учун $\chi(G) = 2$ бўлса, у ҳолда G **бихроматик** граф дейилади.

1-төрима. Камида битта қиррага эга бўлган граф бихроматик бўлиши учун унда узунликлари тоқ содда цикларнинг бўлмаслиги зарур ва етарли.

Агар G граф тўлиқ χ учли F_χ қисмларга эга бўлса, унинг хроматик сони $\chi(G) \leq \chi$. Лекин тескариси тўғри эмас.

Шундай графлар мавжудки, уларда ҳаттоқи F_3 (учбурчак) бўлмаса-да исталганча катта хроматик сонга эга.

Хроматик сон ва граф учларининг даражалари (учга инцидент бўлган қирралар сони) орасидаги боғланишни ўрганимиз. G граф учларининг максимал даражаси $S(G)$ бўлсин. Γ_s билан $S(G) \leq S$ бўлган оддий графлар синфини белгилаймиз. Хар қандай $G \in \Gamma_s$ граф учун $\chi(G) \leq S + 1$ эканлигини учлар сони бўйича индукция усули билан исботлаш мумкин. Ягона F_s граф учун $\chi(F_s) = S + 1$.

2-төрима. Камида битта қиррага эга бўлган граф бихроматик бўлиши учун унда узунликлари тоқ сонларга тенг содда цикларнинг бўлмаслиги зарур ва етарлидир.

Зарур илги. Графни тўғри бўялганда цикл учларининг ранглари алмашиб келади, демак, узунлиги тоқ бўлган содда циклни тўғри бўяш учун икки ранг етарли эмас. Бундай циклни ўзида сақлаган граф ҳам бихроматик бўла олмайди.

Етарлилги. Аввало шуни таъкидлаймизки, хар қандай дарахт бихроматик графдир. Ҳақиқатан ҳам, дарахтнинг жуфт погоналаридағи барча учларини битта рангта бўйаймиз, тоқ погоналардаги учларни эса иккинчи рангга бўйаймиз. Натижада у тўғри бўялган бўлади, чунки дарахтнинг қирралари фақат кўшни погоналардаги учларни туташтиради.

Дараҳтда i ва j погоналар учларини туташтирувчи содда занжирнинг узунлигининг жуфт-тоқлиги $i-j$ соннинг жуфт-тоқлиги билан бир хил. Хусусий ҳолда, бир хил жуфтликдаги погоналарнинг учлари узунлиги жуфт содда занжир билан боғлангандир.

Узунлиги тоқ сонга тенг содда занжирга эга бўлмаган G графда исталган асосни танлаб оламиз. Бу асосга нисбатан барча ватарлар турли хил жуфтликларга эга бўлган погоналарнинг учларини туташтиради, акс ҳолда унда узунлиги тоқ содда занжирлар бўлар эди. Демак, асоснинг икки ранг билан тўғри бўялгани бутун графнинг ҳам тўғри бўялганидир.


Агар G графда χ учли тўлиқ F_χ қисм граф мавжуд бўлса, у ҳолда $\chi(G) \geq \chi$. Тескариси эса тўғри эмас, яъни шундай графлар мавжудки, уларда ҳатто уч учли тўлиқ қисм графлари (учбурчаклар) йўқ, лекин хроматик сони исталганча катта.

Бунда G_χ граф индуктив равишда ясалади. G_2 битта қиррадан иборат.


Фараз қилайлик, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ учлар тўпламида $G_{\chi-1}$ граф курилган бўлсин. $G_{\chi-1}$ графга $X' = \{x'_1, x'_2, \dots, x'_n\}$ учлар тўпламини ва β учни қўшамиз. Ҳар бир x'_i учни β уч ҳамда $G_{\chi-1}$ графда x_i га қўшни бўлган учлари билан туташтирамиз (IX.17- шакл). Ҳосил бўлган G_χ графда учбурчаклар йўқлигини кўрсатамиз. Индуksия фаразига кўра $G_{\chi-1}$ графда учбурчаклар йўқ. Агар учбурчак мавжуд бўлса, у ҳолда X' тўпламдаги учлар бир-бири билан туташтирилмаганилиги сабабли, унга бу учларнинг кўпти билан биттаси тегишли; β ҳам бирорта учбурчакка тегишли эмас, чунки у фақат X' даги учлар билан туташтирилган.

Агар $[x_i, x_j, x'_k]$ учбурчак бўлса, у ҳолда $[x_i, x_j, x_k]$ учбурчак ҳам мавжуд бўлар эди (чунки x'_k ва x_k учлар X да бир хил қўшни учларга эга). Бу эса индуksия фаразимизга зид.


Энди $\chi(G_\chi) = \chi$ эканлигини кўрсатамиз. Равшанки, $\chi(G_2) = 2$. Фараз қилайлик, $\chi(G_{\chi-1}) = \chi - 1$. У ҳолда G_χ графни $\chi - 1$ ранг



a)



б)



в)

IX.17- шакл.

билин түгри бўяш мумкин: масалан, $G_{\chi-1}$ графни $\chi - 1$ ранг билан түгри бўятганимиздан кейин ҳар бир x'_i учни x_i , нинг рангига бўйаймиз ва β учга қолган χ рангни берамиз.

G_χ графни $\chi - 1$ ранг билан түгри бўяш мумкин эмас-лигини кўрсатамиз. Тескарисини фараз қиласиз, яъни G_χ граф $\chi - 1$ ранг билан түгри бўялади ва β учга I ранг түгри келади. Бунда X тўпламнинг учлари I дан фарқли рангларга бўялган. $A \subseteq X$ тўплам I рангта бўялган учлар қисм тўплами бўлсин. Ҳар бир $x_i \in A$ учни x'_i учнинг рангига қайтадан бўйаймиз. Бу ҳолда $G_{\chi-1} \subseteq G_\chi$ графнинг барча учлари $\chi - 2$ ранг билан түгри бўялган бўлади. Ҳақиқатан ҳам, $\tilde{x}_i \tilde{x}_j$ шу $G_{\chi-1}$ графнинг исталган қирраси бўлсин. G_χ графда x_i ва x_j турли рангларга бўяланлиги сабабли уларнинг иккаласи бирданига A га тегишли эмас. Агар $x_i \notin A$, $x_j \notin A$ бўлса, графни қайта бўятганимизда уларнинг ранглари ўзгармайди ва турли хил бўлганлигича қолади. Шундай қилиб, $G_{\chi-1}$ граф индукция фаразимизга зид равишда $\chi - 2$ ранглар билан түгри бўялади.

Хроматик сон ва граф учларининг даражалари орасидаги боғланишни аниқлаймиз. $s(G)$ орқали G граф учлари даражаларининг энг каттасини белгилаймиз, Γ_s эса параллел қирраларга эга бўлмаган ва $s(G) \leq s$ графлар синфи.

Учлар сони бўйича индукцияни кўллаб осонгина кўрсатиш мумкинки, ҳар қандай $G \leq \Gamma_s$ учун $\chi(G) \leq s+1$. Ҳақиқатан ҳам, агар графда учлар сони $s+1$ дан ошмаса, $\chi(G) \leq s+1$. Фараз қилайлик, бу тенгсизлик G дан кам учларга эга Γ_s , нинг барча графлари учун ўринли бўлсин. G графдан исталган x учни олиб ташлаймиз (унга инцидент бўлган барча қирралар билан биргаликда). Индуктив фаразимизга асосан $G \setminus \{x\}$ графни $s+1$ ранг билан түгри бўйаймиз. G графда x учга кўпич билан s та қўшни уч мавжуд, шунинг учун камида битта ранг топиладики, унга x га қўшни бўлган учларнинг ҳеч бири бўялмаган. Шу рангта x учни бўйаймиз ва G граф $s+1$ ранг билан түгри бўялган бўлади.

Куйидаги теоремадан келиб чиқадики, Γ_s синф графлари ичида хроматик сони $s+1$ га тенг бўлган ягона тўлиқ $s+1$ учли F_{s+1} графдир.

Теорема (Брукс). Агар $s \geq 3$, $G \in \Gamma_s$ ва $G \neq F_{s+1}$ бўлса, у ҳолда $\chi(G) \leq s$.

8- §. Тўрлар ва тўрдаги оқимлар


- Тўр. Тўрнинг қутблари. Қутбли қирра. Ички қирра. π -тўрлар. Тўрдаги оқим. Тўрнинг кесими. Кесимнинг ўтказувчанлик қобилияти. Форд–Фалкерсон теоремаси.**

Баъзи бир учлари танлаб олинган граф тўр деб аталади. Танлаб олинган учлар тўрнинг қутблари дейилади. Масалан, дараҳтни бир қутбли тўр деб қарааш мумкин (унинг илдизи қутбdir). Тўрнинг қутбларидан фарқли учлари унинг ички учлари дейилади. Камида битта кутбга инцидент бўлган қирра қутбли, бошқалари эса ички қирралар дейилади.

Иккита синфга ажратилган: k та кириш ва l та чиқиш қутбларга бўлинган тўр (k, l) -қутблилик дейилади. $(1, 1)$ -қутблилик тўр икки қутбли тўр дейилади.

Умумий элементларга эга бўлмаган S_1 ва S_2 тўрларнинг қутблари мос равишида α_1, β_1 ва α_2, β_2 бўлсин. S_1 ва S_2 тўрларнинг кетма-кет уланишидан ҳосил қилинган α_1, β_2 қутбларга эга бўлган тўрни $S_1 S_2$ каби белгилаймиз. S_1 ва S_2 тўрларнинг параллел уланишидан ҳосил бўлган α_1, β_1 қутбларга эга тўрни эса $S_1 \cup S_2$ каби белгилаймиз (IX.18- шакл).

Юқоридагига ўхшаш S_1, S_2, \dots, S_n ва $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n$ тўрларни аниқлаш мумкин.



IX.18- шакл.

Бир қирралы тұрлардан параллел ва кетма-кет улаш нағасида ҳосил бўлган түр *параллел-кетма-кет түр* дейилади. Бундай тұрларни π - тұрлар деб атайды. π - тұрлар индуктив равишида аниқланади:

- 1) бир қирралы түр π - тұрдир;
- 2) агар S_1 ва S_2 π - тұрлар бўлса, у ҳолда, S_1S_2 ва $S_1 \cup S_2$ ҳам π - тұрлардир.

S қисман ориентирлаштирилган тұрнинг ҳар бир *и* қиррасига ўтказувчанлик қобилияти деб аталувчи манфий бўлмаган $C(u)$ сон мос қўйилган бўлсин.

1- таъриф. Қўйидаги шарттарни қаноатлантирадиган (f , ω) жуфтлик *S* тұрдагы оқим дейилади:

- 1) ω - тұрнинг барча звеноларини бирор ориентирлаштирилиши;

2) $f(u)$ – қирралар тўпламида аниқланган қийматлари манфий эмас ва и нинг ўтказувчанлик қобилиятидан катта бўлмаган функция. Шу билан бирга барча ички учларда Кирхгоф қонуни бажарилади, явни α учга киравчи барча қирралар бўйича оқимларнинг йигиндиси ундан чиқувчи қирралар бўйича оқимларнинг йигиндисига teng.

Бошқача қилиб айтганда:

- 1) $0 \leq f(u) \leq C(u)$ – тұрнинг барча қирралари учун;
- 2) $R(\alpha) = 0$ – барча ички учлар учун, бу ерда

$$R(\alpha) = \sum_{\alpha \in \Gamma(\alpha)} f(u) - \sum_{\alpha \in \Gamma'(\alpha)} f(u),$$

$\Gamma(\alpha)$ ($\Gamma'(\alpha)$) – ω -ориентирлаштирилишда α учдан чиқувчи (мос равишида α га киравчи) қирралар тўплами.

Равшанки, тұрнинг барча учлари бўйича (кутбларни ҳам инобатта олган тақдирда) $R(\alpha)$ ларнинг йигиндиси 0 га teng (чунки ҳар бир қирра бирор учдан чиқиб бошқасига киради). Шунинг учун $R(\alpha_j) = -R(\beta_j)$.

$R = R(\alpha_j)$ нинг қиймати тұрдагы оқимнинг миқдори дейилади.

Қирраларнинг берилган ўтказувчанлик қобилиятларида S тўрдан ўтувчи оқимнинг максимал қиймати R_{\max} ни аниқлаш масаласини кўрамиз. Бу масаланинг ечими тўрдаги кесимлар билан боғлиқдир.

2-таъриф. Агар тўрнинг баъзи бир қирраларини олиб ташлаганимизда, у боғлиқли бўлмай, қутблари турли компонентларига тушиб қолса, бу қирралар тўплами тўрнинг кесими дейилади.


IX.19- шаклда берилган тўр учун $\{d, e, f\}$, $\{b, c, e, g, h\}$, $\{d, g, h, i\}$ қирралар тўпламлари кесимлардир.

Агар кесимдан исталган қиррасини олиб ташлагандан кесим бўлмай қолса, у содда кесим дейилади. Масалан, $\{d, e, f\}$, $\{b, c, e, g, h\}$ кесимлар содда, $\{d, g, h, i\}$ эса содда эмас.

Боғлиқли тўрнинг содда кесими уни иккита: α_s , кутбни ўз ичига олган чап ва β_s , кутбни ўз ичига олган ўнг қисмларга ажратади. Кесимнинг ҳар бир қирраси турли қисмларга тегишли бўлган учларни туташтиради. Агар кесимнинг қирраси звено бўлса ёки чапдан ўнгга қараб йўналтирилган бўлса, у тўғри, акс ҳолда тескари дейилади.

3-таъриф. Содда ө кесимнинг ўтказувчанлик қобилияти $C(\omega)$ деб унинг барча тўғри қирраларининг ўтказувчанлик қобилиятлари йигиндисига айтилади.

Масалан, $\{d, e, f\}$ кесимнинг ўтказувчанлик қобилияти $5 + 1 = 6$ тенг, $\{b, c, e, g, h\}$ кесимники эса $3 + 2 + 3 + 2 = 10$. Агар тўр боғлиқли бўлмай, қутблари турли компоненталарига тегишли бўлса, у ҳолда ягона содда кесим бўш тўплам, унинг ўтказувчанлик қобилияти эса нолга тенг.



IX.19- шакл.

Теорема (Форд–Фалкерсон). *S тўрдан ўтувчи оқимнинг максимал қиймати R_{\max} унинг содда кесимларининг минимал ўтказувчанлик қобилияти C_{\min} га тенг.*



Муаммоли масала ва топшириқлар

1. Тарахтнинг иккита T_1 ва T_2 қисм дарахтларининг $T_1 \cap T_2$ кесишмаси дарахт бўлишини исботланг.
2. Агар i компонента m_i қирраларга ва n_i учларга эга бўлса, у ҳолда

$$v = m - n + k, \quad m = \sum_{i=1}^k m_i, \quad n = \sum_{i=1}^k n_i$$

бўлишини исботланг.

3. Цикломатик сони нолга тенг бўлган боғлиқли графлар дарахтлар бўлишини исботланг.
4. Агар $s \geq 3$, $G \geq \Gamma_s$ ва $G = \Gamma_{s+1}$ бўлса, у ҳолда $\chi(G) \leq s$ эланлигини исботланг.
5. Форд–Фалкерсон теоремасини исботланг.



Мустақил ишлаш учун савол ва топшириқлар

1. Дарахтлар. Циклик ва ациклик қирра. Цикломатик сон.
2. Графнинг асоси. Ватар. Чекли дарахтда қирралар сони учлар сонидан битта камлиги ҳақида.
3. Эйлер графлари.
4. Хроматик сон ва хроматик синф. Бихроматик граф. Бихроматик бўлишнинг зарурий ва етарли шарти.
5. Тўрлар ва тўрдаги оқимлар. Тўрнинг қутблари. Қутбли қирра. Ички қирра. Тўрнинг кесими. Кесимнинг ўтказувчанлик қобилияти.
6. Форд–Фалкерсон теоремаси.

АДАБИЁТ

1. Алексеев В.Б., Кудрявцев В.Б., Сапоженко А.А., Яблонский С.В. и др. Методическая разработка по курсу «Математическая логика и дискретная математика». 1980.
2. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математики. М., «Наука», 1977.
3. Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики. Логические исчисления и формализация арифметики. М., «Наука», 1979.
4. Гёдел К. Совместимость аксиомы выбора и обобщенной континuum-гипотезы с аксиомами теории множеств, УМН, 3, №1, 1948.
5. Гейтинг А. Интуиционизм, М., «МИР», 1965.
6. Горбатов В.А. Семантическая теория проектирования автоматов. М., «Энергия», 1979.
7. Горбатов В.А., Кафаров В.В., Павлов П.Г. Логическое управление технологическими процессами. М., «Энергия», 1978.
8. Горбатов В.А., Остапков Б.Л., Фролов С.А. Регулярные структуры автоматного управления/(под ред. В.А.Горбатова). М., «Машиностроение», 1980.
9. Горбатов В. А. Основы дискретной математики. М., «Высшая школа», 1986.
10. Горбатов В.А., Павлов П.Г., Четвериков В.Н. Логическое управление информационными процессами. М., «Энергоатомиздат», 1984.
11. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. М., «Наука», 1972.
12. Гаврилов М.А., Девятков В.В., Пузырев Е.И. Логическое проектирование дискретных автоматов. М., «Наука», 1977.
13. Ёкубов Т. Математик мантиқ элементлари. Т., «Ўқитувчи», 1983.
14. Т. Ёкубов, С. Каллибеков. Математик мантиқ элементлари. Т., «Ўқитувчи», 1996.
15. Ершов Ю.Л., Палигин Е.А. Математическая логика. М., «Наука», 1979.
16. Журавлёв Ю.И., Мазурин В.П., Столяров Л.Н. Элементы математической логики. Д., МФТИ, 1975.
17. Зыков А.А. Основы теории графов. М., «Наука», 1987.
18. Искандаров Р.И. Математик логика элементлари. Самарқанд. СамДУ, 1970.
19. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. Саратов. Изд-во Саратовского университета, 1991.
20. Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике. М., «Просвещение», 1986.
21. Клинин С. Математическая логика. М., МИР, 1973.
22. Карри Х.Б. Основания математической логики. М., МИР, 1969.
23. Кондаков Н.И. Введение в логику. М., «Наука», 1967.
24. Каменский М.И., Петрова Л.П., Садовский Б.Н. Математическая логика. М., МГУ, 1982.
25. Калбертсон Т. Математика и логика цифровых устройств. М., «Просвещение», 1965.

26. Кудрявцев В.Б. а) Теорема полноты для одного класса автоматов без обратных связей. Сб. «Проблемы кибернетики», вып. 8. М., Физматгиз, 1962, стр. 91–116;
б) О мощностях множеств предполных множеств некоторых функциональных систем, связанных с автоматами. Сб. «Проблемы кибернетики», вып. 13. М., «Наука», 1965 стр. 45–74
27. Колдуэлл С. Логический синтез релейных устройств. М., 1961.
28. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М., «Наука», 1975.
29. Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения. Санкт-Петербург, «Лань», 1999.
30. Лупанов О.Б. а) О синтезе некоторых классов управляющих систем. Сб. «Проблемы кибернетики», вып. 10. М., Физматгиз, 1963, стр. 88–96;
б) Об одном подходе к синтезу управляющих систем – принципы локального кодирования. Сб. «Проблемы кибернетики», вып. 14. М., «Наука», 1965, стр. 31–110;
в) Об возможностях синтеза схем из произвольных элементов. Труды МИАН СССР, 51, 1958, стр. 158–183.
31. Ляпунов А.А. О логических схемах программ. Сб. «Проблемы кибернетики», вып. 1. М., Физматгиз, 1958, стр. 46–74.
32. Лазарев В.Г., Пийль Е.И. Синтез управляющих автоматов. М., «Энергия», 1978.
33. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М., «Наука», 1965.
34. Мальцев А.И. Алгебраические системы. М., «Наука», 1970.
35. Марков А.А. Теория алгорифмов. Труды математического института АН СССР им. В.А.Стеклова, XII, АН РФ, 1954.
36. Марков А.А. Невозможность некоторых алгорифмов в теории ассоциативных систем, ДАН СССР, 55, 1947, стр. 587–590 с.
37. Марков А.А. Невозможность некоторых алгорифмов в теории ассоциативных систем, ДАН СССР, 58, 1947, стр. 353–356 с.
38. Матиясевич Ю.В. Диофантовость перечислимых множеств, ДАН СССР, 191, 1970, стр. 279–282.
39. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М., «Наука», 1976.
40. Михайлов А.Б., Плоткин А.И. Введение в алгебру и математический анализ. Сборник задач. I. Высказывания. Предикаты. Множества. Санкт-Петербург, 1992.
41. Новиков П.С. Конструктивная математическая логика с точки зрения классической. М., «Наука», 1977.
42. Новиков П.С. Элементы математической логики. М., «Наука», 1971.
43. Поспелов Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления. М., «Энергия», 1981.
44. Оре О. Теория графов. М., «Наука», 1980.
45. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость. М., МИР, 1972.

46. Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач. М., Физматгиз, 1960.
47. Тұраев Ҳ.Т. Математик мантиқ ва дискрет математика I қысым. Самарқанд, СамДУ, 2000, II қысым. Самарқанд: СамДУ, 2001.
48. Л.Р.Форд., Д.Р.Фалкерсон. Потоки в сетях. М., МИР, 1966.
49. Шоломов Л.А. Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств. М., «Наука», 1960.
50. Шестаков В.И. Математическая логика и автоматика. «Математика в школе», № 6, 1958, № 1, 1959.
51. Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетики. М., ИЛ, 1963.
52. Чёрч А. Введение в математическую логику. Том I, М., ИЛ, 1961.
53. Чудновский Г.В. Диофантовы предикаты, УМН, 25, № 4, 1970.
54. Чегис И.А., Яблонский С.В. Логические способы контроля работы электрических схем. М., Труды МИАН СССР, 51, 1958, стр. 270–360.
55. Утюров Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ. М., «Высшая школа», 1987.
56. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. М., «Наука», 1979.
57. Яблонский С. В., Лупанов О. Б. и др. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. Том I. М., «Наука», 1974.
58. Яблонский С.В. Основы алгебры логики и теории контактных схем. М., Тр. института математики им. Стеклова, 1958, т. 51.
59. Яблонский С.В. а) Функциональные построения в k -значной логике. М., Труды МИАН СССР, 51, 1958, стр. 5–142.
б) Методические разработки по курсу «Элементы дискретной математики». М., МГУ, 1971.
60. Яблонский С.В., Гаврилов Г.П., Кудрявцев В.Б. Функции алгебры логики и классы Поста. М., «Наука», 1966.
61. Қобулов В.Қ. Рақамлы автоматтар. Т., 1980.

МУНДАРИЖА

СҮЗ БОШИ	3
КИРИШ	9
I БОБ. УМУМИЙ ТУШУНЧАЛАР	
1- §. Тұламалар назариясінинг асосий түшунчалари	19
2- §. Тұламалар устида амаллар	21
3- §. Асосий тенгликлар (тенг күчлиликлар)	23
4- §. Тұламалар алгебраси	24
5- §. Муносабатлар. Бинар муносабат	28
6- §. Эквивалентлик муносабати	31
7- §. Функция түшүнчеси. Функциялар суперпозицияси	33
8- §. Тартиблаш муносабати	35
9- §. Панжара ҳақыда түшунчалар	38
II БОБ. МУЛОҲАЗАЛАР АЛГЕБРАСИ	
1- §. Мулоҳаза. Мулоҳазалар устида амаллар	43
2- §. Формулалар. Тенг күчли формулалар	51
3- §. Айнан чин, айнан ёлғон ва бажарилуучи формулалар	55
4- §. Асосий тенг күчлиликлар	60
5- §. Тенг күчли формулаларга доир теоремалар	64
6- §. Формулаларнинг нормал шакллари	67
7- §. Дизьюнкттив нормал шакл	71
8- §. Мукаммал конъюнкттив ва дизьюнкттив нормал шакллар	72
9- §. Формулаларнинг асосий хоссалари	77
10- §. Тенг күчли мас формулалар сони	82
11- §. Формулаларнинг чинлик түплами	85
12- §. Мулоҳазалар алгебраси функциялары. Функциялар тенг күчлилиги. Функциялар суперпозицияси	90
13- §. Буль алгебраси	93
14- §. Мантиқ алгебрасидеги икки тарафлама қонун	95
15- §. Мантиқ алгебрасидеги арифметик амаллар. Жегалкин күпхади .	99
16- §. Мантиқ алгебрасидеги монотон функциялар	101
17- §. Функционал ёпиқ синтезлер ва Пост теоремаси	104
III БОБ. МУЛОҲАЗАЛАР ҲИСОБИ	
1- §. Мулоҳазалар ҳисоби формуласи түшүнчеси	114
2- §. Исполненувчи формула таърифи. Мулоҳазалар ҳисобининг аксиомалар системаси (тизими).	
Келтириб чиқариш қоидалари	116
Келтириб чиқариш қоидасынинг ҳосилалари	121
3- §. Келтириб чиқариш қоидасынинг ҳосилалари	121
4- §. Формулалар мажмуасидан формулани келтириб чиқариш қоидаси	128
5- §. Келтириб чиқариш (исполняю) түшүнчеси. Дедукция теоремаси. Умумланған дедукция теоремаси	130

6- §. Айрим мантиқ қонунларининг исботи	137
7- §. Мулоҳазалар алгебраси ва мулоҳазалар ҳисоби орасидаги муносабатлар	141
8- §. Мулоҳазалар ҳисобида ечилиш, зидсизлик, тўлиқлилик ва эркинлик муаммолари	152

IV БОБ. ПРЕДИКАТЛАР МАНТИКИ

1- §. Предикат тушунчаси. Предикатлар устида мантиқий амаллар	162
2- §. Умумийлик ва мавжудлик кванторлари	167
3- §. Предикатлар мантиқининг формуласи. Предикатлар мантиқиформуласининг қиймати. Предикатлар мантиқининг тенг кучли формулалари	171
4- §. Предикатлар мантиқиформуласининг нормал шакли. Бажарилувчи ва умумкӣматли формулалар	179
5- §. Ечилиш муаммоси. Хусусий ҳолларда формуланинг умумкӣматлигини топиш алгоритмлари	188
6- §. Предикатлар мантиқининг математикага татбиқи	194
7- §. Аксиоматик предикатлар ҳисоби ҳақида	201

V БОБ. МАТЕМАТИК НАЗАРИЯЛАР

1- §. Биринчи тартибли тил. Терм ва формулалар	205
2- §. Мантиқий ва хос (махсус) аксиомалар. Келтириб чиқариш қоидаси	208
3- §. Алгебра, геометрия ва анализда мавжуд бўлган математик назариялар	210
4- §. Назарияда исботлаш тушунчаси. Тавтология хусусий ҳолларининг исботланувчанлиги	212
5- §. Дедукция теоремаси	213
6- §. Назария тилининг интерпретацияси. Берилган интерпретацияда формулаларнинг чинлик қийматлари. Назариянинг модели	217
7- §. Интерпретациянинг изоморфизмилиги. Назариянинг қатъийлиги	223
8- §. Назариянинг зидсизлик, тўлиқлилик ва ечилиш муаммолари	225
9- §. Предикатлар ҳисобининг зидсизлиги (махсус аксиомаларсиз назария)	228
10- §. Натурал сонлар назарияси. Гёделнинг тўлиқсизлик ҳақидағи теоремаси	230

VI БОБ. АЛГОРИТМЛАР

1- §. Алгоритм тушунчаси ва унинг характерли хусусиятлари	236
2- §. Ечилиувчи ва саналувчи тўпламлар	239
3- §. Алгоритм тушунчасига аниқлик киритиш	242
4- §. Ҳисобланувчи функциялар. Қисмий рекурсив ва умумрекурсив функциялар	247
5- §. Тыюринг машиналари	258

6- §. Тьюринг машинасида алгоритмни реализация қилиш	263
7- §. Алгоритмлар назариясининг асосий гипотезаси	269
8- §. Марковнинг нормал алгоритмлари	272
9- §. Марков бўйича қисмий ҳисобланувчи ва ҳисобланувчи функциялар	277
10- §. Алгоритмик ечилмовчи муаммолар	280
VII БОБ. МАТЕМАТИК МАНТИҚНИНГ ТЕХНИКАГА ТАТБИҚИ	
1- §. Функционал элементлар ва улардан схемалар ясаш	290
2- §. Кўп тактили схемалар	300
3- §. Тескари боғланиши бўлмаган автоматлар	310
4- §. Тескари боғланиши бўлган функционал элементлардан схемалар ясаш. Чекли автомат ҳақида умумий тушунчалар	312
5- §. Мили ва Мур автоматлари	316
6- §. Реле-контактли схемалар	319
7- §. Контактли схемалар ва уларнинг синтези	323
8- §. Контакт схемаларни минималлаштириш муаммоси	335
VIII БОБ. МАТЕМАТИК МАНТИҚ ФУНКЦИЯЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ МУАММОСИ	
1- §. Масаланинг кўйилиши	342
2- §. Дизъюнктив нормал шаклни соддалаштириш ва тупикили ДНШ	347
3- §. Минималлаштириш масаласининг геометрик тарзда кўйилиши	355
4- §. Жоиз (руҳсат этилган) конъюнкциялар	359
5- §. Қисқартирилган дизъюнктив нормал шакл	361
6- §. Қисқартирилган дизъюнктив нормал шаклни ясаш алгоритми	364
7- §. Тупикили дизъюнктив нормал шаклларни геометрик асосда ясаш усуслари	366
8- §. Тупикили дизъюнктив нормал шаклларни ясаш алгоритми	370
9- §. Айрим ягона тарзда ҳосил қилинадиган дизъюнктив нормал шакллар	373
IX БОБ. ГРАФЛАР НАЗАРИЯСИНИНГ ЭЛЕМЕНТЛАРИ	
1- §. Оддий графлар. Таъриф ва мисоллар	380
2- §. Графларнинг изоморфлиги	384
3- §. Мультиграфлар	386
4- §. Маршрутлар, занжирлар, цикллар. Боғлиқлилик	388
5- §. Даражатлар	395
6- §. Эйлер графлари	399
7- §. Хроматик сон ва хроматик синф	401
8- §. Тўрлар ва тўрдаги оқимлар	406
АДАБИЁТ	410

22.12
T98

Тўраев X.

Математик мантиқ ва дискрет математика:

Бакалаврият йўналишлари бўйича таълим олаётган талабалар учун ўкув қўлланма/Маъсул мұҳаррір: А.М.Мусаев. – Т.: «Ўқитувчи», 2003. – 416 б.

Сарл. олдида: Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлиги.

ББК 22.12я73+22.176я73

ҲОТАМ ТЎРАЕВ

**МАТЕМАТИК МАНТИҚ ВА
ДИСКРЕТ МАТЕМАТИКА**

Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма

Тошкент «Ўқитувчи» 2003

Тахририят мудири *М.Пўлатов*

Мұҳаррір *Ў.Хусанов*

Бадий мұҳаррір *М.Кудряшова*

Техник мұҳаррір *Т.Грешникова*

Мусаҳҳилар: *З.Содикова, В.Тараненко*

Компьютерда саҳифаловчи *Ш.Раҳимқориев*

IB № 8265

Оригинал-макетдан босишига руҳсат этилди 22.12.03. Бичими 60x84^{1/16}.

Кегли 11, 10 шпонли. Таймс гарн. Офсет босма усулида босилди.

Босма т. 26,0. Шартли б.т. 24,18. Нашр т. 24,0. 1000 нусхада босилди.

Буюртма № 2035

«Ўқитувчи» нашриёти. Тошкент, 700129. Навоий кўчаси, 30.

Шартнома № 09–113–03.

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 1- босмахонасида босилди. Тошкент, Сағон кўчаси, 1- берк кўча, 2- уй. 2003.